

Étude locale

* * *

Relations de comparaison

Exercice 1 – ★ Fonctions dominées

1. Donner la définition de « f est dominée par g au voisinage de a »
2. Montrer que $x^2 \underset{0}{=} \mathcal{O}(x)$
3. Montrer que $x \underset{+\infty}{=} \mathcal{O}(x^2)$
4. Soit f continue en a , montrer que $f \underset{a}{=} \mathcal{O}(1)$.

_____ **Correction** _____

1. $\exists u, \exists \alpha > 0, \forall x \in]a - \alpha, a + \alpha[, f = gu$ avec u fonction bornée sur $]a - \alpha, a + \alpha[$.
2. Soit $u : x \mapsto x$, et $\alpha > 0$, alors $\forall x \in]-\alpha, \alpha[, x^2 = xu$ et $\forall x \in]-\alpha, \alpha[, |u| < \alpha$. Donc $x^2 \underset{0}{=} \mathcal{O}(x)$
3. Soit $u : x \mapsto \frac{1}{x}$ et $\alpha > 0$, alors $\forall x \in]\alpha, +\infty[, x = x^2 u$ avec $\forall x \in]\alpha, +\infty[, |u| < \frac{1}{\alpha}$.
Donc $x \underset{0}{=} \mathcal{O}(x^2)$
4. f est continue en a donc pour $\varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in]a - \delta, a + \delta[, |f(x) - f(a)| \leq \varepsilon$
donc $\forall x \in]a - \delta, a + \delta[, |f(x)| \leq |f(a)| + \varepsilon$. Donc f est bornée au voisinage de a .
Ainsi $f = 1 \times f$ avec f bornée au voisinage de a , donc $f \underset{a}{=} \mathcal{O}(1)$.

Exercice 2 – ★ Fonctions négligeables

1. Montrer que $x \sin x \underset{0}{=} \mathcal{O}(\sin x)$
2. Montrer que $\ln x \underset{+\infty}{=} \mathcal{O}(x)$

_____ **Correction** _____

1. En posant $u : x \mapsto x$, $x \sin x = u \sin x$ avec $\lim_{x \rightarrow 0} u = 0$ donc $x \sin x \underset{0}{=} \mathcal{O}(\sin x)$.
2. On pose $u = x \mapsto \frac{\ln x}{x}$ pour $x > 0$ et alors $\forall x > 0, \ln x = ux$ avec $\lim_{x \rightarrow +\infty} u = 0$ donc $\ln x \underset{+\infty}{=} \mathcal{O}(x)$.

Exercice 3 – ★ Compatibilité avec la multiplication

1. Soit $f = \mathcal{O}_a(\varphi)$ et $\lambda \neq 0$, montrer que $\lambda f = \mathcal{O}_a(\varphi)$
2. Soit $f_1 = \mathcal{O}_a(\varphi_1)$ et $f_2 = \mathcal{O}_a(\varphi_2)$, montrer que $f_1 f_2 = \mathcal{O}_a(\varphi_1 \varphi_2)$
3. Soit $f = o_a(\varphi)$ et $\lambda \neq 0$, montrer que $\lambda f = o_a(\varphi)$
4. Soit $f_1 = o_a(\varphi_1)$ et $f_2 = o_a(\varphi_2)$, montrer que $f_1 f_2 = o_a(\varphi_1 \varphi_2)$

Correction

1. $f = \mathcal{O}_a(\varphi)$ donc il existe u bornée au voisinage de a telle que $f = \varphi u$ donc $\lambda f = \lambda \varphi u$ au voisinage de a . On pose $v = \lambda u$, donc $|v| = |\lambda||u|$ bornée au voisinage de a , et $f = \varphi v$, donc $\lambda f = \mathcal{O}_a(\varphi)$.
2. Il existe u, v bornées au voisinage de a telles que $f_1 = \varphi_1 u$ et $f_2 = \varphi_2 v$ donc $f_1 f_2 = \varphi_1 \varphi_2 uv$ avec $|uv| = |u||v|$ donc uv est bornée. Ainsi $f_1 f_2 = \mathcal{O}_a(\varphi_1 \varphi_2)$

Exercice 4 – ★ Compatibilité avec la composition

1. Soit $f = \mathcal{O}_a(\varphi_1)$ et $\varphi_1 = \mathcal{O}_a(\varphi_2)$, montrer que $f = \mathcal{O}_a(\varphi_2)$
2. Soit $f = o_a(\varphi_1)$ et $\varphi_1 = o_a(\varphi_2)$, montrer que $f = o_a(\varphi_2)$
3. Soit $f = \mathcal{O}_a(\varphi_1)$ et $\varphi_1 = o_a(\varphi_2)$, montrer que $f = o_a(\varphi_2)$
4. Soit $f = o_a(\varphi_1)$ et $\varphi_1 = \mathcal{O}_a(\varphi_2)$, montrer que $f = o_a(\varphi_2)$

Correction

1. On a $f = \varphi_1 u$ avec u bornée au voisinage de a et $\varphi_1 = \varphi_2 v$ avec v bornée au voisinage de a , donc $f = \varphi_2 uv$ avec uv bornée au voisinage de a , donc $f = \mathcal{O}_a(\varphi_2)$
2. On a $f = \varphi_1 \varepsilon_1$ avec $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_1(x) = 0$ et $\varphi_1 = \varphi_2 \varepsilon_2$ avec $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_2(x) = 0$. Ainsi $f = \varphi_2 \varepsilon_1 \varepsilon_2$ avec $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon_1(x) \varepsilon_2(x) = 0$ donc $f = o_a(\varphi_2)$
3. On a $f = \varphi_1 u$ avec u bornée au voisinage de a et $\varphi_1 = \varphi_2 \varepsilon$ avec $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$. Donc $f = \varphi_2 u \varepsilon$ avec $\lim_{x \rightarrow a} u(x) \varepsilon(x) = 0$, donc $f = o_a(\varphi_2)$
4. On a $f = \varphi_1 \varepsilon$ avec $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$ et $\varphi_1 = \varphi_2 v$ avec v bornée au voisinage de a , donc $f = \varphi_2 v \varepsilon$ avec $\lim_{x \rightarrow a} v(x) \varepsilon(x) = 0$ donc $f = o_a(\varphi_2)$

Exercice 5 – ★ Équivalent simple

Déterminer un équivalent simple des fonctions suivantes :

- a. $1 + x + \ln x$ en 0 et $+\infty$ d. $\tan(2x)$ en 0 et $\frac{\pi}{4}$
 b. $\cosh(\sqrt{x})$ en 0 et $+\infty$ e. $\ln(\sin x)$ en 0 et $\frac{\pi}{2}$
 c. $\sin(\cos x)$ en 0 et en $\frac{\pi}{2}$ f. $\frac{\sin x \ln(1+x^2)}{x \tan x}$ en 0

Correction

a. En 0 : $1 + x = o(\ln(x))$ car $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = -\infty$, donc $1 + x + \ln(x) = \ln(x) + o(\ln(x))$

Ainsi $1 + x + \ln(x) \underset{0}{\sim} \ln(x)$

En $+\infty$: $1 + \ln(x) \underset{+\infty}{=} o(x)$, donc $1 + x + \ln(x) \underset{+\infty}{=} x + o(x)$

Ainsi $1 + x + \ln(x) \underset{0}{\sim} x$

b. En 0 : $\lim_{x \rightarrow 0} \cosh(\sqrt{x}) = 1$ donc $\cosh(\sqrt{x}) \underset{0}{\sim} 1$

En $+\infty$: $\cosh(\sqrt{x}) = \frac{e^{\sqrt{x}} + e^{-\sqrt{x}}}{2}$ et $e^{-\sqrt{x}} \underset{0}{=} o(e^{\sqrt{x}})$, donc $\cosh(\sqrt{x}) \underset{+\infty}{\sim} \frac{e^{\sqrt{x}}}{2}$

c. En 0 : $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(\cos x) = \sin(1)$ donc $\sin(\cos x) \underset{0}{\sim} \sin(1)$

En $\frac{\pi}{2}$: On sait que $\sin(u) \underset{0}{\sim} u$ or $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \cos x = 0$ donc on pose $u = \cos x$ et $\sin(\cos x) = \sin u \underset{0}{\sim} u = \cos x$

On pose $t = \frac{\pi}{2} - x$, on a alors $\cos(x) = \cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right) = \sin(t) \underset{0}{\sim} t = \frac{\pi}{2} - x$

En conclusion, $\sin(\cos(x)) \underset{\frac{\pi}{2}}{\sim} \frac{\pi}{2} - x$

d. En 0 : $\tan(2x) = \frac{\sin 2x}{\cos 2x} \underset{0}{\sim} \frac{2x}{1} = 2x$, donc $\tan 2x \underset{0}{\sim} 2x$

En $\frac{\pi}{4}$: On pose $t = \frac{\pi}{4} - x$, alors $\tan(2x) = \tan\left(\frac{\pi}{2} - 2t\right) = \frac{1}{\tan 2t} \underset{0}{\sim} \frac{1}{2t} = \frac{1}{\frac{\pi}{2} - 2x}$

Donc $\tan(2x) \underset{\frac{\pi}{4}}{\sim} \frac{1}{\frac{\pi}{2} - 2x}$

e. En 0 : $\ln(\sin x) = \ln\left(x \frac{\sin x}{x}\right) = \ln(x) + \ln\left(\frac{\sin x}{x}\right)$

On sait que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ donc $\lim_{x \rightarrow 0} \ln\left(\frac{\sin x}{x}\right) = 0$ or $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = -\infty$

donc $\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right) \underset{0}{=} o(\ln(x))$, ainsi $\ln(\sin x) \underset{0}{=} \ln(x) + o(\ln(x))$ et donc

$\ln(\sin x) \underset{0}{\sim} \ln(x)$

En $\frac{\pi}{2}$: On pose $t = \frac{\pi}{2} - x$, donc $\ln(\sin x) = \ln(\cos t) = \ln(1 + \cos(t) - 1)$

On pose $u = \cos(t) - 1$, et on a $\ln(1 + u) \underset{0}{\sim} u$ donc $\ln(1 + \cos(t) - 1) \underset{0}{\sim} \cos(t) - 1$

$\cos(t) = 1 - 2\sin^2\left(\frac{t}{2}\right)$ et donc $\cos(t) - 1 = -2\sin^2\left(\frac{t}{2}\right) \underset{0}{\sim} -\frac{t^2}{2}$

En conclusion $\ln(\sin(x)) \underset{\frac{\pi}{2}}{\sim} -\frac{\left(\frac{\pi}{2} - x\right)^2}{2}$

f. $\frac{\sin x \ln(1+x^2)}{x \tan x} \underset{0}{\sim} \frac{x \ln(1+x^2)}{x \times x} = \frac{\ln(1+x^2)}{x}$

En outre $\ln(1+u) \underset{0}{\sim} u$, d'où $\ln(1+x^2) \underset{0}{\sim} x^2$

Et ainsi $\frac{\sin x \ln(1+x^2)}{x \tan x} \underset{0}{\sim} \frac{x^2}{x} = x$

Exercice 6 – ★ Équivalent d'un polynôme

Soit $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ avec $a_n \neq 0$. Soit p le plus petit indice tel que $a_p \neq 0$.

1. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0} P(x)$
2. Déterminer un équivalent de P en 0
3. Déterminer un équivalent de P en $+\infty$

Correction

1. $\lim_{x \rightarrow 0} P(x) = a_0$
2. $P(x) \underset{0}{\sim} a_p x^p$
3. $P(x) \underset{+\infty}{\sim} a_n x^n$

Exercice 7 – ★ Exponentielle et équivalent

1. Est-ce que $f(x) \underset{a}{\sim} g(x) \implies e^{f(x)} \underset{a}{\sim} e^{g(x)}$? Justifier.
2. Montrer que $e^{f(x)} \underset{a}{\sim} e^{g(x)} \iff \lim_{x \rightarrow a} (f(x) - g(x)) = 0$

Correction

1. Non, par exemple $x \underset{+\infty}{\sim} 1 + x$ mais $\frac{e^x}{e^{1+x}} = \frac{1}{e} \neq 1$ donc e^x et e^{1+x} ne sont pas équivalentes en $+\infty$
2. $e^{f(x)} \underset{a}{\sim} e^{g(x)} \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{e^{f(x)}}{e^{g(x)}} = 1 \iff \lim_{x \rightarrow a} e^{f(x)-g(x)} = 1 \iff \lim_{x \rightarrow a} (f(x) - g(x)) = 0$

Exercice 8 – ★ Logarithme et équivalent

Soit $a \in \mathbb{R}$ et f, g strictement positives telles que $f(x) \underset{a}{\sim} g(x)$ et

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L \in \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}.$$

1. Montrer que si $L \neq 1$ alors $\ln(f(x)) \underset{a}{\sim} \ln(g(x))$.
2. Montrer que si $L = 1$ et $f'(a) = g'(a) \neq 0$ alors $\ln(f(x)) \underset{a}{\sim} \ln(g(x))$.

Correction

$$1. \ln(f(x)) = \ln\left(g(x) \frac{f(x)}{g(x)}\right) = \ln(g(x)) + \ln\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)$$

Puisque $f \underset{a}{\sim} g$, $\ln\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$, de plus $\ln(g) \xrightarrow{x \rightarrow a} L$ avec $L \in \mathbb{R}^* \cup \{-\infty, +\infty\}$,

$$\text{donc } \ln\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) \underset{a}{=} o(\ln(g(x)))$$

On en déduit $\ln(f(x)) \underset{a}{=} \ln(g(x)) + o(\ln(g(x)))$, d'où $\boxed{\ln(f) \underset{a}{\sim} \ln(g)}$

2. On rappelle que $\ln(1+u) \underset{o}{\sim} u$ donc $\ln(1+u) = u + o(u)$

$$f(x) - f(a) \underset{a}{\sim} f'(a)(x-a) \text{ donc } f(x) - 1 \underset{a}{\sim} f'(a)(x-a) = g'(a)(x-a)$$

Donc $f(x) = 1 + f'(a)(x-a) + o(x-a)$, de même $g(x) = 1 + g'(a)(x-a) + o(x-a)$

Ainsi $\ln(f(x)) \underset{a}{=} \ln(1 + f'(a)(x-a) + o(x-a)) \underset{a}{=} f'(a)(x-a) + o(x-a)$ et donc

$$\ln(f(x)) \underset{a}{\sim} f'(a)(x-a)$$

De même $\ln(g(x)) \underset{a}{\sim} g'(a)(x-a)$, et puisque $f'(a) = g'(a)$, on a $\boxed{\ln(f(x)) \underset{a}{\sim} \ln(g(x))}$

Exercice 9 – ★ Exponentielle et négligeabilité

Soit f, g deux fonctions avec $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

1. Est-ce que $e^{g(x)} \underset{+\infty}{=} o(e^{f(x)}) \implies g(x) \underset{+\infty}{=} o(f(x))$? Justifier.
2. Est-ce que $g(x) \underset{+\infty}{=} o(f(x)) \implies e^{g(x)} \underset{+\infty}{=} o(e^{f(x)})$? Justifier.

Correction

1. Soit f, g telles que $e^{g(x)} \underset{+\infty}{=} o(e^{f(x)})$ ce qui est équivalent à $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{g(x)}}{e^{f(x)}} = 0$ ce qui est équivalent à $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{g(x)-f(x)} = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) - f(x) = -\infty$.

On peut alors chercher un contre-exemple, c'est-à-dire des fonctions f, g telle que $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) - f(x) = -\infty$ mais avec g qui n'est pas négligeable devant f .

Prenons $f(x) = x$ et $g(x) = x - \sqrt{x}$ alors $g(x) - f(x) = -\sqrt{x}$ qui tend bien vers $-\infty$, en revanche $f \underset{+\infty}{\sim} g$ donc on n'a pas $g(x) \underset{+\infty}{=} o(f(x))$, $\boxed{\text{l'implication est donc fausse.}}$

2. Soit f, g telles que $g(x) \underset{+\infty}{=} o(f(x))$ donc $g(x) = f(x)\varepsilon(x)$.

$$\frac{e^{g(x)}}{e^{f(x)}} = e^{g(x)-f(x)} = e^{f(x)(\varepsilon(x)-1)} \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)(\varepsilon(x)-1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-f(x)) = -\infty \text{ donc}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{g(x)-f(x)} = 0 \text{ et ainsi } e^{g(x)} \underset{+\infty}{=} o(e^{f(x)}), \boxed{\text{l'implication est donc vraie.}}$$

Exercice 10 – ★ Équivalent simple

Déterminer un équivalent simple des suites :

1. $n \sin \frac{1}{n^2}$
2. $\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}$
3. $n^{\frac{1}{n}} - 1$
4. $\ln(1+n) - \ln(n)$
5. $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{n}\right)$
6. $\tan^n\left(\frac{\pi}{3} + \frac{1}{n}\right)$

Correction

1. $n \sin \frac{1}{n^2} \sim \frac{1}{n}$
2. $\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} = \frac{n+1 - (n-1)}{n^2-1} = \frac{2}{n^2-1} \sim \frac{2}{n^2}$
3. $n^{\frac{1}{n}} - 1 = e^{\ln(n^{\frac{1}{n}})} - 1 = e^{\frac{\ln n}{n}} - 1 \sim \frac{\ln n}{n}$
4. $\ln(1+n) - \ln(n) = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n}$
5. $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{\tan \frac{1}{n}} \sim n$
6. $\tan a + b = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$ donc $\tan\left(\frac{\pi}{3} + \frac{1}{n}\right) = \frac{\sqrt{3} + \tan \frac{1}{n}}{1 - \sqrt{3} \tan \frac{1}{n}}$
 - $\left(\sqrt{3} + \tan \frac{1}{n}\right)^n = \sqrt{3}^n \left(1 + \frac{\tan \frac{1}{n}}{\sqrt{3}}\right)^n$
 - $\left(1 + \frac{\tan \frac{1}{n}}{\sqrt{3}}\right)^n = \exp\left(n \ln\left(1 + \frac{\tan \frac{1}{n}}{\sqrt{3}}\right)\right)$ or $n \ln\left(1 + \frac{\tan \frac{1}{n}}{\sqrt{3}}\right) \sim n \frac{\tan \frac{1}{n}}{\sqrt{3}} \sim \frac{1}{\sqrt{3}}$
 - Donc $\lim \left[n \ln\left(1 + \frac{\tan \frac{1}{n}}{\sqrt{3}}\right) \right] = \frac{1}{\sqrt{3}}$ et donc $\lim \left[\exp\left(n \ln\left(1 + \frac{\tan \frac{1}{n}}{\sqrt{3}}\right)\right) \right] = e^{\frac{1}{\sqrt{3}}}$
 - Donc $\left(\sqrt{3} + \tan \frac{1}{n}\right)^n \sim \sqrt{3}^n e^{\frac{1}{\sqrt{3}}}$
 - $\left(1 - \sqrt{3} \tan \frac{1}{n}\right)^n = \exp\left(n \ln\left(1 - \sqrt{3} \tan \frac{1}{n}\right)\right)$
 - or $n \ln\left(1 - \sqrt{3} \tan \frac{1}{n}\right) \sim -n\sqrt{3} \tan \frac{1}{n} \sim -\sqrt{3}$ donc $\left(1 - \sqrt{3} \tan \frac{1}{n}\right)^n \sim e^{-\sqrt{3}}$
 - Ainsi $\tan^n\left(\frac{\pi}{3} + \frac{1}{n}\right) \sim \sqrt{3}^n e^{\frac{1}{\sqrt{3}} + \sqrt{3}}$

Exercice 11 – ★★ Équivalent simple

Déterminer un équivalent simple en 0 de :

- a. $\cos(ax) - \cos(bx)$
- b. $a^x - b^x \quad (a, b > 0)$
- c. $\tan \frac{\pi}{2x+1}$
- d. $\sqrt[4]{16+x} - \sqrt[3]{8+x}$
- e. $\sqrt[4]{1+x^2} - \sqrt[4]{1-x^2}$
- f. $\frac{1}{\sqrt{2+3x}} - \frac{1}{\sqrt{2-3x}}$

Correction

- a. $\cos(p+q) = \cos p \cos q - \sin p \sin q$ on pose alors $p+q = ax$ et $p-q = bx$ donc $p = \frac{a+b}{2}x$ et $q = \frac{a-b}{2}x$
On a $\cos(ax) - \cos(bx) = \cos(p+q) - \cos(p-q) = -2 \sin p \sin q = -2 \sin\left(\frac{a+b}{2}x\right) \sin\left(\frac{a-b}{2}x\right) \underset{0}{\sim} -2 \left(\frac{a+b}{2}x\right) \left(\frac{a-b}{2}x\right) = -\frac{1}{2}(a^2 - b^2)x^2$
Ainsi $\cos(ax) - \cos(bx) \underset{0}{\sim} \frac{b^2 - a^2}{2}x^2$
- b. $a^x - b^x = \exp(x \ln a) - \exp(x \ln b) = \exp(x \ln b)(\exp(x(\ln a - \ln b)) - 1)$
 $\exp(x \ln b) \underset{0}{\sim} 1$ et $\exp(x(\ln a - \ln b)) - 1 \underset{0}{\sim} x(\ln a - \ln b)$
Donc $a^x - b^x \underset{0}{\sim} x \ln \frac{a}{b}$
- c. $\tan \frac{\pi}{2x+1} = \tan\left(\frac{\pi}{2x+1}\right) = \tan\left(\frac{\pi}{2x+1} - \pi\right) = \tan\left(-\frac{2x\pi}{2x+1}\right) \underset{0}{\sim} -\frac{2x\pi}{2x+1} \underset{0}{\sim} 2\pi x$
- d. $\sqrt[4]{16+x} = 2 \sqrt[4]{1 + \frac{x}{16}} \underset{0}{=} 2 \left(1 + \frac{x}{64} + o(x)\right) \underset{0}{=} 2 + \frac{x}{32} + o(x)$
 $\sqrt[3]{8+x} = 2 \sqrt[3]{1 + \frac{x}{8}} \underset{0}{=} 2 \left(1 + \frac{x}{24} + o(x)\right) \underset{0}{=} 2 + \frac{x}{12} + o(x)$
Donc $\sqrt[4]{16+x} - \sqrt[3]{8+x} \underset{0}{=} \frac{x}{32} - \frac{x}{12} + o(x) \underset{0}{=} -\frac{5}{96}x + o(x)$
Donc $\sqrt[4]{16+x} - \sqrt[3]{8+x} \underset{0}{\sim} -\frac{5}{96}x$
- e. $\sqrt[4]{1+x^2} - \sqrt[4]{1-x^2} = \frac{\sqrt[4]{1+x^2} - \sqrt[4]{1-x^2}}{\sqrt[4]{1+x^2} + \sqrt[4]{1-x^2}} \underset{0}{\sim} \frac{\sqrt[4]{1+x^2} - \sqrt[4]{1-x^2}}{2}$
 $\frac{\sqrt[4]{1+x^2} - \sqrt[4]{1-x^2}}{2} = \frac{1+x^2 - (1-x^2)}{2(\sqrt[4]{1+x^2} + \sqrt[4]{1-x^2})} \underset{0}{\sim} \frac{2x^2}{4} = \frac{x^2}{2}$
Donc $\sqrt[4]{1+x^2} - \sqrt[4]{1-x^2} \underset{0}{\sim} \frac{x^2}{2}$

$$\begin{aligned} \text{f. } \frac{1}{\sqrt{2+3x}} - \frac{1}{\sqrt{2-3x}} &= \frac{\sqrt{2-3x} - \sqrt{2+3x}}{\sqrt{2+3x}\sqrt{2-3x}} \underset{0}{\sim} \frac{\sqrt{2-3x} - \sqrt{2+3x}}{2} \\ \frac{\sqrt{2-3x} - \sqrt{2+3x}}{2} &= \frac{2-3x - (2+3x)}{2(\sqrt{2-3x} + \sqrt{2+3x})} \underset{0}{\sim} \frac{-6x}{4\sqrt{2}} = -\frac{3x}{2\sqrt{2}} \\ \text{Donc } \boxed{\frac{1}{\sqrt{2+3x}} - \frac{1}{\sqrt{2-3x}} \underset{0}{\sim} -\frac{3x}{2\sqrt{2}}} \end{aligned}$$

Exercice 12 – ★★ Équivalent et puissance

Soit $u_n, v_n > 0$.

1. Si $u_n \sim v_n$ est-ce que $u_n^n \sim v_n^n$? Justifier.
2. Si $u_n \sim v_n$ et $u_n - v_n \longrightarrow 0$ est-ce que $u_n^n \sim v_n^n$? Justifier.
3. Montrer que si $u_n \underset{+\infty}{=} v_n + o\left(\frac{1}{n}\right)$ et $\lim u_n = L \neq 0$ alors $u_n^n \sim v_n^n$

Correction

1. Non, par exemple $1 + \frac{1}{n} \sim 1$ mais $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \sim e \neq 1$

2. Non, même exemple.

3. $\ln\left(\frac{u_n}{v_n}\right)^n = n(\ln u_n - \ln v_n) \underset{+\infty}{=} n\left(\ln\left(v_n + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) - \ln v_n\right)$

De plus $\ln\left(v_n + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \underset{+\infty}{=} \ln v_n + \ln\left(1 + o\left(\frac{1}{nv_n}\right)\right)$

En outre $u_n \sim v_n$ donc $\lim v_n = \lim u_n = L \neq 0$

On en déduit : $\ln v_n + \ln\left(1 + o\left(\frac{1}{nv_n}\right)\right) \underset{+\infty}{=} \ln v_n + \ln\left(1 + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)$

Or $\ln\left(1 + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \underset{+\infty}{=} o\left(\frac{1}{n}\right) + o\left(o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \underset{+\infty}{=} o\left(\frac{1}{n}\right)$

Ainsi $\boxed{\ln\left(v_n + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \underset{+\infty}{=} \ln v_n + o\left(\frac{1}{n}\right)}$

Et donc $\ln\left(\frac{u_n}{v_n}\right)^n \underset{+\infty}{=} n\left(\ln v_n + o\left(\frac{1}{n}\right) - \ln v_n\right) \underset{+\infty}{=} o(1)$

On en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{u_n}{v_n}\right)^n = 0$ et ainsi $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{u_n}{v_n}\right)^n = 1$ ce qui montre que $u_n^n \sim v_n^n$

Exercice 13 – ★ Limites de fonctions

Déterminer grâce à un équivalent les limites des fonctions suivantes :

$$1. x(3+x) \frac{\sqrt{x+3}}{\sqrt{x} \sin(\sqrt{x})} \text{ en } 0$$

$$2. \frac{(1-\cos x) \arctan x}{x \tan x} \text{ en } 0$$

$$3. \tan x \tan 2x \text{ en } \frac{\pi}{2}$$

$$4. (2x^2 - 3x + 1) \tan \pi x \text{ en } \frac{1}{2}$$

$$5. (\cos x)^{\frac{1}{x^2}} \text{ en } 0$$

$$6. (1 + \tan x)^{\frac{1}{\sin x}} \text{ en } 0$$

Correction

$$1. x(3+x) \frac{\sqrt{x+3}}{\sqrt{x} \sin(\sqrt{x})} \underset{0}{\sim} 3x \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{x} \cdot \sqrt{x}} = 3\sqrt{3}$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow 0} x(3+x) \frac{\sqrt{x+3}}{\sqrt{x} \sin(\sqrt{x})} = 3\sqrt{3}$$

$$2. \frac{(1-\cos x) \arctan x}{x \tan x} \underset{0}{\sim} \frac{\frac{x^2}{2} \cdot x}{x^2} = \frac{x}{2}$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-\cos x) \arctan x}{x \tan x} = 0$$

$$3. \tan x \tan 2x = \tan x \tan(2x - \pi) \underset{\frac{\pi}{2}}{\sim} \frac{1}{\cos x} \cdot (2x - \pi) \underset{\frac{\pi}{2}}{\sim} \frac{2x - \pi}{\frac{\pi}{2} - x} = -2$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan x \tan 2x = -2$$

$$4. (2x^2 - 3x + 1) \tan \pi x = (2x - 1)(x - 1) \tan \pi x$$

$$\tan \pi x = \frac{1}{\tan(\frac{\pi}{2} - \pi x)} \underset{\frac{1}{2}}{\sim} \frac{1}{\frac{\pi}{2} - \pi x} = \frac{1}{\pi(\frac{1}{2} - x)}$$

$$(2x - 1)(x - 1) \underset{\frac{1}{2}}{\sim} -\frac{2x - 1}{2} = \frac{1}{2} - x$$

$$\text{Ainsi } (2x^2 - 3x + 1) \tan \pi x \underset{\frac{1}{2}}{\sim} \frac{1}{\pi}$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} (2x^2 - 3x + 1) \tan \pi x = \frac{1}{\pi}$$

$$5. \ln(\cos x)^{\frac{1}{x^2}} = \frac{\ln \cos x}{x^2} \underset{0}{\sim} \frac{\cos x - 1}{x^2} \underset{0}{\sim} -\frac{\frac{x^2}{2}}{x^2} = -\frac{1}{2}$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

$$6. \ln(1 + \tan x)^{\frac{1}{\sin x}} = \frac{\ln(1 + \tan x)}{\sin x} \underset{0}{\sim} \frac{\tan x}{\sin x} \underset{0}{\sim} 1$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x)^{\frac{1}{\sin x}} = e$$

Exercice 14 – ★ Limites de suites

Déterminer grâce à un équivalent les limites des suites suivantes :

1. $\left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n$
2. $\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^n$
3. $\left(\frac{n}{n-\alpha}\right)^n$
4. $\left(\frac{n^2+5n+4}{n^2-3n+7}\right)^n$

Correction

$$1. \ln\left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n = n \ln\left(1 + \frac{\alpha}{n}\right) \sim n \cdot \frac{\alpha}{n} = \alpha$$

$$\text{Donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n = e^\alpha$$

$$2. \ln\left(\frac{n-1}{n+1}\right)^n = n \ln\left(\frac{n-1}{n+1}\right) = n \ln\left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \sim n\left(-\frac{2}{n+1}\right) \sim -2$$

$$\text{Donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^n = e^{-2}$$

$$3. \ln\left(\frac{n}{n-\alpha}\right)^n = n \ln\left(\frac{n}{n-\alpha}\right) = n \ln\left(1 + \frac{\alpha}{n-\alpha}\right) \sim n\left(\frac{\alpha}{n-\alpha}\right) \sim \alpha$$

$$\text{Donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{n-\alpha}\right)^n = e^\alpha$$

$$4. \ln\left(\frac{n^2+5n+4}{n^2-3n+7}\right)^n = n \ln\left(\frac{n^2+5n+4}{n^2-3n+7}\right) = n \ln\left(\frac{n^2-3n+7+8n-3}{n^2-3n+7}\right) \\ = n \ln\left(1 + \frac{8n-3}{n^2-3n+7}\right) \sim n\left(\frac{8n-3}{n^2-3n+7}\right) \sim n \cdot \frac{8n}{n^2} \sim 8$$

$$\text{Donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n^2+5n+4}{n^2-3n+7}\right)^n = e^8$$

Exercice 15 – ★

$$\text{Soit } u_n = \sum_{k=0}^n k!$$

1. Montrer que $u_{n-2} \underset{+\infty}{=} o(n!)$
2. Montrer que $u_n \sim n!$

Correction

$$1. u_{n-2} = \sum_{k=0}^{n-2} k! = n! \sum_{k=0}^{n-2} \frac{k!}{n!} \leq n! \sum_{k=0}^{n-2} \frac{(n-2)!}{n!} \leq n! \sum_{k=0}^{n-2} \frac{1}{(n-1)n} = n! \cdot \frac{n-1}{(n-1)n}$$

$$\text{Donc } u_{n-2} \leq (n-1)! \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n-2}}{n!} = 0 \text{ ainsi } \boxed{u_{n-2} \underset{+\infty}{=} o(n!)}$$

$$2. u_n = u_{n-2} + (n-1)! + n!$$

$$\text{Or } u_{n-2} \underset{+\infty}{=} o(n!) \text{ et } (n-1)! \underset{+\infty}{=} o(n!)$$

$$\text{Donc } u_n = n! + o(n!) \text{ donc } \boxed{u_n \sim n!}$$

Exercice 16 - ★★

Soit $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$

1. Montrer que $\frac{1}{\sqrt{n}} \geq 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$
2. En déduire que $S_n \rightarrow +\infty$
3. On pose $u_n = S_n - 2\sqrt{n}$. Montrer que (u_n) est convergente.
4. En déduire un équivalent de S_n

Correction

1. $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{n+1-n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \leq \frac{1}{2\sqrt{n}}$

Donc $\frac{1}{\sqrt{n}} \geq 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$

2. $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \geq S_n = \sum_{k=1}^n 2(\sqrt{k+1} - \sqrt{k}) = 2\sqrt{n+1} - 2 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$

Donc $S_n \rightarrow +\infty$

3. On va montrer que (u_n) est **décroissante** et **minorée**.

$u_n = S_n - 2\sqrt{n} \geq 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) - 2 \geq -2$

Donc (u_n) est minorée par -2

$u_{n+1} - u_n = S_{n+1} - S_n - 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$

Or $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \geq \frac{1}{2\sqrt{n+1}}$

Donc $\frac{1}{\sqrt{n+1}} \leq 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ donc $\frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \leq 0$

Donc $u_{n+1} - u_n \leq 0$ donc (u_n) est décroissante.

On en déduit que (u_n) est convergente.

4. On sait que $\sqrt{n} \rightarrow +\infty$ et que $u_n \rightarrow L \in \mathbb{R}$ donc $u_n = o(\sqrt{n})$

Ainsi $S_n = 2\sqrt{n} + u_n = 2\sqrt{n} + o(\sqrt{n})$

Donc $S_n \sim 2\sqrt{n}$

Exercice 17 - ★★

Soit $u_n = \sqrt{n + \sqrt{n-1 + \sqrt{\dots + \sqrt{2 + \sqrt{1}}}}}$

1. Calculer u_1, u_2, u_3
2. Montrer que $u_n \rightarrow +\infty$
3. Montrer que $u_{n+1} \leq n+1$
4. Montrer que $u_n = \mathcal{O}(\sqrt{n})$
5. Montrer que $u_n = o(n)$
6. En déduire un équivalent de u_n
7. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - \sqrt{n}$

Correction

1. $u_1 = 1$ $u_2 = \sqrt{2 + \sqrt{1}} = \sqrt{3}$ $u_3 = \sqrt{3 + \sqrt{2 + \sqrt{1}}} = \sqrt{3 + \sqrt{3}}$

2. $u_n = \sqrt{n + \sqrt{n-1 + \sqrt{\dots + \sqrt{2 + \sqrt{1}}}}} \geq \sqrt{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$

Donc $u_n \rightarrow +\infty$

3. On le démontre par récurrence :

Initialisation : $u_1 = 1 \leq 1$

Hérédité : On suppose $u_n \leq n$

$u_{n+1} = \sqrt{n+1 + u_n} \leq \sqrt{2n+1} \leq \sqrt{n^2 + 2n + 1} = n+1$

Donc $u_{n+1} \leq n+1$ donc $\forall n \geq 1, u_{n+1} \leq n+1$

4. $u_n = \sqrt{n + u_{n-1}} \leq \sqrt{n + n-1} \leq \sqrt{2n}$

Donc $0 \leq \frac{u_n}{\sqrt{n}} \leq \sqrt{2}$ donc $u_n = \mathcal{O}(\sqrt{n})$

5. On a ainsi $\frac{u_n}{n} = \mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{n} = 0$ (Grand O d'une fonction qui tend vers 0)

Ainsi $u_n = o(n)$

6. $u_{n+1}^2 = n+1 + u_n = n+1 + o(n) = n + o(n)$, donc $u_{n+1}^2 \sim n \sim n+1$

Ainsi $u_{n+1} \sim \sqrt{n+1}$ et donc $u_n \sim \sqrt{n} \sim \sqrt{n-1} \sim u_{n-1}$

7. $u_n - \sqrt{n} = \sqrt{n + u_{n-1}} - \sqrt{n} = \sqrt{n} \left(\sqrt{1 + \frac{u_{n-1}}{n}} - 1 \right)$ et puisque $u_n = o(n)$ on a $u_{n-1} = o(n-1) = o(n)$ et donc $\sqrt{1 + \frac{u_{n-1}}{n}} - 1 \sim \frac{u_{n-1}}{2n}$

Ainsi $u_n - \sqrt{n} \sim \frac{u_{n-1}}{2\sqrt{n}} \sim \frac{1}{2}$

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - \sqrt{n} = \frac{1}{2}$

Exercice 18 – ★★

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation $x - \ln x = n$ admet une unique solution dans $[1, +\infty[$ que l'on note u_n . Donc $u_n - \ln(u_n) = n$.
2. Montrer que $n \leq u_n \leq 2n$
3. En déduire que $u_n \sim n$
4. Montrer que $u_n \underset{+\infty}{=} n + \ln n + \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)$

Correction

1. Soit $f(x) = x - \ln x$, $f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$, $\forall x > 1, f'(x) > 0$ donc f est strictement croissante sur $]1, +\infty[$ et pour $x \in [1, +\infty[, f'(x) = 0 \iff x = 1$ donc f est strictement croissante sur $[1, +\infty[$. De plus f est continue sur $[1, +\infty[$ et $f(1) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, donc f est bijective de $[1, +\infty[$ dans $[1, +\infty[$.

Ainsi pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, l'équation $x - \ln x = n$ admet une unique solution dans $[1, +\infty[$.

2. f est croissante et $f(n) = n - \ln n < n = f(u_n)$ donc $\boxed{n \leq u_n}$

On pose pour $x \geq 1$, $g(x) = x - \ln 2x$, alors $g'(x) = 1 - \frac{1}{x} \geq 0$ et $g(1) = 1 - \ln 2 > 0$ donc $\forall x \geq 1, g(x) > 0$ donc $\forall n \in \mathbb{N}^*, n > \ln 2n$

Ainsi $\forall n \in \mathbb{N}^*, f(2n) = 2n - \ln 2n > n = f(u_n)$, donc $\boxed{u_n \leq 2n}$

3. On en déduit $n \leq u_n \leq n + \ln u_n \leq n + \ln 2n$

Ainsi $1 \leq \frac{u_n}{n} \leq 1 + \frac{\ln 2n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1$, d'où $\boxed{u_n \sim n}$

4. On pose $v_n = u_n - n$, on a alors $v_n = \ln(u_n) = \ln\left(n \cdot \frac{u_n}{n}\right) = \ln n + \ln\left(\frac{u_n}{n}\right)$

Or $u_n \sim n$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{u_n}{n}\right) = 0$, donc $\ln\left(\frac{u_n}{n}\right) \underset{+\infty}{=} o(\ln n)$

Donc $v_n \underset{+\infty}{=} \ln n + o(\ln n)$ donc $\boxed{v_n \sim \ln n}$ donc $u_n \underset{+\infty}{=} n + \ln n + o(\ln n)$ On pose

$$w_n = v_n - \ln n = \ln\left(\frac{u_n}{n}\right) \underset{+\infty}{=} \ln\left(\frac{n + \ln n + o(\ln n)}{n}\right) \underset{+\infty}{=} \ln\left(1 + \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)\right)$$

$$\text{Et } \ln\left(1 + \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)\right) \underset{+\infty}{=} \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right) + o\left(\frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)\right) \underset{+\infty}{=} \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)$$

$$\text{Donc } w_n \underset{+\infty}{=} \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)$$

$$\text{et } \boxed{u_n = n + v_n = n + \ln n + w_n \underset{+\infty}{=} n + \ln n + \frac{\ln n}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)}$$

Exercice 19 – ★★ Relation de comparaison sur les séries divergentes

Soit $(u_n), (v_n)$ deux suites, avec (v_n) positive et $U_n = \sum_{k=1}^n u_k, V_n = \sum_{k=1}^n v_k$.

On suppose que $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = +\infty$.

1. Montrer que $u_n \underset{+\infty}{=} o(v_n) \implies U_n \underset{+\infty}{=} o(V_n)$
2. En déduire que si $u_n \sim v_n$ alors $U_n \sim V_n$

Correction

1. Soit (u_n) telle que $u_n \underset{+\infty}{=} o(v_n)$. Soit $\varepsilon > 0$ on a alors $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0 \quad |u_n| \leq \varepsilon v_n$

$$\text{Donc } U_n = \sum_{k=1}^n u_k = \sum_{k=1}^{n_0} u_k + \sum_{k=n_0+1}^n u_k \leq \sum_{k=1}^{n_0} u_k + \varepsilon \sum_{k=n_0+1}^n v_k \leq \sum_{k=1}^{n_0} u_k + \varepsilon V_n$$

$$\text{Or } \lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = +\infty \text{ donc } \exists n_1 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_1, \sum_{k=1}^{n_0} u_k \leq \varepsilon V_n$$

$$\text{On en déduit que } \forall n \geq \max(n_1, n_0), \quad U_n \leq 2\varepsilon V_n$$

$$\text{Ce qui montre } \boxed{U_n \underset{+\infty}{=} o(V_n)}$$

2. Soit $u_n \sim v_n$, donc $u_n - v_n \underset{+\infty}{=} o(v_n)$ donc d'après la question 1, $U_n - V_n \underset{+\infty}{=} o(V_n)$

$$\text{Et ainsi } \boxed{U_n \sim V_n}$$

Développements limités**Exercice 20 – ★ Un premier développement limité en a**

Donner le développement limité à l'ordre 3 en 3 de $f : x \mapsto \frac{3}{x}$.

Correction

$$\text{On pose } x = 3 + t, \text{ alors } f(x) = \frac{3}{3+t} = \frac{1}{1+\frac{t}{3}} \underset{0}{=} 1 - \frac{t}{3} + \frac{t^2}{9} - \frac{t^3}{27} + o(t^3)$$

$$\text{Donc } \boxed{f(x) \underset{3}{=} 1 - \frac{x-3}{3} + \frac{(x-3)^2}{9} - \frac{(x-3)^3}{27} + o((x-3)^3)}$$

Exercice 21 – ★ *Un premier développement limité en $+\infty$*

Donner le développement limité à l'ordre 3 en $+\infty$ de $f : x \mapsto \frac{x}{x-2}$.

Correction

On pose $t = \frac{1}{x}$, donc $f(x) = \frac{\frac{1}{t}}{\frac{1}{t} - 2} = \frac{1}{1 - 2t} \underset{0}{=} 1 + 2t + (2t)^2 + (2t)^3 + o((2t)^3)$

Donc $f(x) \underset{+\infty}{=} 1 + \frac{2}{x} + \frac{4}{x^2} + \frac{8}{x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right)$

Exercice 22 – ★ *Formule de Taylor-Young*

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$, de classe \mathcal{C}_I^2 . Soit $x \in I$.

Calculer $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x-h) - 2f(x) + f(x+h)}{h^2}$.

Correction

D'après la formule de Taylor-Young, $f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + o(h^2)$

Ainsi $\frac{f(x-h) - 2f(x) + f(x+h)}{h^2} = \frac{h^2 f''(x) + o(h^2)}{h^2} = f''(x) + o(1)$

Donc $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x-h) - 2f(x) + f(x+h)}{h^2} = f''(x)$

Exercice 23 – ★★ Formule de Taylor-Young

Soit f une fonction positive de classe $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}^2$

1. Soit $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $f(x_0) = 0$. Que peut-on dire de $f'(x_0)$ et $f''(x_0)$?
2. Démontrer que $g : x \mapsto \sqrt{f(x)}$ est dérivable en x_0 si et seulement si $f''(x_0) = 0$

Correction

1. $f \geq 0$ et $f(x_0) = 0$ donc x_0 est un minimum local, qui n'est pas une borne de l'intervalle de définition de f , donc $f'(x_0) = 0$

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{h^2}{2}f''(x_0) + o(h^2) = \frac{h^2}{2}f''(x_0) + o(h^2) \geq 0$$

$$\text{Donc si } f''(x_0) \neq 0, f(x_0 + h) \sim \frac{h^2}{2}f''(x_0) \text{ donc } \frac{f(x_0 + h)}{h^2} \sim \frac{f''(x_0)}{2}$$

$$\text{Or } \frac{f(x_0 + h)}{h^2} \geq 0 \text{ donc } f''(x_0) \geq 0$$

2. **On ne peut pas directement utiliser** la dérivée d'une composée, en effet cela

$$\text{donnerait : } g'(x_0) = \frac{f'(x_0)}{2\sqrt{f'(x_0)}}, \text{ or } f'(x_0) = 0, \text{ donc il y a division par 0.}$$

$$\text{Si } f''(x_0) > 0 \text{ alors } \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = \frac{\sqrt{f(x)} - \sqrt{f(x_0)}}{x - x_0} \sim \frac{|x - x_0|}{\sqrt{2}(x - x_0)} \sqrt{f''(x_0)}$$

$$\text{Ce qui signifie que } \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = \sqrt{\frac{f''(x_0)}{2}}$$

$$\text{et } \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = -\sqrt{\frac{f''(x_0)}{2}}$$

$$\text{Donc } g \text{ n'est pas dérivable en } x_0, \text{ on a montré } g \text{ dérivable en } x_0 \implies f''(x_0) = 0$$

$$\text{Si } f''(x_0) = 0 \text{ alors } f(x_0 + h) = o(h^2) \text{ donc } f(x) = o((x - x_0)^2)$$

$$\text{donc } \sqrt{f(x)} = o(x - x_0)$$

$$\text{Ainsi } \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = \frac{\sqrt{f(x)}}{x - x_0} = \frac{o(x - x_0)}{x - x_0} = o(1) \text{ ce qui signifie que}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = 0$$

$$\text{Donc } g \text{ est dérivable. On a montré } f''(x_0) = 0 \implies g \text{ est dérivable en } x_0$$

Exercice 24 – ★ Somme et produit de développements limités en 0.

Calculer les développements limités en 0 suivants :

1. $\frac{1}{1-x} - e^x$ à l'ordre 3.
2. $\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}$ à l'ordre 4.
3. $\sin x \cos 2x$ à l'ordre 6.
4. $\cos x \ln(1+x)$ à l'ordre 4.
5. $(1+x^3)\sqrt{1-x}$ à l'ordre 3.
6. $\ln^2(1+x)$ à l'ordre 4.

Correction

$$1. \frac{1}{1-x} - e^x \underset{0}{=} 1 + x + x^2 + x^3 + o(x^3) - \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right)$$

$$\frac{1}{1-x} - e^x \underset{0}{=} \frac{x^2}{2} + \frac{2x^3}{3} + o(x^3)$$

$$2. \sqrt{1+x} - \sqrt{1-x} \underset{0}{=} 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} - \left(1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128}\right) + o(x^4)$$

$$\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x} \underset{0}{=} x + \frac{x^3}{8} + o(x^4)$$

$$3. \sin x \cos 2x \underset{0}{=} \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^6)\right) \left(1 - \frac{(2x)^2}{2} + \frac{(2x)^4}{24} + o(x^5)\right)$$

$$\sin x \cos 2x \underset{0}{=} x + \left(-\frac{1}{6} - 2\right)x^3 + \left(\frac{1}{120} + \frac{2}{6} + \frac{2}{3}\right)x^5 + o(x^6)$$

$$\sin x \cos 2x \underset{0}{=} x - \frac{13x^3}{6} + \frac{121x^5}{120} + o(x^6)$$

$$4. \cos x \ln(1+x) \underset{0}{=} \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)\right) \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4)\right)$$

$$\cos x \ln(1+x) \underset{0}{=} x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} + o(x^4)$$

$$5. (1+x^3)\sqrt{1-x} \underset{0}{=} (1+x^3) \left(1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{16} + o(x^3)\right) \underset{0}{=} 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{15x^3}{16} + o(x^3)$$

$$(1+x^3)\sqrt{1-x} \underset{0}{=} 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{15x^3}{16} + o(x^3)$$

$$6. \ln^2(1+x) \underset{0}{=} \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right)^2 \underset{0}{=} x^2 - x^3 + \frac{11x^4}{12} + o(x^4)$$

Exercice 25 – ★ Développements limités de fonctions composées en 0.

Calculer les développements limités en 0 suivants :

1. $\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right)$ à l'ordre 4.
2. $e^{\sin x}$ à l'ordre 4.
3. $(\cos x)^{\sin x}$ à l'ordre 5.
4. $x(\cosh x)^{\frac{1}{x}}$ à l'ordre 4.

Correction

1. On pose $u = \frac{\sin x}{x} - 1 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$, $u(x) = \frac{x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)}{x} - 1 = -\frac{x^2}{6} + o(x^2)$

Donc $u \underset{0}{\sim} -\frac{x^2}{6}$ donc $o(u^2(x)) = o(x^4)$, on calcule donc jusqu'à $o(u^2)$

$$\ln 1 + u \underset{0}{\sim} u - \frac{u^2}{2} + o(u^2).$$

$$u = \frac{x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)}{x} - 1 = -\frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} + o(x^4)$$

$$u^2 = \left(-\frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} + o(x^4)\right)^2 = \frac{x^4}{36} + o(x^4)$$

$$\text{Donc } \boxed{\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right) \underset{0}{=} -\frac{x^2}{6} - \frac{x^4}{180} + o(x^4)}$$

2. On pose $u = \sin x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$ donc fait un développement en $u = 0$ de e^u

$\sin x \underset{0}{\sim} x$ donc $u \underset{0}{\sim} x$ donc $o(u^3) = o(x^3)$, on doit donc calculer jusqu'à $o(u^3)$.

$e^{\sin x} = e^u \underset{0}{=} 1 + u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{6} + o(u^3)$ on fait le calcul pour chaque puissance de u :

$$u = \sin x \underset{0}{=} x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$u^2 = (\sin x)^2 \underset{0}{=} \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)^2 = x^2 + o(x^3)$$

$$u^3 = (\sin x)^3 \underset{0}{=} \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)^3 = x^3 + o(x^3)$$

$$\text{Donc } e^{\sin x} \underset{0}{=} 1 + x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3) = \boxed{1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^3)}$$

3. $(\cos x)^{\sin x} = \exp(\sin x \ln \cos x)$, on pose $u = \sin x \ln \cos x \underset{0}{\sim} x(\cos x - 1) \underset{0}{\sim} -\frac{x^3}{2}$

Donc $u^2 \underset{0}{\sim} x^6 = o(x^5)$, donc on calcule jusqu'à $o(u)$

$$e^u \underset{0}{=} 1 + u + o(u)$$

$$u = \sin x \ln(\cos x) \underset{0}{=} \sin x \ln\left(1 - \underbrace{\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)}_v\right)$$

$v = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5) \underset{0}{\sim} -\frac{x^2}{2}$ donc $v^3 \underset{0}{\sim} x^6 = o(x^5)$ donc on calcule jusqu'à $o(v^2)$

$$\ln(1 + v) \underset{0}{=} v - \frac{v^2}{2} + o(v^2)$$

$$v \underset{0}{=} -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)$$

$$v^2 \underset{0}{=} \left(-\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)\right)^2 = \frac{x^4}{4} + o(x^5)$$

$$\text{Donc } \ln(1 + v) \underset{0}{=} -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + o(x^5) \underset{0}{\sim} -\frac{x^2}{2}$$

On a donc besoin de développer $\sin x$ jusqu'à $o(x^3)$ car $o(x^3) \cdot \frac{x^2}{2} = o(x^5)$

$$\text{Donc } u \underset{0}{=} \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) \left(-\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + o(x^5)\right) = -\frac{x^3}{2} + o(x^5)$$

$$\text{Ainsi } \boxed{(\cos x)^{\sin x} \underset{0}{=} 1 - \frac{x^3}{2} + o(x^5)}$$

4. $(\cosh x)^{\frac{1}{x}} = \exp\left(\frac{1}{x} \ln \cosh x\right)$

$$\text{On pose } u = \frac{1}{x} \ln \cosh x \underset{0}{=} \frac{1}{x} \ln\left(1 + \underbrace{\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)}_v\right)$$

$v \underset{0}{\sim} \frac{x^2}{2}$ donc $v^3 \underset{0}{\sim} x^6 = o(x^5)$ donc on calcule jusqu'à $o(v^2)$

$$\ln(1 + v) \underset{0}{=} v - \frac{v^2}{2} + o(v^2)$$

$$v \underset{0}{=} \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)$$

$$v^2 \underset{0}{=} \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)\right)^2 = \frac{x^4}{4}$$

$$\ln\left(1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)\right) \underset{0}{=} \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + o(x^5)$$

$$\text{d'où } u = \frac{x}{2} - \frac{x^3}{12} + o(x^4) \underset{0}{\sim} \frac{x}{2}$$

$e^u \underset{0}{=} 1 + u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{6} + o(u^3)$, on va multiplier par x ensuite, donc $o(u^3) \underset{0}{=} o(x^3)$ suffit.

$$u \underset{0}{=} \frac{x}{2} - \frac{x^3}{12} + o(x^4) = \frac{x}{2} - \frac{x^3}{12} + o(x^3)$$

$$u^2 \underset{0}{=} \left(\frac{x}{2} - \frac{x^3}{12} + o(x^3) \right)^2 \underset{0}{=} \frac{x^2}{4} + o(x^3)$$

$$u^3 \underset{0}{=} \left(\frac{x}{2} - \frac{x^3}{12} + o(x^3) \right)^3 \underset{0}{=} \frac{x^3}{8} + o(x^3)$$

$$e^u \underset{0}{=} 1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{16} + o(x^3)$$

Et ainsi $\boxed{x(\cosh x)^{\frac{1}{x}} \underset{0}{=} x e^u \underset{0}{=} x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{8} - \frac{x^4}{16} + o(x^4)}$

Exercice 26 – ★ Développement limité d'un quotient en 0.

Calculer les développements limités en 0 suivants :

1. $\frac{1}{1+x+x^2}$ à l'ordre 4.
2. $\frac{\sin^2 x}{x^2}$ à l'ordre 4.
3. $\frac{\sin x - 1}{\cos x + 1}$ à l'ordre 2.
4. $\frac{\ln(1+x)}{\sin x}$ à l'ordre 3.

Correction

1. $\frac{1}{1+x+x^2} = \frac{1}{1+u}$, $u = x + x^2 \underset{0}{\sim} x$ donc on doit calculer jusqu'à u^4

$$u = x + x^2$$

$$u^2 = (x + x^2)^2 = x^2 + 2x^3 + x^4$$

$$u^3 = (x + x^2)^3 \underset{0}{=} x^3 + 3x^4 + o(x^4)$$

$$u^4 = (x + x^2)^4 \underset{0}{=} x^4 + o(x^4)$$

$$\frac{1}{1+u} \underset{0}{=} -u + u^2 - u^3 + u^4 + o(u^4) \underset{0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)$$

Donc $\boxed{\frac{1}{1+x+x^2} \underset{0}{=} 1 - x + x^3 - x^4 + o(x^4)}$

2. On doit calculer le DL de $\sin^2 x$ jusqu'à x^6 car on va diviser par x^2 .

$$\sin^2 x \underset{0}{=} \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^6) \right)^2 \underset{0}{=} x^2 - \frac{x^4}{3} + \frac{2x^6}{45} + o(x^6)$$

Donc $\boxed{\frac{\sin^2 x}{x^2} \underset{0}{=} x - \frac{x^2}{3} + \frac{2x^4}{45} + o(x^4)}$

3. $\frac{\sin x - 1}{\cos x + 1} \underset{0}{=} \frac{x - 1 + o(x^2)}{2 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)} \underset{0}{=} \frac{1}{2} \cdot \frac{-1 + x + o(x^2)}{1 - \frac{x^2}{4} + o(x^2)}$
 $\underset{0}{=} \frac{1}{2} (-1 + x + o(x^2)) \left(1 + \frac{x^2}{4} + o(x^2) \right) \underset{0}{=} -\frac{1}{2} + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$

4. $\frac{\ln(1+x)}{\sin x} \underset{0}{=} \frac{x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4)}{x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)} \underset{0}{=} \frac{1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + o(x^3)}{1 - \frac{x^2}{6} + o(x^3)}$
 $\underset{0}{=} \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + o(x^3) \right) \left(1 + \frac{x^2}{6} + o(x^3) \right)$

$\boxed{\underset{0}{=} 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + o(x^3)}$

Exercice 27 – ★ Intégration de développements limités

Calculer à l'aide d'intégrations les développements limités en 0 suivants :

1. $\tan x$ à l'ordre 7.
2. $\arccos x$ à l'ordre 5.
3. $\operatorname{Argth} x$ à l'ordre 5.
4. $\operatorname{Argsh} x$ à l'ordre 5.

Correction

$$1. \tan x = x + o(x) \text{ donc } \tan' x = 1 + \tan^2 x = 1 + (x + o(x))^2 = 1 + x^2 + o(x^2)$$

$$\text{Donc } \tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \text{ donc}$$

$$\tan' x = 1 + \tan^2 x = 1 + \left(x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)\right)^2 = 1 + x^2 + \frac{2x^4}{3} + o(x^4)$$

$$\text{Donc } \tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5) \text{ donc}$$

$$\tan' x = 1 + \tan^2 x = 1 + \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5)\right)^2 = 1 + x^2 + \frac{2x^4}{3} + \frac{17x^6}{45} + o(x^6)$$

$$\text{Donc } \tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + o(x^7)$$

$$2. \arccos'(x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} = -(1-x^2)^{-\frac{1}{2}} = -\left(1 + \frac{x^2}{2} + \frac{3x^4}{8} + o(x^5)\right)$$

$$\text{Donc } \arccos(x) = \frac{\pi}{2} - x - \frac{x^3}{6} - \frac{3x^5}{40} + o(x^5)$$

$$3. \operatorname{Argth}'(x) = \frac{1}{1-x^2} = 1 + x^2 + x^4 + o(x^4)$$

$$\text{Donc } \operatorname{Argth}(x) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^5)$$

$$4. \operatorname{Argsh}'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = (1+x^2)^{-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{3x^4}{8} + o(x^4)$$

$$\text{Donc } \operatorname{Argsh}(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + o(x^5)$$

Exercice 28 – ★ Développements limités en a

Calculer les développements limités suivants :

1. e^x en 1 à l'ordre 3.
2. $\ln x$ en 2 à l'ordre 3.
3. $\cos x$ en $\frac{\pi}{3}$ à l'ordre 3.
4. \sqrt{x} en 2 à l'ordre 3.
5. $\tan x$ en $\frac{\pi}{4}$ à l'ordre 3.
6. $\arcsin x$ en $\frac{1}{2}$ à l'ordre 3.

Correction

$$1. \text{ On pose } x = 1 + t \text{ donc } e^x = e^{1+t} = e \cdot e^t = e \cdot \left(1 + t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{6} + o(t^3)\right)$$

$$\text{Donc } e^x = e + e(x-1) + \frac{e(t-1)^2}{2} + \frac{e(t-1)^3}{6} + o((x-1)^3)$$

$$2. \text{ On pose } x = 2 + 2t, \ln(x) = \ln 2 + \ln(1+t) = \ln 2 + t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} + o(t^3)$$

$$\text{Or } t = \frac{x-2}{2} \text{ donc } \ln x = \ln 2 + \frac{x-2}{2} - \frac{(x-2)^2}{8} + \frac{(x-2)^3}{24} + o((x-2)^3)$$

$$3. \text{ On pose } t = x - \frac{\pi}{3}, \cos x = \cos\left(\frac{\pi}{3} + t\right) = \frac{\cos t}{2} - \frac{\sqrt{3} \sin t}{2}$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{3} + t\right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{t^2}{2} + o(t^3)\right) - \frac{\sqrt{3}}{2} \left(t - \frac{t^3}{6} + o(t^3)\right)$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{3} + t\right) = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}t}{2} - \frac{t^2}{4} + \frac{\sqrt{3}t^3}{12} + o(t^3)$$

$$\text{Donc } \cos x = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}(x-\frac{\pi}{3})}{2} - \frac{(x-\frac{\pi}{3})^2}{4} + \frac{\sqrt{3}(x-\frac{\pi}{3})^3}{12} + o((x-\frac{\pi}{3})^3)$$

$$4. \text{ On pose } t = x - 2, \sqrt{x} = \sqrt{2+t} = \sqrt{2} \left(1 + \frac{t}{2}\right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2} \left(1 + \frac{t}{4} - \frac{t^2}{32} + \frac{t^3}{128} + o(t^3)\right)$$

$$\text{Donc } \sqrt{x} = \sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}(x-2)}{4} - \frac{\sqrt{2}(x-2)^2}{32} + \frac{\sqrt{2}(x-2)^3}{128} + o((x-2)^3)$$

$$5. \text{ On pose } t = x - \frac{\pi}{4}, \tan x = \tan\left(\frac{\pi}{4} + t\right) = \frac{1 + \tan t}{1 - \tan t}$$

$$\text{On pose } u = \tan t \sim t, \frac{1 + \tan t}{1 - \tan t} = \frac{1+u}{1-u} = (1+u)(1+u+u^2+u^3+o(u^3))$$

$$\frac{1+u}{1-u} = 1 + 2u + 2u^2 + 2u^3 + o(u^3)$$

$$u = \tan t = t + \frac{t^3}{3} + o(t^3)$$

$$u^2 = \left(t + \frac{t^3}{3} + o(t^3) \right)^2 = t^2 + o(t^3)$$

$$u^3 = \left(t + \frac{t^3}{3} + o(t^3) \right)^3 = t^3 + o(t^3)$$

$$\text{Donc } \frac{1 + \tan t}{1 - \tan t} = 1 + 2t + 2t^2 + \frac{8t^3}{3} + o(t^3)$$

$$\text{Donc } \tan x = 1 + 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^2 + \frac{8}{3}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^3 + o\left(\left(x - \frac{\pi}{4}\right)^3\right)$$

$$6. \text{ On pose } t = x - \frac{1}{2}, \arcsin'(x) = \arcsin'\left(t + \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(t + \frac{1}{2}\right)^2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1 - \left(t + \frac{1}{2}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{3}{4} - t - t^2}} = \frac{2}{\sqrt{3}\sqrt{1 - \frac{4}{3}(t + t^2)}}$$

$$\text{On pose } u = \frac{4}{3}(t + t^2) \sim \frac{4t}{3}$$

$$\frac{2}{\sqrt{3}\sqrt{1 - \frac{4}{3}(t + t^2)}} = \frac{2}{\sqrt{3}\sqrt{1 - u}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \left(1 + \frac{u}{2} + \frac{3u^2}{8} + o(u^2) \right)$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{u}{\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{3}u^2}{4} + o(u^2)$$

$$u = \frac{4}{3}(t + t^2)$$

$$u^2 = \left(\frac{4}{3}(t + t^2) \right)^2 = \frac{16}{9}t^2 + \frac{32}{9}t^3 + o(t^3)$$

$$\text{Donc } \arcsin'\left(t + \frac{1}{2}\right) = \frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{4t}{3\sqrt{3}} + \frac{4t^2}{3\sqrt{3}} + \frac{4t^2}{3\sqrt{3}} + o(t^2)$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{4t}{3\sqrt{3}} + \frac{8t^2}{3\sqrt{3}} + o(t^2)$$

$$\text{Donc } \arcsin\left(t + \frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{6} + \frac{2t}{\sqrt{3}} + \frac{2t^2}{3\sqrt{3}} + \frac{8t^3}{9\sqrt{3}} + o(t^3)$$

$$\text{Donc } \arcsin(x) = \frac{\pi}{6} + \frac{2\left(x - \frac{1}{2}\right)}{\sqrt{3}} + \frac{2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2}{3\sqrt{3}} + \frac{8\left(x - \frac{1}{2}\right)^3}{9\sqrt{3}} + o\left(\left(x - \frac{1}{2}\right)^3\right)$$

Exercice 29 – ★ Développement en $+\infty$

Calculer les développements suivants en $+\infty$:

$$1. \frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x}} \text{ à l'ordre 3.}$$

$$3. (x^3 + x)^{\frac{1}{3}} - (x^3 - x)^{\frac{1}{3}} \text{ à l'ordre 4.}$$

$$2. \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \ln x \text{ à l'ordre 4.}$$

$$4. x\left(\sqrt{x^2 + \sqrt{x^4 + 1}} - x\sqrt{2}\right) \text{ à l'ordre 2}$$

Correction

Dans tout l'exercice, $x > 0$

$$1. \text{ On pose } t = \frac{1}{x}, \frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{\frac{1}{t}+2}}{\sqrt{\frac{1}{t}}} = \sqrt{2+t} = \sqrt{2}\left(1 + \frac{t}{2}\right)^{\frac{1}{2}}$$

$$= \sqrt{2}\left(1 + \frac{t}{4} - \frac{t^2}{32} + \frac{t^3}{128} + o(t^3)\right)$$

$$\text{Donc } \frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x}} = \sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{4x} - \frac{\sqrt{2}}{32x^2} + \frac{\sqrt{2}}{128x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right)$$

$$2. \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \ln x = \ln 2x + \ln\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{1+x^2}}{2x}\right) - \ln x = \ln 2 + \ln\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}}{2}\right)$$

$$= \ln 2 + \ln\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{2x^2} - \frac{1}{8x^4} + o\left(\frac{1}{x^4}\right)\right)\right)$$

$$= \ln 2 + \ln\left(1 + \frac{1}{4x^2} - \frac{1}{16x^4} + o\left(\frac{1}{x^4}\right)\right)$$

$$= \ln 2 + \frac{1}{4x^2} - \frac{1}{16x^4} - \frac{1}{32x^4} + o\left(\frac{1}{x^4}\right)$$

$$= \ln 2 + \frac{1}{4x^2} - \frac{3}{32x^4} + o\left(\frac{1}{x^4}\right)$$

$$3. (x^3 + x)^{\frac{1}{3}} - (x^3 - x)^{\frac{1}{3}} = x\left((1+x^{-2})^{\frac{1}{3}} - (1-x^{-2})^{\frac{1}{3}}\right)$$

$$\text{On pose } t = \frac{1}{x}, (1+t^2)^{\frac{1}{3}} = 1 + \frac{t^2}{3} - \frac{t^4}{9} + o(t^5)$$

$$(1-t^2)^{\frac{1}{3}} = 1 - \frac{t^2}{3} - \frac{t^4}{9} + o(t^5)$$

$$\text{Donc } \frac{1}{t}\left((1+t^2)^{\frac{1}{3}} - (1-t^2)^{\frac{1}{3}}\right) = \frac{1}{t}\left(\frac{2t^2}{3} + o(t^5)\right) = \frac{2t}{3} + o(t^4)$$

$$\text{Donc } (x^3 + x)^{\frac{1}{3}} - (x^3 - x)^{\frac{1}{3}} = \frac{2}{3x} + o\left(\frac{1}{x^4}\right)$$

$$\begin{aligned}
4. \quad x \left(\sqrt{x^2 + \sqrt{x^4 + 1}} - x\sqrt{2} \right) &= x \left(x\sqrt{1 + \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}}} - x\sqrt{2} \right) \\
\sqrt{1 + \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}}} &\underset{+\infty}{=} \sqrt{1 + 1 + \frac{1}{2x^4} + o\left(\frac{1}{x^4}\right)} \underset{+\infty}{=} \sqrt{2} \sqrt{1 + \frac{1}{4x^4} + o\left(\frac{1}{x^4}\right)} \\
&\underset{+\infty}{=} \sqrt{2} \left(1 + \frac{1}{8x^4} + o\left(\frac{1}{x^4}\right) \right) = \sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{8x^4} + o\left(\frac{1}{x^4}\right) \\
\text{Donc } \boxed{x \left(\sqrt{x^2 + \sqrt{x^4 + 1}} - x\sqrt{2} \right) &\underset{+\infty}{=} \frac{\sqrt{2}}{8x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)}
\end{aligned}$$

Exercice 30 – ★ Développement limité à l'ordre 100 !

Calculer le développement limité en 0 à l'ordre 100 de $\ln \left(\sum_{k=0}^{99} \frac{x^k}{k!} \right)$.

Correction

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{99} \frac{x^k}{k!} &= e^x - \sum_{k=100}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} \underset{0}{=} e^x - \frac{x^{100}}{100!} + o(x^{100}) \\
\ln \left(\sum_{k=0}^{99} \frac{x^k}{k!} \right) &\underset{0}{=} \ln \left(e^x - \frac{x^{100}}{100!} + o(x^{100}) \right) \underset{0}{=} x + \ln \left(1 - \frac{x^{100} e^{-x}}{100!} + o(x^{100} e^{-x}) \right) \\
&\underset{0}{=} x - \frac{x^{100} e^{-x}}{100!} + o(x^{100} e^{-x}) \underset{0}{=} x - \frac{x^{100} (1 + o(1))}{100!} + o(x^{100} (1 + o(1))) \\
&\underset{0}{=} x - \frac{x^{100}}{100!} + o(x^{100})
\end{aligned}$$

Exercice 31 – ★★ Développement limité d'une fonction réciproque

Soit $f : x \mapsto xe^{x^2}$.

1. Montrer que la fonction f est une bijection de \mathbb{R} dans \mathbb{R} .
2. Calculer le développement limité de f en 0 à l'ordre 4.
3. On admet que $f^{-1}(y)$ admet un développement limité en $y = 0$ à l'ordre 4, quelle est sa forme générale?
4. On pose $y = f(x)$, en utilisant $f^{-1}(y) = x$, déterminer le développement limité de $f^{-1}(y)$ en $y = 0$ à l'ordre 4?

Exercice 32 – ★★ Un développement limité intéressant

Soit $n \geq 1$ et $\forall x \neq 0, f(x) = \frac{\exp((n+1)x) - 1}{\exp(x) - 1}$, et $f(0) = a$, avec a tel que $f \in \mathcal{C}^0$

1. Déterminer a .
2. Calculer le développement limité de f à l'ordre 3 en 0.
3. Soit (a_p) la suite telle que $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m + o(x^m)$. Déterminer a_p .

Exercice 33 – ★ Calcul de limites grâce à un développement limité

Déterminer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2}$
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{\sinh x - x \cosh x}$
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$

Correction

$$1. \frac{\sin x - x}{x^3} \underset{0}{=} \frac{x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) - x}{x^3} \underset{0}{=} -\frac{1}{6} + o(1)$$

$$\text{Donc } \boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = -\frac{1}{6}}$$

$$2. \frac{1}{\sin^2 x} \underset{0}{=} \frac{1}{\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)^2} \underset{0}{=} \frac{1}{x^2} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2)\right)^2}$$

$$\underset{0}{=} \frac{1}{x^2} \left(1 + \frac{x^2}{6} + o(x^2)\right)^2 \underset{0}{=} \frac{1}{x^2} \left(1 + \frac{x^2}{3} + o(x^2)\right) \underset{0}{=} \frac{1}{x^2} + \frac{1}{3} + o(1)$$

$$\text{D'où } \boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} = \frac{1}{3}}$$

$$3. \frac{\sin x - x \cos x}{\sinh x - x \cosh x} \underset{0}{=} \frac{x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) - x \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right)}{x + \frac{x^3}{6} + o(x^3) - x \left(1 + \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right)}$$

$$\underset{0}{=} \frac{\frac{x^3}{3} + o(x^3)}{-\frac{x^3}{3} + o(x^3)} \underset{0}{=} \frac{\frac{1}{3} + o(1)}{-\frac{1}{3} + o(1)} \underset{0}{=} \frac{-1 + o(1)}{1 + o(1)} \underset{0}{=} (-1 + o(1))(1 + o(1)) \underset{0}{=} -1 + o(1)$$

$$\text{Donc } \boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{\sinh x - x \cosh x} = -1}$$

$$4. \ln \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = \frac{1}{x^2} \ln \left(\frac{\sin x}{x} \right) \underset{0}{=} \frac{1}{x^2} \ln \left(1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2) \right) \underset{0}{=} \frac{1}{x^2} \left(-\frac{x^2}{6} + o(x^2) \right) \underset{0}{=} -\frac{1}{6} + o(1)$$

$$\text{Donc } \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} \underset{0}{=} e^{-\frac{1}{6}} \cdot e^{o(1)} \underset{0}{=} e^{-\frac{1}{6}} (1 + o(1)) \underset{0}{=} e^{-\frac{1}{6}} + o(1)$$

$$\text{Donc } \boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = e^{-\frac{1}{6}}}$$

Exercice 34 – ★ Tangente en a

Dans chaque cas, donner l'équation de la tangente en a ainsi que la position de la courbe \mathcal{C}_f par rapport à la tangente.

1. $f(x) = \ln(\cos x)$ en $a = 0$
2. $f(x) = \frac{1}{1+e^x}$ en $a = 0$

Correction

$$1. \ln(\cos x) \underset{0}{=} \ln\left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) \underset{0}{=} -\frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

Donc $T_0 : y = 0$ et \mathcal{C}_f est au dessous de T_0 au voisinage de 0.

$$2. \frac{1}{1+e^x} \underset{0}{=} \frac{1}{2+x+\frac{x^2}{2}+o(x^2)} \underset{0}{=} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+\frac{x}{2}+\frac{x^2}{4}+\frac{x^3}{12}+o(x^3)}$$

On pose $u = \frac{x}{2} + \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{12} + o(x^3)$

$$u^2 \underset{0}{=} \left(\frac{x}{2} + \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{12} + o(x^3)\right)^2 \underset{0}{=} \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{4} + o(x^3)$$

$$u^3 \underset{0}{=} \left(\frac{x}{2} + \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{12} + o(x^3)\right)^3 \underset{0}{=} \frac{x^3}{8} + o(x^3)$$

$$\text{Ainsi } \frac{1}{1+e^x} \underset{0}{=} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+u} \underset{0}{=} \frac{1}{2} (1 - u + u^2 - u^3 + o(u^3))$$

$$\underset{0}{=} \frac{1}{2} \left(1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} - \frac{x^3}{12} + \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{4} - \frac{x^3}{8} + o(x^3)\right)$$

$$\underset{0}{=} \frac{1}{2} \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^3}{24} + o(x^3)\right) \underset{0}{=} \frac{1}{2} - \frac{x}{4} + \frac{x^3}{48} + o(x^3)$$

$$\text{Donc } T_0 : y = \frac{1}{2} - \frac{x}{4}$$

Au voisinage de 0, si $x < 0$ \mathcal{C}_f est en dessous de T_0 et si $x > 0$ \mathcal{C}_f est au dessus de T_0

Exercice 35 – ★ Asymptote en ∞

Soit $f(x) = \sqrt[3]{(x^2-2)(x+3)}$

1. Donner l'équation de l'asymptote à \mathcal{C}_f en $+\infty$, notée $\mathcal{D}_{+\infty}$. Quelle est la position de \mathcal{C}_f par rapport à $\mathcal{D}_{+\infty}$?
2. Donner l'équation de l'asymptote à \mathcal{C}_f en $-\infty$, notée $\mathcal{D}_{-\infty}$. Quelle est la position de \mathcal{C}_f par rapport à $\mathcal{D}_{-\infty}$?

Correction

1. On prend $x \neq 0$ et on pose $t = \frac{1}{x}$,

$$\sqrt[3]{(x^2-2)(x+3)} = \sqrt[3]{x^3+3x^2-2x-6} = \frac{1}{t} (1+3t-2t^2-6t^3)^{\frac{1}{3}}$$

On pose $u = 3t - 2t^2 - 6t^3 \underset{0}{\sim} 3t$

$$u^2 \underset{0}{=} (3t - 2t^2 - 6t^3)^2 \underset{0}{=} 9t^2 - 12t^3 + o(t^3)$$

$$u^3 \underset{0}{=} (3t - 2t^2 - 6t^3)^3 \underset{0}{=} 27t^3 + o(t^3)$$

$$(1+u)^{\frac{1}{3}} \underset{0}{=} 1 + \frac{u}{3} - \frac{u^2}{9} + \frac{5u^3}{81} + o(u^3)$$

$$\text{Ainsi } \frac{1}{t} (1+3t-2t^2-6t^3)^{\frac{1}{3}} \underset{0}{=} \frac{1}{t} \left(1+t+\left(-\frac{2}{3}-1\right)t^2+\left(-2+\frac{4}{3}+\frac{5}{9}\right)t^3+o(t^3)\right)$$

$$\underset{0}{=} \frac{1}{t} + 1 - \frac{5t}{3} - \frac{t^2}{9} + o(t^2)$$

$$\text{Donc } \sqrt[3]{(x^2-2)(x+3)} \underset{\infty}{=} x + 1 - \frac{5}{3x} - \frac{1}{9x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)$$

Donc $\mathcal{D}_{+\infty} : y = 1 + x$ et \mathcal{C}_f est en dessous de l'asymptote au voisinage de $+\infty$

2. Le développement limité est le même et $+\infty$ et $-\infty$

$\mathcal{D}_{-\infty} : y = 1 + x$ et \mathcal{C}_f est au dessus de l'asymptote au voisinage de $-\infty$, car $-\frac{5}{3x} > 0$

Exercice 36 – ★ Branche infinie en ∞

Soit $f(x) = \frac{1}{x}(2x^2 - 1)e^{\frac{1}{x}}$

1. Montrer que \mathcal{C}_f admet une branche infinie en $+\infty$, notée $\mathcal{B}_{+\infty}$. Quelle est la direction de $\mathcal{B}_{+\infty}$?
2. Montrer que \mathcal{C}_f admet une branche infinie en $-\infty$, notée $\mathcal{B}_{-\infty}$. Quelle est la direction de $\mathcal{B}_{-\infty}$?

Correction

1. Pour $x \neq 0$, on pose $t = \frac{1}{x}$

$$\frac{1}{x}(2x^2 - 1)e^{\frac{1}{x}} = t \left(\frac{2}{t^2} - 1 \right) e^t = \left(\frac{2}{t} - t \right) \left(1 + t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{6} + o(t^3) \right)$$

$$= \frac{2}{t} + 2 - \frac{2t^2}{3} + o(t^2)$$

$$\text{Donc } \frac{1}{x}(2x^2 - 1)e^{\frac{1}{x}} = 2x + 2 - \frac{2}{3x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)$$

Donc \mathcal{C}_f admet une asymptote (et non une branche infinie) d'équation $y = 2x + 2$ et \mathcal{C}_f est en dessous de son asymptote au voisinage de $+\infty$

2. L'asymptote en $-\infty$ est la même droite, et \mathcal{C}_f est également en dessous au voisinage de $-\infty$

Exercice 37 – ★★ Étude d'une fonction en a et en $+\infty$

Soit $f(x) = x\sqrt{\frac{x-1}{3x+1}}$.

1. \mathcal{C}_f admet-elle une tangente en $a = 2$, notée T_2 ? Si oui, donner l'équation de T_2 et la position de \mathcal{C}_f par rapport à T_2 .
2. \mathcal{C}_f admet-elle une asymptote ou branche infinie en $+\infty$? En cas d'asymptote, donner l'équation de l'asymptote et la position de \mathcal{C}_f . En cas de branche infinie, donner la direction.

Correction

1. On pose $x = 2 + u$, $f(x) = x\sqrt{\frac{x-1}{3x+1}} = (2+u)\sqrt{\frac{1+u}{7+3u}}$

$$= (2+u)(1+u)^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{7}} \left(1 + \frac{3}{7}u\right)^{-\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{7}}(2+u) \left(1 + \frac{u}{2} - \frac{u^2}{8} + o(u^2)\right) \left(1 - \frac{3u}{14} + \frac{3}{8} \cdot \frac{9}{49}u^2 + o(u^2)\right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{7}} \left((2+2u + \frac{u^2}{4} + o(u^2)) \left(1 - \frac{3u}{14} + \frac{3}{8} \cdot \frac{9}{49}u^2 + o(u^2)\right) \right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{7}} \left(2 + \left(2 - \frac{3}{7}\right)u + \left(\frac{27}{196} - \frac{3}{7} + \frac{1}{4}\right)u^2 + o(u^2) \right)$$

$$= \frac{2}{\sqrt{7}} + \frac{11u}{7\sqrt{7}} - \frac{2}{49\sqrt{7}}u^2 + o(u^2)$$

$$\text{Donc } f(x) = \frac{2}{\sqrt{7}} + \frac{11(x-2)}{7\sqrt{7}} - \frac{2(x-2)^2}{49\sqrt{7}} + o((x-2)^2)$$

$$T_2 : y = \frac{2}{\sqrt{7}} + \frac{11(x-2)}{7\sqrt{7}} \text{ et } \mathcal{C}_f \text{ est en dessous de } T_2 \text{ au voisinage de } 2 \text{ car}$$

$$-\frac{2(x-2)^2}{49\sqrt{7}} \leq 0$$

2. Pour $x > 0$, on pose $t = \frac{1}{x}$ et alors

$$x\sqrt{\frac{x-1}{3x+1}} = \frac{1}{t}\sqrt{\frac{1-t}{3+t}}$$

$$= \frac{1}{t} \left(1 - \frac{t}{2} - \frac{t^2}{8} - \frac{t^3}{16} + o(t^3)\right) \frac{1}{\sqrt{3}} \left(1 - \frac{t}{6} + \frac{t^2}{24} - \frac{5t^3}{27 \cdot 16} + o(t^3)\right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}t} \left(1 - \frac{2t}{3} + \frac{2t^3}{27} + o(t^3)\right) = \frac{1}{\sqrt{3}t} - \frac{2}{3\sqrt{3}} + \frac{2t^2}{27\sqrt{3}} + o(t^2)$$

$$\text{Ainsi } x\sqrt{\frac{x-1}{3x+1}} = \frac{x}{\sqrt{3}} - \frac{2}{3\sqrt{3}} + \frac{2}{27\sqrt{3}x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)$$

\mathcal{C}_f admet une asymptote d'équation $y = \frac{x}{\sqrt{3}} - \frac{2}{3\sqrt{3}}$, et \mathcal{C}_f est au-dessus au voisinage de l'infini car $\frac{2}{27\sqrt{3}x^2} > 0$

Exercice 38 – ★ Autres développements

1. Calculer un développement en $+\infty$ de $f(x) = \left(\frac{1+x}{x}\right)^x$ à la précision $\mathcal{O}\left(\frac{1}{x^2}\right)$.
2. Calculer un développement en 0 de $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}}$ à la précision $\mathcal{O}(x^2\sqrt{x})$

Correction

1. Pour $x > 0$, on pose $t = \frac{1}{x}$, $\left(\frac{1+x}{x}\right)^x = (1+t)^{\frac{1}{t}} = \exp\left(\frac{1}{t} \ln(1+t)\right)$

$$\underset{0}{=} \exp\left(\frac{1}{t} \left(t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} + \mathcal{O}(t^3)\right)\right) \underset{0}{=} \exp\left(1 - \frac{t}{2} + \frac{t^2}{3} + \mathcal{O}(t^2)\right)$$

$$\underset{0}{=} e \cdot \exp\left(-\frac{t}{2} + \frac{t^2}{3} + \mathcal{O}(t^2)\right)$$

$$\underset{0}{=} e \cdot \left(1 + \left(-\frac{t}{2} + \frac{t^2}{3} + \mathcal{O}(t^2)\right) + \frac{1}{2} \left(-\frac{t}{2} + \frac{t^2}{3} + \mathcal{O}(t^2)\right)^2 + \mathcal{O}(t^2)\right)$$

$$\underset{0}{=} e \cdot \left(1 - \frac{t}{2} + \frac{t^2}{3} + \frac{t^2}{8} + \mathcal{O}(t^2)\right) \underset{0}{=} e - \frac{e \cdot t}{2} + \frac{11e \cdot t^2}{24} + \mathcal{O}(t^2)$$

$$\text{Donc } \boxed{\left(\frac{1+x}{x}\right)^x \underset{+\infty}{=} e - \frac{e}{2x} + \frac{11e}{24x^2} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{x^2}\right)}$$

2. $\frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}} \underset{0}{=} \frac{1}{\sqrt{x}} \left(x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \mathcal{O}(x^3)\right) \underset{0}{=} \sqrt{x} - \frac{x\sqrt{x}}{2} + \frac{x^2\sqrt{x}}{3} + \mathcal{O}(x^2\sqrt{x})$

Exercice 39 – ★★ Développement limité d'une intégrale

Soit $f(x) = \int_x^{x^2} \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}}$. Donner le développement limité de f en 0 à l'ordre 4.

Exercice 40 – ★★ Développement limité d'une suite implicite

1. Montrer que l'équation $\tan x = x$ admet une unique dans $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$
2. Que vaut $\tan(x + n\pi)$?, en déduire que l'équation $\tan x = x$ admet une unique dans $\left[n\pi - \frac{\pi}{2}, n\pi + \frac{\pi}{2}\right[$, notée x_n
3. Montrer que $x_n \sim n\pi$ puis que $x_n - n\pi - \frac{\pi}{2} \sim -\frac{1}{n\pi}$
4. Calculer un équivalent de $x_n - n\pi - \frac{\pi}{2} + \frac{1}{n\pi}$ et conclure que

$$x_n = n\pi + \frac{\pi}{2} + \frac{1}{n\pi} + \frac{1}{2n^2\pi} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

Exercice 41 – ★★ Équivalent d'une suite définie par une intégrale

Soit la suite $u_n = \int_{n^2}^{n^3} \frac{dt}{1+t^2}$. Montrer que $u_n \sim \frac{1}{n^2}$.

Exercice 42 – ★★ Une limite de sinus

Soit $u_n = \sin(\pi\sqrt{4n^2 + n})$. Calculer la limite de u_n .

Exercice 43 – ★★ Étude d'une fonction définie par une intégrale

Soit $f(x) = \int_0^x \arctan t dt$

1. Donner l'équation de la tangente à \mathcal{C}_f en 0.
2. Étudier \mathcal{C}_f en $+\infty$: asymptote, branche infinie, position de \mathcal{C}_f .

Exercice 44 – ★★ Encore une suite implicite

On considère l'équation $\ln(x^n) + 1 = x$, pour $n \geq 2$

1. Montrer que cette équation admet une unique solution sur $]1, +\infty[$. On note x_n cette solution.
2. Donner un développement limité à trois terme de la suite (x_n) .

Exercice 45 – ★★ Équivalent d'une suite d'intégrale

Donner un équivalent de $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$