03. Nettoyage, désinfection et dilution des produits

Choisir un produit adapté, appliquer sa notice et vérifier la remise en état des surfaces avant leur utilisation alimentaire.

Objectifs

- Distinguer élimination des souillures et désinfection.
- Respecter dosage, action, temps, température et rinçage.
- Calculer une dilution dont la définition est donnée.

Deux fonctions complémentaires

Le nettoyage retire les souillures avec un détergent et une action adaptée. La désinfection vise les micro-organismes selon l'activité du produit. Bactéricide, fongicide, virucide et sporicide désignent des cibles différentes : un désinfectant ne traite pas automatiquement toutes les catégories. Une surface encore couverte de farine ou de graisse doit être nettoyée avant la désinfection prévue.

Le plan précise les surfaces, produits, matériels, fréquences et responsables. Il tient compte des souillures et des matériaux. Après maintenance ou incident contaminant, une remise en état supplémentaire peut être nécessaire avant de réutiliser le poste.

Appliquer la bonne notice

Vérifier l'usage autorisé, notamment pour une surface en contact alimentaire, puis la concentration, la température, le temps de contact et le rinçage éventuel. Un produit destiné seulement aux sanitaires ne remplace pas celui prévu au plan alimentaire. Une nouvelle référence demande une mise à jour du plan et des consignes.

Ne pas mélanger les produits. Conserver leur identification et les stocker à l'écart des denrées ; une bouteille de boisson ne sert pas de contenant chimique. Un liquide non identifié ne s'utilise pas au jugé. Les protections suivent la notice et la fiche de données de sécurité.

Doser et contrôler

Quand la notice définit un pourcentage du volume final, volume de produit = volume final × pourcentage ÷ 100. L'eau complète le volume final ; on n'ajoute pas automatiquement le produit au volume entier d'eau. Un surdosage n'est pas un raccourci de désinfection. Après le traitement, vérifier l'exécution des étapes et rendre le matériel prêt au contact alimentaire.

Pour les poussières de farine, employer un aspirateur professionnel adapté. Une soufflette remet les poussières en suspension et expose les personnes.

Préparer une solution finale

Notice entièrement fictive : préparer 5 L de solution finale contenant 3 % de produit en volume.

1. Convertir le volume final : 5 L = 5 000 mL.
2. Calculer le produit : 5 000 × 3 ÷ 100 = 150 mL.
3. Calculer l’eau : 5 000 − 150 = 4 850 mL.

Mesurer 150 mL de produit et 4 850 mL d’eau selon les précautions de cette notice fictive.

À retenir

- Nettoyer avant la désinfection prévue.
- Respecter le temps de contact complet.
- Rincer lorsque la notice le prescrit.
- Identifier et séparer les produits chimiques.

Pièges à éviter

- Confondre surface sèche et surface rincée.
- Augmenter arbitrairement le dosage.
- Réutiliser les consignes d’une autre référence.

Pour s’entraîner après le cours

Examen 01 : Q06 ; Examen 02 : Q13 ; Examen 04 : Q10 ; Examen 05 : Q13 ; Examen 07 : Q07, Q12 ; Examen 08 : Q04, Q10, Q16 ; Examen 09 : Q14

Sources et vérification

INRS / Réseau 3RB - entretien des surfaces

https://www.esst-inrs.fr/3rb/afftexte.php?p1=entretien_des_surfaces_texte

INRS - prévention des poussières de farine, nettoyage adapté

https://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/boulangerie-patisserie/boulangerie-patisserie-agir

DGCCRF - dispositions d’hygiène des équipements et produits d’entretien

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/securite/produits_alimentaires/Hygiene_alimentaire/ha-annexe-852.pdf

Support proposé au CEPROC, à relire et valider par les formateurs avant usage officiel. Les quantités, taux et protocoles annoncés comme fictifs servent uniquement aux exemples ; appliquer les règles et documents correspondant à la situation réelle.