

Reduccion del algoritmo de la Grange

Allan y Jhon

January 15, 2016

1 La Grange

Se seleccionó un anillo $Z_p = 11$ con $w = 5$ incognitas de las que se resuelven $t = 2$. Se seleccionó como llave $k = 8$

Se selecciona los $t - 1$ elementos del anillo Z_p
 $a_0 = 5$

Del anillo Z_p se seleccionan los w elementos x
 $x_1 = 2$ $x_2 = 7$ $x_3 = 9$ $x_4 = 10$ $x_5 = 3$

Se calcula el conjunto de elementos y por medio de la ecuación

$$y_n = k + \sum_{j=1}^{t-1} a_j x_j^j \text{ mod } p \quad (1)$$

$$\begin{aligned} y_1 &= 8 + 5(2) \text{ mod } 11 = 7 & y_2 &= 8 + 5(7) \text{ mod } 11 = 10 \\ y_3 &= 8 + 5(9) \text{ mod } 11 = 9 & y_4 &= 8 + 5(10) \text{ mod } 11 = 3 \\ y_5 &= 8 + 5(3) \text{ mod } 11 = 1 \end{aligned}$$

Se tienen los pares $A_n(x_n, y_n)$
 $A_1(2, 7)$ $A_2(7, 10)$ $A_3(9, 9)$ $A_4(10, 3)$ $A_5(3, 1)$

Para recuperar la llave k es necesario seleccionar 2 pares del conjunto A_n , los seleccionados son:

$$A_2(7, 10) \quad A_4(10, 3)$$

Con estos pares podemos calcular un sistema de ecuaciones resolviendo el polinomio característico para $t = 2$

$$a_0 + a_1 x = y \text{ donde } a_0 = k$$

De lo que resulta el siguiente sistema de ecuaciones al sustituir los pares A_2 y A_4 en el polinomio

$$a_0 + 7a_1 = 10$$

$$a_0 + 10a_1 = 3$$

Podemos resolver el sistema para obtener los valores de a_0 y a_1 o usar otro metodo, como es la ecuacion de la Grange como se muestra a continuacion:

$$l_i = \prod \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \quad (2)$$

$$k = \sum_{j=1}^t y_j l_i \text{mod} p \quad (3)$$

Al sustituir los valores de las acuaciones anteriores recontruimos el polinomio original pero a nosotros solo nos interesa obtener el valor de a_0 por que esta es k , para conseguir esto en el calculo de l_i quitamos la variable x quedando la de la siguiente forma

$$l_i = \prod \frac{-x_j}{x_i - x_j} \quad (4)$$

Ahora sustituiremos en estas ecuaciones los pares seleccionados A_2 y A_4 quedando las siguientes ecuaciones.

$$l_0 = \frac{-10}{7-10} = \frac{-10}{-3} \text{mod} 11 = \frac{1}{8}$$

$$l_1 = \frac{-7}{10-7} = \frac{-7}{3} \text{mod} 11 = \frac{4}{3}$$

$$a = 10(\frac{1}{8}) = \frac{10}{8} = (10)(7) = 70 \text{mod} 11 = 4$$

$$b = 3(\frac{4}{3}) = 4$$

$$k = a + b = 4 + 4 = 8$$