



CATEGORIZACIÓN
de los mamíferos de
Argentina



Sociedad Argentina para el
Estudio de los Mamíferos



Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible
Argentina


Delphinus delphis
Delfín común



Fotos por Roberto Cinti, Proyecto Pantano

Citar como: Romero, M. Alejandra; Bastida, Ricardo; Loizaga de Castro, Rocío; Svendsen, Guillermo. (2019). *Delphinus delphis*. En: SAyDS–SAREM (eds.) Categorización 2019 de los mamíferos de Argentina según su riesgo de extinción. Lista Roja de los mamíferos de Argentina. <http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.183>

ÁREA DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL



CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN

Categoría Nacional de Conservación 2019

LC (Preocupación Menor)

Criterios y subcriterios

NA

Justificación de la categorización

El delfín común es una especie de amplia distribución global, es abundante en aguas argentinas y a pesar de sufrir captura incidental en pesquerías, esta amenaza no representa un riesgo de extinción para la especie en el corto o mediano plazo. Por lo tanto, esta especie no cumple con ninguno de los criterios que definen las categorías de amenaza, y se concluye clasificarla como Preocupación Menor (LC).

Categoría Res. SAYDS 1030/04

IC (Insuficientemente Conocida)

Categorías nacionales de conservación previas (SAREM)

2012	LC (Preocupación Menor)	NA
2000	LR lc (Riesgo Bajo, preocupación menor)	NA
1997	RB dc (Riesgo Bajo, dependiente de la conservación; LR cd)	NA

Homologación categoría 1997 LC dc (Preocupación Menor, dependiente de la conservación)

Categorías de conservación actuales en países vecinos

País	Categoría	Año	Cita
Brasil	DD (Datos Insuficientes)	2018	ICMBio/MMA (2018)
País	Categoría	Año	Cita
Chile	LC (Preocupación Menor)	2017	MMA (2017)
País	Categoría	Año	Cita
Uruguay	Prioritaria Amenazada	2013	González et al. (2013)

Evaluación global UICN

Año de evaluación	Categoría	Criterios y subcriterios
2008	LC (Preocupación Menor)	NA

TAXONOMÍA Y NOMENCLATURA

Orden	Cetartiodactyla
Familia	Delphinidae
Nombre científico	<i>Delphinus delphis</i> (Linnaeus, 1758)
Nombre común	Delfín común
Nombres comunes locales	Delfín común de pico corto
Nombres comunes en inglés	Short-beaked Common Dolphin Atlantic Dolphin Pacific Dolphin Saddle-backed Dolphin Short-beaked Saddleback Dolphin
Nombres comunes en portugués	Golfinho-comum

Comentarios taxonómicos

Hasta 1994, todos los delfines comunes del mundo se clasificaban como *Delphinus delphis*. Sin embargo, la sistemática del género ha sufrido grandes cambios a partir de la descripción de dos especies, *D. delphis*

y *D. capensis* (Heyning & Perrin 1994). Actualmente dos especies y cuatro subespecies están aceptadas (Comisión de Taxonomía, 2017), aunque estudios moleculares recientes ponen en duda esta clasificación. En base a un estudio de taxonomía molecular para el Atlántico Sudoccidental, se ha demostrado que la especie corresponde a delfín común de pico corto, *D. delphis*, siendo *D. capensis* inválida para la región (Cunha et al. 2015).

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA EVALUACIÓN

RANGO GEOGRÁFICO, OCURRENCIA Y ABUNDANCIA

Presencia en el territorio nacional: residente

Comentarios sobre la distribución actual e histórica

El delfín común es una especie ampliamente distribuida que habita mares templados, subtropicales y tropicales (Evans 1994; Perrin 2009). En el Mar Argentino poco se sabe de la distribución y ocurrencia de la especie. En la zona de Necochea existen registros frecuentes de grupos de *D. delphis*, que en algunas ocasiones llegan a acercarse a la costa próximo a la desembocadura portuaria (38°35'S - 58°41'W), formando grupos de algunas decenas de individuos. No obstante, los avistajes son más frecuentes en zonas alejadas de la costa (Loizaga et al. 2016; Bastida R., com. pers.). En el Golfo San Matías, los delfines comunes viven en simpatria con los delfines oscuros (*Lagenorhynchus obscurus*) exhibiendo patrones similares en relación al tamaño de grupo (desde menos de 10 individuos a más de 100), actividad (ambas especies usan el área para alimentarse, criar y copular) y composición (adultos, juveniles y madres con crías). Además, ambas especies forman manadas mixtas. No obstante, se observó un bajo solapamiento espacial entre ambas especies sugiriendo que están segregados en la dimensión del hábitat. Los hábitats más favorables para el delfín común se encontraron en el noroeste del golfo, lejos de la costa (Svendsen et al. 2015).

Presencia confirmada por provincia: Buenos Aires
Chubut
Río Negro

Presencia en ecorregiones de Argentina: Mar Argentino

Presencia en ecorregiones globales terrestres: NA

Patrón de distribución	Cantidad de localidades	Rango altitudinal
continuo	NA	NA

Endemismo especie no endémica

Abundancia relativa estimada en su área de ocupación muy abundante

Comentarios sobre la abundancia, densidad o probabilidad de ocupación de la especie

En el Atlántico Sudoccidental, los delfines comunes (*D. delphis*) se encuentran entre los pequeños cetáceos más abundantes de la región (Bastida et al. 2007). En un relevamiento realizado a lo largo del Mar Argentino se estimó la abundancia de esta especie en unos 9.000 individuos para el norte de la Patagonia y unos 5.000 para la provincia de Buenos Aires, siempre en una franja costera de 15 millas náuticas de la costa (Crespo et al. 2008). Más allá que no se disponen de estimaciones más recientes, avistajes realizados durante diversas campañas de investigación, entre el año 2010 y 2017 en la provincia de Buenos Aires, señalan que la especie es abundante y frecuente en la plataforma bonaerense, registrándose en general en grupos grandes de más de 50 animales (Grupo de Investigación: Biología, Ecología y Conservación de Mamíferos Marinos. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), FCEyN, UNMdP – CONICET. Mar del Plata, Argentina, datos no publicados). En la costa norte del Golfo San Matías también es una

especie abundante y frecuente a lo largo de todo el año, formando grupos desde pocos individuos a más de 500 ejemplares (Svendsen et al. 2015).

¿Existen actualmente programas de monitoreo?: no

NA

DATOS MORFOMÉTRICOS

Peso de la hembra

90 kg

Peso del macho

110 kg

RASGOS ETO-ECOLÓGICOS

Hábitos: acuáticos

Hábitos especializados: NA

Otro hábito especializado: comentarios

NA

Dieta: carnívoro

Dieta especializada: ictiófago

Aspectos reproductivos

Se estima que la gestación es de 10 a 11,7 meses (Jefferson et al. 2008). Se describe un intervalo interparto de 1 a 3 años y se ha observado que el período de lactancia se extiende hasta los 10–11 meses. La madurez sexual varía bastante entre poblaciones, alcanzándose entre los 3 y 12 años en machos, y los 2 a 7 años en hembras (Perrin 2009). La especie se reproduce en Argentina, y se han observado crías pequeñas a lo largo de todo el año.

Patrón de actividad: catemeral

Gregariedad: especie grupal

NA

Área de acción

NA

CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN

Amenazas por grado: de 1 (menor) a 5 (mayor)

Impactos asociados al turismo 1
Contaminación 2

Reducción de presas 3

En Argentina la mayor amenaza para esta especie está vinculada con las interacciones entre cetáceos y operaciones pesqueras, cuya consecuencia directa es la mortalidad incidental de delfines (Crespo et al. 2007). Los valores más altos de captura incidental se dan en la pesquería de media agua dirigida a la captura de anchoíta (*Engraulis anchoíta*) en la provincia de Buenos Aires (Crespo et al. 1997, 2007; Mandiola et al. 2017). Asimismo, se ha registrado la presencia de animales alimentándose de la captura de anchoíta al momento de las maniobras de pesca. Sumado a las interacciones directas, la actividad pesquera puede generar consecuencias sobre la viabilidad poblacional de los delfines comunes debido a una competencia por los recursos. En un análisis de solapamiento trófico entre pesquerías y delfines se

observó una similitud en las tallas de anchoíta consumidas por los delfines (7–20 cm) y las capturadas por la flota pesquera (14–19 cm). Si bien el nivel histórico de explotación se ha encontrado por debajo del potencial biológico del stock (Hansen et al. 2009), en caso de que la pesquería expandiera su nivel de actividad y/o el recurso redujera su abundancia, podría generar una amenaza para la población de delfines comunes (Romero et al. 2012). Por último, la contaminación de las aguas costeras y de plataforma hace que *D. delphis*, al igual que otros pequeños cetáceos del Mar Argentino, muestren altos valores de contaminantes orgánicos en los organismos (Durante et al. 2016).

La especie ¿está presente en áreas naturales protegidas?: sí

Presencia de la especie en áreas naturales protegidas

Al tener una amplia distribución, esta especie se encuentra en aquellos Parques Nacionales y en casi todas las Áreas Protegidas y Reservas Provinciales que tengan costa marina.

Marco legal de la especie

La conservación de los mamíferos marinos a nivel nacional se encuentra regulada por la Ley N° 22.241. La Ley N° 25.577 prohíbe la caza de cetáceos en todo el territorio nacional. Además, esta especie está contemplada por las siguientes convenciones que fueron aprobadas por leyes nacionales: 1) Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), aprobada por Ley N° 24.543/1995; 2) Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), aprobada por Argentina Ley N° 22.344. La especie se haya incluida en el CITES Apéndice II. 3) Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) aprobada por Ley N° 24.375.

Planes de acción y/o proyectos de conservación o manejo actuales

En el año 2015, a partir del trabajo conjunto de instituciones académicas, agencias nacionales y provinciales de administración pesquera y ONGs, se estableció el Plan de Acción Nacional para Reducir las Interacciones de Mamíferos Marinos con Pesquerías en la República Argentina (PAN-Mamíferos 2016). El objetivo de este plan es contribuir al manejo ecosistémico de las pesquerías, evaluando las interacciones entre estas y los mamíferos marinos, a fin de disminuir los impactos negativos sobre ambos. En el Primer Taller de Seguimiento del PAN-Mamíferos se conformó un plan operativo trienal en el cual *D. delphis* fue definida como una de las 5 especies a priorizar enfocando durante estos años la evaluación y mitigación de interacciones con la pesquería de anchoíta.

Experiencias de reintroducción o erradicación: no

Rol ecológico / servicios ecosistémicos

El delfín común de pico corto es un depredador de alto nivel trófico por lo que juega un rol importante en los ecosistemas marinos ya que ejerce control en la trama trófica. A su vez son bioindicadores en cuanto a la concentración en sus cuerpos de contaminantes tales como metales pesados y pesticidas inorgánicos y orgánicos.

En relación con su rol trófico, el delfín oscuro se alimenta en el Golfo San Matías principalmente de anchoíta y de calamares (*Loligo sanpaulensis*), exhibiendo un alto solapamiento con el delfín oscuro en cuanto a la composición de la dieta y hábitos alimenticios (Romero et al. 2012). Ambas especies seleccionan las presas más abundantes localmente de hábitos pelágicos y que se encuentran formando cardúmenes. Asimismo, a partir de un análisis latitudinal (38°S-42°S) de la ecología trófica de los delfines comunes se observó que la variación en isótopos estables de carbono y nitrógeno refleja la variación asociada con el uso del hábitat, sugiriendo diferencias considerables entre individuos y grupos a lo largo de la costa en la explotación de recursos tróficos y, muy probablemente, en su hábitat (Loizaga et al. 2016).

Necesidades de investigación y conocimiento

Profundizar los estudios genéticos poblacionales para confirmar la estructura de la población y la migración a lo largo del Atlántico Sudoccidental.

Estimar la abundancia poblacional de la especie, lo cual es un insumo necesario para evaluar el efecto de las pesquerías sobre sus poblaciones. Profundizar los estudios de base sobre esta especie dado que en nuestras aguas se encuentra el límite austral de su distribución geográfica.

BIBLIOGRAFÍA

LITERATURA CITADA

BASTIDA, R. O., D. RODRÍGUEZ, E. SECCHI, & V. DA SILVA. 2007. Mamíferos acuáticos de Sudamérica y Antártida. 1ra Edición. Vazquez Mazzini, Buenos Aires.

COMMITTEE ON TAXONOMY. 2017. List of marine mammal species and subspecies. Society for Marine Mammalogy. .

CRESPO, E. A., J. CORCUERA, & A. LÓPEZ CAZORLA. 1994. Interactions between marine mammals and fisheries in some coastal fishing areas of Argentina. Gillnets and Cetaceans (W. F. Perrin, G. P. Donovan & J. Barlow, eds.). Reports of the International Whaling Commission (Special Issue 15), International Whaling Commission, Cambridge.

CRESPO, E. A. ET AL. 1997. Direct and indirect effects of the highseas fisheries on the marine mammal populations in the northern and central Patagonian coast. Journal of Northwest Atlantic Fishery Science 22:189–207.

CRESPO, E. A., N. A. GARCÍA, S. L. DANS, & S. N. PEDRAZA. 2008. Mamíferos marinos. Atlas de Sensibilidad Ambiental de la Costa y el Mar Argentino (D. Boltovskoy, ed.). Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Buenos Aires.

CUNHA, H. A. ET AL. 2015. Molecular and morphological differentiation of Common Dolphins (*Delphinus* sp.) in the Southwestern Atlantic: testing the two species hypothesis in sympatry. PloS ONE 10:e0140251.

DURANTE, C. A., E. B. SANTOS-NETO, A. AZEVEDO, E. A. CRESPO, & J. LAILSON-BRITO. 2016. POPs in the South Latin America: Bioaccumulation of DDT, PCB, HCB, HCH and Mirex in blubber of common dolphin (*Delphinus delphis*) and Fraser's dolphin (*Lagenodelphis hosei*) from Argentina. Science of the Total Environment 572:352–360.

EVANS, W. E. 1994. Common dolphin, white-bellied porpoise *Delphinus delphis* Linnaeus, 1758. Handbook of marine mammals, Vol. 5: The first book of dolphins (S. H. Ridgway & R. Harrison, eds.), Academic Press, London.

GONZÁLEZ, E. M., J. A. MARTÍNEZ-LANFRANCO, E. JURI, A. L. RODALES, G. BOTTO, & A. SOUTULLO. 2013. *Delphinus delphis*. Base de datos de especies.

HANSEN, J. E., C. C. BURATTI, & A. D. GARCIARENA. 2009. Estimación de la abundancia y la composición de la población de anchoíta bonaerense durante el periodo 1990–2008, y de una captura biológicamente aceptable en el año 2009. INIDEP Informe Técnico 12/09.

HEYNING, J. E., & W. F. PERRIN. 1994. Evidence for two species of common dolphins (genus *Delphinus*) from the eastern North Pacific. Contributions to Science of the Natural History Museum of Los Angeles City 442:1–35.

JEFFERSON, T. A., M. A. WEBBER, & R. L. PITMAN. 2008. Marine mammals of the world: a comprehensive guide to their identification, 1st edition. Academic Press, Elsevier, San Diego.

LOIZAGA DE CASTRO, R., F. SAPORITI, D. G. VALES, N. A. GARCÍA, L. CARDONA, & E. A. CRESPO. 2016. What are you eating? A stable isotope insight into the trophic ecology of short-beaked common dolphins in the southwestern Atlantic Ocean. Mammalian Biology 81:571–578.

MANDIOLA, M. A., G. BLANCO, & D. RODRÍGUEZ. 2017. Evaluación de interacciones con Mamíferos Marinos en la pesquería de anchoíta certificada bajo estándares del Marine Stewardship Council. Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de Mar del Plata al medio socio-productivo. Vol. IV. UNMdP, Mar del Plata.

MMA. 2017. RCE–Reglamento de Clasificación Especies DS 06. Ministerio del Medioambiente. Gobierno de Chile.

PACIFICI, M. ET AL. 2013. Generation length for mammals. *Nature Conservation* 5:8–94.

PAN–MAMIFEROS. 2016. Plan de Acción Nacional para reducir la interacción de mamíferos marinos con pesquerías en la República Argentina. 2016. Buenos Aires, Consejo Federal Pesquero.

PERRIN, W. F. 2009. Common dolphins: *Delphinus delphis* and *D. capensis*. *Encyclopedia of marine mammals*. 2nd Edition (W. F. Perrin, B. Wursig & J. Thewissen, eds.). Academic Press, San Diego.

ROMERO, M. A., S. L. DANS, G. SVENDSEN, R. GONZÁLEZ, & E. A. CRESPO. 2012. Feeding habits of two sympatric dolphin species off North Patagonia, Argentina. *Marine Mammal Science* 28:364–377.

SVENDSEN, G. M. ET AL. 2015. Environmental niche overlap between common and dusky dolphins in North Patagonia, Argentina. *PLoS ONE* 10:e0126182.

LITERATURA DE REFERENCIA

BASTIDA, R., & D. RODRÍGUEZ. 2003. *Mamíferos Marinos de Patagonia y Antártida*. 1ra Edición. Vazquez Mazzini, Buenos Aires.

CULIK, B. M. 2011. *Odontocetes: The toothed whales*. CMS Technical Series No. 24, UNEP/CMS/ASCOBANS.

AUTORES

AUTORES

Bastida, Ricardo

Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC),
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Na-
cional de Mar del Plata-CONICET, Buenos Aires, Argentina

Loizaga de Castro, Rocío

Laboratorio de Mamíferos Marinos, Centro para el Estudio
de Sistemas Marinos, Centro Nacional Patagónico (CESI-
MAR - CENPAT – CONICET)., Chubut, Argentina

Romero, M. Alejandra

Grupo de Investigación en Mamíferos Marinos del Golfo
San Matías, Centro de Investigación Aplicada y Transfer-
encia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni
(CIMAS-CONICET), Río Negro, Argentina

Svendsen, Guillermo

Grupo de Investigación en Mamíferos Marinos del Golfo
San Matías, Centro de Investigación Aplicada y Transfer-
encia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni
(CIMAS-CONICET), Río Negro, Argentina

COLABORADORES

Boscarol, Nadia

Fundacion Cethus, , Argentina

Cáceres-Saez, Iris	Laboratorio de Ecología, Comportamiento y Mamíferos Marinos, División Mastozoología, Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN-CONICET), CABA, Argentina
Crespo, Enrique	Laboratorio de Mamíferos Marinos, Centro para el Estudio de Sistemas Marinos, Centro Nacional Patagónico (CESI-MAR - CENPAT – CONICET), Chubut, Argentina
Curcio, Nadia	Grupo de Investigación en Mamíferos Marinos del Golfo San Matías, Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (CIMAS-CONICET), Río Negro, Argentina
Dans, Silvana L.	Laboratorio de Mamíferos Marinos, Centro para el Estudio de Sistemas Marinos, Centro Nacional Patagónico (CESI-MAR - CENPAT – CONICET), Chubut, Argentina
García, Néstor A.	Laboratorio de Mamíferos Marinos, Centro para el Estudio de Sistemas Marinos, Centro Nacional Patagónico (CESI-MAR - CENPAT – CONICET), Chubut, Argentina
González, Raúl	Grupo de Investigación en Mamíferos Marinos del Golfo San Matías, Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (CIMAS-CONICET)., Río Negro, Argentina
Hevia, Marta	Fundación Cethus, Vicente López, Buenos Aires, Argentina
Mandiola, Agustina	Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata-CONICET, Buenos Aires, Argentina
Marinao, Cristian	Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET), Chubut, Argentina
Marino, A.	Fundación Cethus, , Argentina

Paez, Melina	Museo Educativo Patagónico, Proyecto Cetáceos Golfo San Jorge. Dpto. de Biología y Ambiente, Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Área Natural Protegida Punta Marqués, Rada Tilly. Chubut., Chubut, Argentina
Paz, Jesica	Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata-CONICET, Buenos Aires, Argentina
Retana, Valeria	Facultad Regional de Chubut, Universidad Tecnológica Nacional, Puerto Madryn, Chubut, Argentina
Reyes, Vanesa	Fundación Cethus, , Argentina
Valese, N.	Fundación Cethus, , Argentina

Este documento fue generado automáticamente
Fecha de compilación: 2023-04-07 19:31:26
La reproducción sin cambios de este documento está permitida
Si encuentra errores por favor escribir a comisioncma@sarem.com