

# 1. Fourier Transform

延續複數型的結論，我們把指數中的  $\pi/l$  寫成常數  $\omega_0$ ，那麼  $f(t)$  可以寫為：

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\omega_0 t}, \quad c_n = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(t) e^{-in\omega_0 t} dt$$

把  $c_n$  代入，再將  $n\omega_0$  寫為變數  $\omega$ ，則  $\Delta\omega = (n+1)\omega_0 - n\omega_0 = \omega_0 = \pi/l$ ：

$$\begin{aligned} f(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[ \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(u) e^{-i\omega u} du \right] e^{i\omega t} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[ \frac{1}{2\pi} \frac{\pi}{l} \int_{-l}^l f(u) e^{-i\omega u} du \right] e^{i\omega t} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[ \frac{1}{2\pi} \int_{-l}^l f(u) e^{-i\omega u} du \right] e^{i\omega t} \Delta\omega \end{aligned}$$

在第二個等號，為了湊出  $\Delta\omega$ ，分式上下各多了一個  $\pi$ 。現在前面有  $\sum$ 、後面有  $\Delta\omega$ ，看起來非常像一個積分的形式。因此我們很自然的，把  $l \rightarrow \infty$ ，得到  $\Delta\omega \rightarrow d\omega$ ：

$$\begin{aligned} f(t) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[ \frac{1}{2\pi} \int_{-l}^l f(u) e^{-i\omega u} du \right] e^{i\omega t} \Delta\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{\left[ \int_{-\infty}^{\infty} f(u) e^{-i\omega u} du \right]}_{\text{記為 } F(\omega)} e^{i\omega t} d\omega \end{aligned}$$

現在裡面的  $f(t)$ ，經過裡面那層積分，變成  $F(\omega)$ ；而  $F(\omega)$  再經過外面那層積分，又變回了  $f(t)$ ：

$$f(t) \xleftrightarrow[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega u} d\omega]{\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt} F(\omega)$$

這就是大名鼎鼎的傅立葉變換。

**Definition** 函數  $f(t)$  之傅立葉變換 (Fourier Transform, F.T.) 定義為：

$$\mathcal{F}\{f(t)\} = F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

我們通常會用手寫體的  $\mathcal{F}\{\dots\}$  來表示傅立葉變換；帶有上標的  $\mathcal{F}^{-1}\{\dots\}$  來表示逆變換；用  $F(\omega)$  表示變換後的函數。我們稱變換前的  $f(t)$  是在**時域** (Time-Domain、 $t$ -domain)、變換後的  $F(\omega)$  是在**頻域** (Frequency-Domain、 $\omega$ -domain)。




Figure 1: 傅立葉變換示意圖：將時域中的信號分解，並在頻域中標出各頻率的分佈。

**Theorem. (Dirichlet Conditions)** 若函數  $f(t)$  同時滿足以下條件，則  $f(t)$  的傅立葉變換收斂。

1.  $f(t)$  在一個週期內絕對可積 (absolutely integrable).
2.  $f(t)$  在一個週期內只有有限個極值點 (maxima and minima).
3.  $f(t)$  在一個週期內只有有限個不連續點 (finite discontinuities).

## 2. Laplace Transform

**Definition** 函數  $f(t)$  之拉普拉斯變換 (Laplace Transform, L.T.) 定義為：

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

其中  $s = \alpha + i\omega$ .

我們用手寫體的  $\mathcal{L}\{\dots\}$  來表示拉普拉斯變換； $\mathcal{L}^{-1}\{\dots\}$  表示逆變換；大寫的  $F(s)$  表示變換後的函數。稱變換前的  $f(t)$  是在時域 (Time-Domain,  $t$ -domain)；稱變換後的  $F(s)$  是在複頻域 (Complex Frequency-Domain,  $s$ -domain)。

**Theorem. (Exponential Order Conditions)** 若分段連續函數  $f(t)$  滿足：存在常數  $M > 0$  和  $c \in \mathbb{R}$ ，使得對於所有充分大的  $t$ ，我們有：

$$|f(t)| \leq Me^{ct}$$

則  $f(t)$  的拉普拉斯變換變換收斂。

## 2.1. Laplace Transform of Common Functions

**Question** Find the Laplace transform of following functions.

▷  $\mathcal{L}\{\delta(t)\}.$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\delta(t)\} &= \int_0^{+\infty} \delta(t)e^{-st} dt \\ &= e^{-st} \Big|_{t=0} = 1\end{aligned}$$

▷  $\mathcal{L}\{u(t)\} = \mathcal{L}\{1\}.$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{u(t)\} &= \int_0^{+\infty} u(t)e^{-st} dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-st} dt \\ &= \frac{-1}{s} e^{-st} \Big|_{t=0}^{t=\infty} \\ &= 0 - \left(\frac{-1}{s}\right) = \frac{1}{s}\end{aligned}$$

►  $\mathcal{L}\{e^{at}\}.$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{e^{at}\} &= \int_0^{+\infty} e^{at}e^{-st} dt \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-(s-a)t} dt \\ &= \frac{-1}{s-a} e^{(s-a)t} \Big|_{t=0}^{t=\infty} \\ &= 0 - \left(\frac{-1}{s-a}\right) = \frac{1}{s-a}\end{aligned}$$

▷  $\mathcal{L}\{\sin(at)\}, \mathcal{L}\{\cos(at)\}$

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{e^{iat}\} &= \frac{1}{s-ia} = \frac{s+ia}{s^2+a^2} \\ &= \frac{s}{s^2+a^2} + i\frac{a}{s^2+a^2} \\ &= \mathcal{L}\{\cos(at) + i\sin(at)\} \\ &= \mathcal{L}\{\cos(at)\} + i\mathcal{L}\{\sin(at)\} \\ \Rightarrow \mathcal{L}\{\cos(at)\} &= \frac{s}{s^2+a^2}, \quad \mathcal{L}\{\sin(at)\} = \frac{a}{s^2+a^2}\end{aligned}$$

$f(t)$	$\delta(t)$	$u(t)$	$t^n$	$e^{at}$	$\sin(at)$	$\cos(at)$	$\sinh(at)$	$\cosh(at)$
$F(s)$	1	$\frac{1}{s}$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\frac{1}{s-a}$	$\frac{a}{s^2+a^2}$	$\frac{s}{s^2+a^2}$	$\frac{a}{s^2-a^2}$	$\frac{s}{s^2-a^2}$

Table 1: 基本函數拉普拉斯變換

**Remark** 歐拉公式  $e^{ix} = \cos(x) + i\sin(x).$

## 2.2. Laplace Transform Properties

**Question** Show the following Laplace transform properties holds.

$$\triangleright \mathcal{L}\{(f * g)(t)\} = F(s) \cdot G(s).$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{f(t) * g(t)\} &= \int_0^\infty e^{-st} \int_0^t f(\tau)g(t-\tau) \, d\tau \, dt \\ &= \int_0^\infty \int_0^t e^{-st} f(\tau)g(t-\tau) \, d\tau \, dt \\ &= \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-st} f(\tau)g(t-\tau) \, dt \, d\tau \\ &= \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-s(u+\tau)} f(\tau)g(u) \, du \, d\tau \\ &= \int_0^\infty e^{-s\tau} f(\tau) \int_0^\infty e^{-su} g(u) \, du \, d\tau \\ &= \left[ \int_0^\infty e^{-s\tau} f(\tau) \, d\tau \right] \left[ \int_0^\infty e^{-su} g(u) \, du \right] \\ &= \mathcal{L}\{f(t)\} \cdot \mathcal{L}\{g(t)\} \\ &= F(s) \cdot G(s) \end{aligned}$$

$$\blacktriangleright \mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0).$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{f'(t)\} &= \int_0^\infty e^{-st} f'(t) \, dt \\ &= [e^{-st} f(t)]_0^\infty - \int_0^\infty (-se^{-st}) f(t) \, dt \\ &= (e^{-s(\infty)} f(\infty) - e^0 f(0)) + s \int_0^\infty e^{-st} f(t) \, dt \\ &= (0 - f(0)) + s\mathcal{L}\{f(t)\} \\ &= sF(s) - f(0) \end{aligned}$$

$$\triangleright \mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) \, d\tau\right\} = \frac{1}{s}F(s).$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) \, d\tau\right\} &= \mathcal{L}\left\{\int_0^t 1 \cdot f(\tau) \, d\tau\right\} \\ &= \mathcal{L}\{f(t) * 1\} \\ &= \mathcal{L}\{f(t)\} \cdot \mathcal{L}\{1\} \\ &= F(s) \cdot \frac{1}{s} \end{aligned}$$

## 2.3. Laplace Transform of General Functions

$f(t)$	$F(s)$	$f(t)$	$F(s)$
$\delta(t)$	1	$c_1 f(t) + c_2 g(t)$	$c_1 F(s) + c_2 G(s)$
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$f(t) * g(t)$	$F(s) \cdot G(s)$
$t^n$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$e^{at} f(t)$	$F(s-a)$
$e^{at}$	$\frac{1}{s-a}$	$f(t+a)u(t+a)$	$e^{as} F(s)$
$\sin(at)$	$\frac{a}{s^2 + a^2}$	$\frac{d^n}{dt^n} f(t)$	$s^n F(s) - s^{n-1} f(0) \cdots - f^{(n-1)}(0)$
$\cos(at)$	$\frac{s}{s^2 + a^2}$	$t^n f(t)$	$(-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s)$
$\sinh(at)$	$\frac{a}{s^2 - a^2}$	$\int_0^t f(\tau) d\tau$	$\frac{1}{s} F(s)$
$\cosh(at)$	$\frac{s}{s^2 - a^2}$	$\frac{1}{t} f(t)$	$\int_s^\infty F(\xi) d\xi$

Table 2: 基本函數拉普拉斯變換與拉普拉斯變換之性質

**Question** Find the Laplace transform of following functions.

▷  $\mathcal{L} \{te^{-2t} \sin(t)\}.$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L} \{te^{-2t} \sin(t)\} &= -\frac{d}{ds} \mathcal{L} \{e^{-2t} \sin(t)\} \\
 &= -\frac{d}{ds} \left( \frac{1}{s^2 + 1} \Big|_{s \rightarrow s+2} \right) \\
 &= -\frac{d}{ds} \left( \frac{1}{(s+2)^2 + 1} \right) = \frac{2(s+2)}{((s+2)^2 + 1)^2}
 \end{aligned}$$

►  $\mathcal{L} \{te^t \cos(2t)\}.$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L} \{te^t \cos(2t)\} &= -\frac{d}{ds} \mathcal{L} \{e^t \cos(2t)\} \\
 &= -\frac{d}{ds} \left( \frac{s}{s^2 + 4} \Big|_{s \rightarrow s-1} \right) \\
 &= -\frac{d}{ds} \left( \frac{s-1}{(s-1)^2 + 4} \right) = \frac{(s-1)^2 - 4}{((s-1)^2 + 4)^2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\triangleright \mathcal{L} \left\{ e^{-t} \int_0^t \sin(2\tau) \, d\tau \right\}. \\
&\mathcal{L} \left\{ e^{-t} \int_0^t \sin(2\tau) \, d\tau \right\} = \mathcal{L} \left\{ \int_0^t \sin(2\tau) \, d\tau \right\} \Big|_{s \rightarrow s+1} \\
&= \left( \frac{1}{s} \cdot \frac{2}{s^2 + 4} \right) \Big|_{s \rightarrow s+1} \\
&= \frac{2}{(s+1)((s+1)^2 + 4)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\blacktriangleright \mathcal{L} \left\{ e^{2t} \int_0^t \tau e^{-3\tau} \, d\tau \right\}. \\
&\mathcal{L} \left\{ e^{2t} \int_0^t \tau e^{-3\tau} \, d\tau \right\} = \mathcal{L} \left\{ \int_0^t \tau e^{-3\tau} \, d\tau \right\} \Big|_{s \rightarrow s-2} \\
&= \left( \frac{1}{s} \mathcal{L} \{ \tau e^{-3\tau} \} \right) \Big|_{s \rightarrow s-2} \\
&= \left( \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{(s+3)^2} \right) \Big|_{s \rightarrow s-2} \\
&= \frac{1}{(s-2)(s+1)^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\triangleright \mathcal{L} \left\{ t \int_0^t e^{-2\tau} \, d\tau \right\}. \\
&\mathcal{L} \left\{ t \int_0^t e^{-2\tau} \, d\tau \right\} = -\frac{d}{ds} \mathcal{L} \left\{ \int_0^t e^{-2\tau} \, d\tau \right\} \\
&= -\frac{d}{ds} \left( \frac{1}{s} \mathcal{L} \{ e^{-2t} \} \right) \\
&= -\frac{d}{ds} \left( \frac{1}{s(s+2)} \right) \\
&= \frac{2s+2}{s^2(s+2)^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\blacktriangleright \mathcal{L} \left\{ t \int_0^t \cos(\tau) \, d\tau \right\}. \\
&\mathcal{L} \left\{ t \int_0^t \cos(\tau) \, d\tau \right\} = -\frac{d}{ds} \mathcal{L} \left\{ \int_0^t \cos(\tau) \, d\tau \right\} \\
&= -\frac{d}{ds} \left( \frac{1}{s} \cdot \frac{s}{s^2 + 1} \right) \\
&= -\frac{d}{ds} \left( \frac{1}{s^2 + 1} \right) \\
&= \frac{2s}{(s^2 + 1)^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\triangleright \mathcal{L} \left\{ \int_0^t (t-\tau) e^{2\tau} \cos(\tau) \, d\tau \right\} \\
\mathcal{L} \{ t * (e^{2t} \cos t) \} &= \mathcal{L} \{ t \} \cdot \mathcal{L} \{ e^{2t} \cos t \} \\
&= \frac{1}{s^2} \cdot \left( \frac{s}{s^2+1} \Big|_{s \rightarrow s-2} \right) \\
&= \frac{1}{s^2} \cdot \frac{s-2}{(s-2)^2+1} \\
&= \frac{s-2}{s^2(s^2-4s+5)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\blacktriangleright \mathcal{L} \left\{ \int_0^t e^{-(t-\tau)} \tau \sin(\tau) \, d\tau \right\} \\
\mathcal{L} \{ e^{-t} * (t \sin t) \} &= \mathcal{L} \{ e^{-t} \} \cdot \mathcal{L} \{ t \sin t \} \\
&= \frac{1}{s+1} \cdot \left( -\frac{d}{ds} \frac{1}{s^2+1} \right) \\
&= \frac{1}{s+1} \cdot \frac{2s}{(s^2+1)^2} \\
&= \frac{2s}{(s+1)(s^2+1)^2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\triangleright \mathcal{L} \{ ty''(t) + y'(t) + ty(t) \} \text{ with } y(0) = 1, y'(0) = 0. \\
\mathcal{L} \{ ty'' + y' + ty \} &= -\frac{d}{ds} \mathcal{L} \{ y'' \} + \mathcal{L} \{ y' \} - \frac{d}{ds} \mathcal{L} \{ y \} \\
&= -\frac{d}{ds} (s^2 Y(s) - s) + (sY(s) - 1) - \frac{d}{ds} Y(s) \\
&= -(2sY(s) + s^2 Y'(s) - 1) + sY(s) - 1 - Y'(s) \\
&= -(s^2 + 1)Y'(s) - sY(s)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\blacktriangleright \mathcal{L} \{ ty''(t) + (1-t)y'(t) \} \text{ with } y(0) = 1, y'(0) = 0. \\
\mathcal{L} \{ ty'' + y' - ty' \} &= -\frac{d}{ds} \mathcal{L} \{ y'' \} + \mathcal{L} \{ y' \} + \frac{d}{ds} \mathcal{L} \{ y' \} \\
&= -\frac{d}{ds} (s^2 Y(s) - s) + (sY(s) - 1) + \frac{d}{ds} (sY(s) - 1) \\
&= -(s^2 Y'(s) + 2sY(s) - 1) + sY(s) - 1 + (sY'(s) + Y(s)) \\
&= (s - s^2)Y'(s) + (1 - s)Y(s)
\end{aligned}$$

### 3. Pole-Zero Intuition

在對於一個線性系統，輸入  $X(s)$  與輸出  $Y(s)$  的關係為：

$$Y(s) = H(s) \cdot X(s) = A \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_n)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_m)} \cdot X(s)$$

其中，使分子為零的跟  $z_i$  稱為系統的**零點 (Zeros)**；使分母為零  $p_i$  稱為**極點 (Poles)**. 當我們輸入單位脈衝  $\delta(t)$ ，其拉普拉斯變換為  $X(s) = 1$ . 此時系統的輸出直接等於轉移函數：

$$Y(s) = H(s) \cdot 1 = \sum \frac{A_i}{s - p_i} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} y(t) = \sum A_i e^{p_i t}$$

這告訴我們一個重要結論：「極點  $p_i$  決定了系統自然響應的行為」。無論外力如何，系統總是傾向於以  $e^{p_i t}$  的形式運動：




Figure 2: The  $s$ -Plane

Next Week: Inverse Laplace Transform, Laplace Transform for solving DEs.