

## 1. 黎曼和與定積分

微分描述函數的變化率，而積分則累積函數隨變量的量。對單變數函數  $f(x)$ ，在閉區間  $[a, b]$  上的定積分可視為曲線下與  $x$  軸圍成的面積。

### Definition

若  $f$  在  $[a, b]$  上片段連續<sup>1</sup>，選任意分割  $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ ， $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ ，則：

- $R_{f,[a,b],P} = \sum_{k=1}^n f(x_k^*) \Delta x_k$  為 **黎曼和 (Riemann Sum)**，其中  $x_k^* \in [x_{k-1}, x_k]$
- $U_{f,[a,b],P} = \sum_{k=1}^n M_k \Delta x_k$  為 **上和 (Upper Sum)**，其中  $M_k = \max_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x)$
- $L_{f,[a,b],P} = \sum_{k=1}^n m_k \Delta x_k$  為 **下和 (Lower Sum)**，其中  $m_k = \min_{x \in [x_{k-1}, x_k]} f(x)$




Figure 1: 上下和與黎曼和關係：上和由最大值決定，下和由最小值決定，黎曼和由任意取樣值決定，因此  $L_{f,[a,b],P} \leq R_{f,[a,b],P} \leq U_{f,[a,b],P}$ 。

當分割點  $n \rightarrow \infty$  使分割最長區間  $\|P\| \rightarrow 0$ ，若上、下和極限皆為  $A$ ，由夾擠定理，黎曼和極限亦趨向  $A$ 。此時稱  $f$  在  $[a, b]$  上**可積 (Integrable)**，並將此極限稱為函數  $f$  從  $a$  到  $b$  的**定積分 (Definite Integral)**，記為：

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x_i = \int_a^b f(x) \, dx$$

或者用  $\varepsilon - \delta$  語言可以寫成：

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ 使得 } \forall n > 0 \text{ 皆有 } \left| \int_a^b f(x) \, dx - \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x_i \right| < \varepsilon$$

**Remark** 積分式中的  $a$  稱為下限 (Lower Limit)、 $b$  稱為上限 (Upper Limit)； $f(x)$  被稱為被積函數 (Integrand)。

<sup>1</sup>片段連續 (Piecewise continuous) 指不連續點只有可數個

**Question** 判斷下列敘述是否正確，並給出簡單說明。

▷ 錯 若  $f(x)$  在  $[a, b]$  上有時為正、有時為負，則  $\int_a^b f(x) \, dx$  表示曲線與  $x$  軸之間的總面積。

定積分表示的是有向面積，不是總面積。若要求曲線與  $x$  軸之間的總面積，應計算

$$\int_a^b |f(x)| \, dx.$$

▶ 錯 若  $\int_0^1 f(x) \, dx = 0$ ，則  $f(x) = 0$  對所有  $0 \leq x \leq 1$  皆成立。

定積分為 0 只表示正負有向面積可能互相抵消，不代表函數處處為 0。例如  $f(x) = x - \frac{1}{2}$  在  $[0, 1]$  上的定積分為 0，但它不是零函數。

**Question** 將以下極限改寫為定積分式。

▷  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + \frac{k}{n}}$

這裡  $\Delta x = \frac{1}{n}$ ，取樣點為  $x_k = \frac{k}{n}$ ，因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + \frac{k}{n}} = \int_0^1 \sqrt{1+x} \, dx$$

▶  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2+1} + \sqrt{n^2+4} + \cdots + \sqrt{n^2+n^2}}{n^2}$

先將每一項整理成黎曼和的形式：

$$\frac{1}{n^2} \sqrt{n^2 + k^2} = \frac{1}{n} \sqrt{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2}.$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2+1} + \sqrt{n^2+4} + \cdots + \sqrt{n^2+n^2}}{n^2} = \int_0^1 \sqrt{1+x^2} \, dx$$

**Remark** 要將無窮級數整理為黎曼和、進而改寫為積分式時，需要整理出  $\Delta x = \frac{1}{n}$ 、 $x_k = \frac{k}{n}$  並且  $n \rightarrow \infty$ 。

**Theorem.** (定積分的基本性質) 若  $f, g$  在  $[a, b]$  上可積, 且  $c \in \mathbb{R}$ , 則:

1.  $\int_a^b cf(x) \, dx = c \int_a^b f(x) \, dx$
2.  $\int_a^b (f(x) + g(x)) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx$
3.  $\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx$ , 其中  $c \in [a, b]$ .
4. 若  $f(x) \geq g(x)$  於  $[a, b]$  上成立, 則  $\int_a^b f(x) \, dx \geq \int_a^b g(x) \, dx$
5. 若  $f$  為奇函數, 則  $\int_{-a}^a f(x) \, dx = 0$ .
6. 若  $f$  為偶函數, 則  $\int_{-a}^a f(x) \, dx = 2 \int_0^a f(x) \, dx$ .

**Question** 判斷下列敘述是否正確, 並給出簡單說明.

- ▷ 對 若  $f, g$  在  $[a, b]$  上連續, 則  $\int_a^b [f(x) + g(x)] \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx$ .  
這是定積分的線性性質.
- ▷ 錯 若  $f, g$  在  $[a, b]$  上連續, 則  $\int_a^b f(x)g(x) \, dx = \left( \int_a^b f(x) \, dx \right) \left( \int_a^b g(x) \, dx \right)$ .  
定積分對加法與常數倍有線性性質, 但沒有乘法拆開性質. 例如在  $[0, 1]$  上取  $f(x) = g(x) = x$ , 則  $\int_0^1 x^2 \, dx = \frac{1}{3} \neq \left( \int_0^1 x \, dx \right)^2 = \frac{1}{4}$
- ▶ 錯 若  $f$  在  $[a, b]$  上連續, 則  $\int_a^b xf(x) \, dx = x \int_a^b f(x) \, dx$ .  
積分變數  $x$  不是常數, 不能直接提出積分號外. 只有與積分變數無關的常數才能提出.
- ▶ 對  $\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^b f(z) \, dz$ .  
只要上下限相同、被積函數代表同一規則, 使用不同的積分變數如  $x$  或  $z$  並不影響積分值.

## 2. 微積分基本定理

黎曼和給出了定積分的定義，但直接用黎曼和計算定積分通常非常繁複。微積分基本定理的意義在於：它把「累積」與「變化」連接起來，使我們能用微分的反向操作計算積分：

**Theorem.** (微積分基本定理第一部分, F.T.C. I) 給定在區間  $[a, b]$  上的連續函數  $f(x)$ ，那麼：

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

更一般的，我們有：

$$\frac{d}{dx} \int_{g(x)}^{h(x)} f(t) dt = f(h(x)) \cdot h'(x) - f(g(x)) \cdot g'(x)$$

**Question** Calculate the following expression.

$$\triangleright \frac{d}{dx} \int_2^x \sqrt{1+t^3} dt = \sqrt{1+x^3}$$

$$\blacktriangleright \frac{d}{dx} \int_{e^1}^{e^x} \ln u du = \ln e^x \cdot (e^x)' - 0 = xe^x$$

$$\triangleright \frac{d}{dx} \int_x^{x^2} e^{5y} dy = e^{5x^2} \cdot (x^2)' - e^{5x} = 2xe^{5x^2} - e^{5x}$$

$$\blacktriangleright \frac{d}{dx} \int_{\sin x}^{e^x} \ln(1+t^2) dt = \ln(1+e^{2x}) \cdot e^x - \ln(1+\sin^2 x) \cdot \cos x$$

**Question** Calculate the following expression.

$$\triangleright \text{Given } \int_{x^2}^2 f(t^3) dt = \frac{1}{2} \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right), \text{ find } f(1).$$

$$\stackrel{\frac{d}{dx}}{\Rightarrow} 0 - f((x^2)^3) \cdot 2x = \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{2} x$$

$$\Rightarrow -f(1) \cdot 2 = \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{2} = 0, \text{ for } x = 1$$

$$\Rightarrow f(1) = 0$$

$$\blacktriangleright \text{Given } \int_0^{x^3} f(2t+1) dt = x^6 + 2x^3, \text{ find } f(3).$$

$$\stackrel{\frac{d}{dx}}{\Rightarrow} f(2x^3+1) \cdot 3x^2 - 0 = 6x^5 + 6x^2$$

$$\Rightarrow f(2x^3+1) \cdot 3x^2 = 6x^2(2x^3+2)$$

$$\Rightarrow f(2x^3+1) = 2x^3+2$$

$$\Rightarrow f(3) = 2(1)^3 + 2 = 4, \text{ for } x = 1$$

**Remark** 若  $f$  在包含  $a$  的某區間上連續，並定義  $F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$  則  $F$  可微，且  $F'(x) = f(x)$ . 這個結論的意義是：若  $F(x)$  表示從  $a$  累積到  $x$  的總量，那麼  $F'(x)$  就是累積量在  $x$  當下的增加速度，也就是原本被累積的函數  $f(x)$ .

**Theorem.** (微積分基本定理第二部分, F.T.C. II) 給定在區間  $[a, b]$  上的可積函數  $f(x)$ ，若  $f(x)$  在  $[a, b]$  上連續，且  $F'(x) = f(x)$ ，那麼：

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(x) \Big|_{x=a}^{x=b} = F(b) - F(a)$$

並且我們稱  $F(x)$  是  $f(x)$  的**反導函數 (Anti-Derivative)**.

**Question** Calculate the folloing integral.

$$\triangleright \int_a^b x^p \, dx = \frac{1}{p+1} x^{p+1} \Big|_{x=a}^{x=b} = \frac{b^{p+1}}{p+1} - \frac{a^{p+1}}{p+1}$$

$$\blacktriangleright \int_0^5 2x + 5 \, dx = x^2 + 5x \Big|_{x=0}^{x=5} = (5^2 + 5 \cdot 5) - (0^2 + 5 \cdot 0) = 50$$

$$\triangleright \int_0^1 2^x \ln 2 \, dx = 2^x \Big|_{x=0}^{x=1} = 2^1 - 2^0 = 2 - 1 = 1$$

$$\blacktriangleright \int_0^1 3^x \, dx = \frac{3^x}{\ln 3} \Big|_{x=0}^{x=1} = \frac{3^1}{\ln 3} - \frac{3^0}{\ln 3} = \frac{2}{\ln 3}$$

$$\triangleright \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx = \sin x \Big|_{x=0}^{x=\frac{\pi}{2}} = \sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 = 1 - 0 = 1$$

$$\blacktriangleright \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx = -\cos x \Big|_{x=0}^{x=\frac{\pi}{2}} = \left(-\cos \frac{\pi}{2}\right) - \left(-\cos 0\right) = (-0) - (-1) = 1$$

**Question** 判斷下列敘述是否正確，並給出簡單說明.

$$\triangleright \underline{\text{錯}} \text{ 若 } f \text{ 在 } [a, b] \text{ 上連續，則 } \frac{d}{dx} \left( \int_a^b f(t) \, dt \right) = f(x).$$

左側積分上下限都是常數，所以  $\int_a^b f(t) \, dt$  是一個常數；對  $x$  微分後應為 0.

$$\triangleright \underline{\text{對}} \text{ 若 } f' \text{ 在 } [1, 3] \text{ 上連續，則 } \int_1^3 f'(y) \, dy = f(3) - f(1).$$

這是微積分基本定理的直接應用.

### 3. 不定積分 & 反導函數

在微積分基本定理第二部分中，我們需要找到滿足  $F'(x) = f(x)$  的反導函數。為了表示所有反導函數，我們使用 **不定積分 (Indefinite Integral)**：

$$\int f(x) \, dx = F(x) + C \iff F'(x) = f(x),$$

其中  $C$  為積分常數。

**Remark** 定積分的結果是數值、不定積分的結果是一系列的函數、而反導函數是不定積分之中的單一個函數。不定積分記得  $+C$ 、記得  $+C$ 、記得  $+C$ 、記得  $+C$ 。

**Question** Calculate the following integral.

$$\triangleright \int dx = \int 1 \, dx = x + C$$

$$\blacktriangleright \int t^5 + \sqrt{t} \, dt = \frac{t^6}{6} + \frac{t^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C$$

$$\triangleright \int \sec^2 x \, dx = \tan x + C$$

$$\blacktriangleright \int \sec x \tan x \, dx = \sec x + C$$

$$\triangleright \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \sin^{-1} x + C$$

$$\blacktriangleright \int \frac{1}{1+x^2} \, dx = \tan^{-1} x + C$$

$$\triangleright \int \frac{2x}{x^2} \, dx = \int \frac{(x^2)'}{x^2} \, dx = \ln |x^2| + C$$

$$\blacktriangleright \int \frac{\cos x}{1 + \sin x} \, dx = \int \frac{(1 + \sin x)'}{1 + \sin x} \, dx = \ln |1 + \sin x| + C$$

## 4. 羅必達法則

在 Handout1 中，我們已經看過許多極限計算方法，例如代入、化簡、三角極限與夾擠定理。當極限呈現  $\frac{0}{0}$  或  $\frac{\infty}{\infty}$  型不定式時，羅必達法則提供了另一種方法：若分子與分母同時趨近於 0 或同時發散，則可以比較它們的導數。

**Theorem. (羅必達法則 (L'Hôpital's Rule))** 若  $f, g$  在  $a$  附近可微，且  $g'(x) \neq 0$ 。若

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$$

或

$$\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow a} |g(x)| = \infty,$$

並且

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

存在或為  $\pm\infty$ ，則

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

**Question** Calculate the following limit.

$$\begin{aligned} \triangleright \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3} &\stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{3x^2} \\ &= \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x}{3x^2} \\ &= \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \blacktriangleright \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} &\stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1}{2x} \\ &\stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \triangleright \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \\ &\stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{-1}{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} -x = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \blacktriangleright \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x^2}} \\ &\stackrel{L}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{-2}{x^3}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{1}{2}x^2 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \triangleright \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\pi}{x}\right)^x &= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\ln \left(1 + \frac{\pi}{x}\right)^x} \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left(1 + \frac{\pi}{x}\right)^x} \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{\pi}{x}\right)}{\frac{1}{x}}} \\
 &\stackrel{L}{=} e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\pi/x^2}{-1/x^2}} \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi}{1 + \pi/x}} = e^\pi
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \blacktriangleright \lim_{x \rightarrow 0^+} (e^{2x} + 2x)^{\frac{2}{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln (e^{2x} + 2x)^{\frac{2}{x}}} \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln (e^{2x} + 2x)^{\frac{2}{x}}} \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \ln (e^{2x} + 2x)}{x}} \\
 &\stackrel{L}{=} e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} 2 \cdot \frac{2e^{2x} + 2}{e^{2x} + 2x}} \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{4(e^{2x} + 1)}{e^{2x} + 2x}} \\
 &= e^{\frac{4(1+1)}{1+0}} = e^8
 \end{aligned}$$

**Remark** 羅必達法則只能直接用在  $\frac{0}{0}$  與  $\frac{\infty}{\infty}$  型不定式. 其他型態, 例如  $0 \cdot \infty$ 、 $\infty - \infty$ 、 $1^\infty$ , 必須先改寫成分式型不定式後才能使用.

**Question** 判斷下列敘述是否正確, 並給出簡單說明.

$\triangleright$  錯 只要  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$  代入後分母為 0, 就可以直接使用羅必達法則.

羅必達法則要求整體型態必須是  $\frac{0}{0}$  或  $\frac{\infty}{\infty}$  不定式. 若分子不趨近於 0, 例如  $\frac{1}{x}$  在  $x \rightarrow 0$ , 則不是  $\frac{0}{0}$  型.

$\blacktriangleright$  錯 使用羅必達法則時, 若一次微分後仍然得到  $\frac{0}{0}$ , 則原極限不存在. 若微分後仍是  $\frac{0}{0}$  或  $\frac{\infty}{\infty}$ , 可以在條件允許下繼續使用羅必達法則.



## 習題

### ► 洛必達法則與微積分基本定理

1. (師大微乙 (一)114#4) Find the limit if it exists. (求極限若存在)

$$(a) \lim_{t \rightarrow (-2)^+} \int_t^2 \frac{5t + 10}{x^2 - x - 6} dx \qquad (b) \lim_{x \rightarrow 0} \left( \csc^2(x) - \frac{1}{x^2} \right)$$

2. (師大微乙 (一)113 暑 #1) Apply the L'Hôpital rule to evaluate the following limits.

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x \qquad (b) \lim_{k \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{\pi}{k} \right)^k.$$

3. (師大微乙 (一)113 暑 #5) Let  $f$  be continuous on its domain. Suppose that

$$\int_0^{x^3} f(3t^2 - 6t) dt = \ln x$$

Find the value of  $f(2025)$ . (★ Hint:  $2025 = 27 \times 75$ )

4. (師大微乙 (一)113#1) Find the limit if it exists.

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\ln \cos 2x} \qquad (c) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_{\sqrt{x}}^0 \sin t^2 dt}{\sqrt{x^3}}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0^+} (e^{2x} + 2x)^{\frac{2}{x}}$$

5. (師大微乙 (一)112#4) Let  $F(x) = \int_{x^2}^0 \arctan(t) dt$  for all  $x \in \mathbb{R}$ .

(a) Find the open intervals on which  $F$  is increasing or decreasing.

(b) Evaluate  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{F(x)}{x^2}$ .

6. (師大微乙 (一)110#2) 使用羅畢達法則計算以下的極限. (Apply L'Hopital's rule to evaluate the following limits.)

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x \qquad (b) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos(\pi x - \frac{\pi}{2})}{x - 1}$$

7. (師大微乙 (一)109#2) Evaluate the limit.

$$(a) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin(2x))^{3x}$$

8. (師大微乙 (一)107#2) Evaluate the limit  $\lim_{x \rightarrow 1^+} (\ln x)^{x-1}$ .

9. (師大微乙 (一)106#4) 請用羅必達法則 (L' Hôpital Rule) 求極限  $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{25-x^2}}{x-5}$ .
10. (師大微乙 (一)105#2) 已知  $\int_0^{x^5} f(2t^2 - t + 1) dt = \ln x$ , 求  $f(2017)$  的值.
11. (師大微乙 (一)105#5) 求極限  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{4} + \int_1^x t \ln t dt}{x \ln x - x + 1}$  的值.
12. (師大微乙 (一)104#4) 已知  $\int_{x^2}^2 f(t^3) dt = \frac{1}{2} \sin(\frac{\pi}{2}x)$ , 求  $f(1)$ .
13. (師大微乙 (一)103#5) 已知  $\int_0^{x^2} f(t) dt = \cos \pi x$ , 求  $f(2) = ?$
14. (師大微乙 (一)102#6) 令函數  $f(x) = \int_0^{x^2} \cos t^3 + 1 dt$ , 求  $f'(x)$ .

► 黎曼和與積分式分析<sup>2</sup>

15. (師大微乙 (一)113 暑 #6) Let the function  $f(x) = \frac{1}{1+x}$  be defined on the interval  $[0, 2]$ . Now, divide (分割) the interval  $[0, 2]$  into  $n$  equal sub-intervals ( $n$  等份的子區間). For each (每個)  $k = 1, 2, \dots, n$ , let the  $k$ -th sub-interval be

$$\left[ \frac{2(k-1)}{n}, \frac{2k}{n} \right]$$

and choose an arbitrary point  $c_k$  within the  $k$ -th sub-interval (在第  $k$  個子區間中任意選擇一個點  $c_k$ ). Also, define the sequence  $S_n$  (數列  $S_n$ ) as

$$S_n = \frac{2}{n} [f(c_1) + f(c_2) + \dots + f(c_n)].$$

- (a) (3 pts) Is  $S_1 > S_2$  always true? Give your reason!
- (b) (3 pts) What is the maximum value of  $S_4$ ?
- (c) (4 pts) Find the value of  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ .
16. (師大微乙 (一)113 暑 #7) Let  $f$  be a function such that  $f$  is differentiable on  $[a, b]$  and  $f'$  is continuous on  $[a, b]$ .

- (a) Suppose  $f$  is one-to-one on  $[a, b]$ , prove that

$$\int_a^b f(x) dx + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(x) dx = bf(b) - af(a)$$

(★ Hint: Let  $y = f^{-1}(x)$ , then  $y = f^{-1}(x) \iff x = f(y)$ )

<sup>2</sup>部分積分式分析題目須使用 Handout5 所介紹之變數變換技巧，目前可暫時略過。




Figure 2: (The above figure shows the graph of the function  $f(x) = \frac{1}{1+x}$ )

(b) Evaluate the integral  $\int_{11}^{30} \sqrt[3]{\sqrt{x} - 3} - 2 \, dx$ .

(★ Hint: Note that  $f(x) = \sqrt[3]{\sqrt{x} - 3} - 2$  is one-to-one on  $[11, 30]$ )

17. (師大微乙 (一)113#7) Evaluate  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sum_{k=1}^n \left( \frac{7 \cdot 2^k \cdot k^6}{n^7} - \frac{4 \cdot 2^k \cdot k^3}{n^4} + \frac{2}{n} \right) \right)$ .

(Hint: The question is about a limit of some Riemann sum (黎曼和). Find the definite integral that the limit represents and evaluate it.)

18. (師大微乙 (一)111#3) Solve the initial value problem for  $y$  as a function of  $x$

$$\sqrt{x^2 - 9} \frac{dy}{dx} = 1, x > 3, \quad y(5) = \ln 3.$$

19. (師大微乙 (一)111#4) Consider the well-known standard logistic function(標準型邏輯斯諦函數)

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}.$$

A typical(典型的) application is a model(模型) of population growth(人口成長), and the logistic functions are widely(廣泛地) used in probability(機率), statistics(統計), machine learning(機器學習), chemistry(化學), social science(社會科學) and so on.

(a) Find all antiderivatives of  $f(x)$ .

(b) Show that  $f(x)$  is a solution of the first-order non-linear ordinary differential equation(一階非線性常微分方程)

$$\frac{dy}{dx} = y(1 - y)$$

with the initial value condition  $y(0) = \frac{1}{2}$ .

20. (師大微乙 (一)111#5) Consider the error function(誤差函數)

$$F(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

in areas(領域) of probability(機率) and statistics(統計).

- (a) Is  $F(x)$  continuous?
  - (b) Does the graph of  $F(x)$  have horizontal tangent lines?
  - (c) Does the graph of  $F(x)$  have inflection points(反曲點)?
  - (d) (Bonus) Does the graph of  $F(x)$  have horizontal asymptotes(水平漸近線)?  
(Hint: The direct comparison test below will be useful.)
21. (師大微乙 (一)110#6) (Bonus) 證明下列積分值相等 (Prove the following identity.)

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x \, dx$$

其中  $n$  是正整數. (where  $n$  is a positive integer.)

22. (師大微乙 (一)108#2) Evaluate the following limit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2 + 1} + \sqrt{n^2 + 4} + \sqrt{n^2 + 9} + \cdots + \sqrt{n^2 + (n-1)^2}}{n^2}$$

by using an appropriate Riemann sum.

23. (師大微乙 (一)106#6) 證明下列積分值是相等的.

$$\int_0^1 x^a (1-x)^b \, dx = \int_0^1 x^b (1-x)^a \, dx$$

其中  $a, b > 0$ .

24. (師大微乙 (一)104#6) 給一積分式，如下：

$$\int_a^b \sqrt{x - x^2} \, dx$$

其中  $a, b \in [0, 1]$ . 式之最大值為何？請說明原因.

25. (師大微乙 (一)102#8) 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + \frac{k}{n}}$  (將里曼和 (Riemann sum) 之極限表成定積分，再求出定積分的值.)