新刊南桑神效十科應治卷之五

不痛科

汗症

夫汗者血之異名而則爲津液爲血外則爲汗有勞役而汗者有飲食热物氣冲而汗者有陽虛而自汗者有陰虛而盜汗者有感風而汗者有亡陽而汗者有勞役而汗者不治自愈亡陽而汗者危急之甚治者宜採方而投之一經治係食發汗乃脾胃症也猪肝一片薄切炭上焙乾爲

来猪白粥和丸梧子大每服二十丸茶汤送下日五次服大驺

一傳治冷風出汗　荆芥水煎服取效

一傳治膝理虛而日夜出汗淋漓及傷寒後表虛汗出不止

骨扁裂取纸三分乳鉢一分同烧灰為末每服一匙水調服立

效一方全用扁無鉢

一方治自汗不止　磬金水磨塗乳上乃止

又经方　何首烏為末以津液丸腐中乃止

又经方　白蔻末研成粉以绢包頻扑撲之大驺

一经治盗汗神方　牡蛎为末煅舂九如梧子大每服十九温酒送下

又经方　豆豉微炒酒浸任服

一经治人全身無汗惟心胸一處汗出不止此因思慮而得名曰心汗　茯神為末用艾葉煎湯調下效服立愈

又傳方　竜胆為末每服一刂猪胆汁二三点入温酒服效

又经方　蓝汞每用四十九根水二升煎至半頓服以愈為度

一傳方寒熱汗　桑葉経霜者為末每服二刂米飲調下日三服

眩暈

夫眩暈者眩言其眷暗　暈言其旋轉眷暗旋轉如立小舟偏車之上起則欹倒也其病所發風則無汗寒則掣痛暑則熱悶濕則沉濡此四氣乘虛而成此症也又有外感內傷之分非以一途治或七情鬱結生痰阻氣上逆而眩暈或濕熱過度腎經虧乏不能納氣歸源使氣逆上奔此氣虛而眩暈或飲血崩漏肝經不能收攝使諸血失道妄行此血虛而眩暈又有新產之後下血過多或血瘀不行而眩暈宜審其本

而施治之然此症多屬氣血兩虛不能支持相火妄動因而成疾或中有因風而作但用風藥不可過多恐助火燬腎使眩暈愈作全在活法莫拘一途

一經治諸般頭風腦痛眼瞤目眩　香附米菊花荊芥各一兩

諸藥三分共為末每服二錢食前茶葱和煎湯調下見效一言知為再

又傳方　何首烏香附米等分共為末每服二錢茶葱和煎湯調下

又經治頭風旋運　蜂蜜一斤生薑汁一斤共和勻每服一匙

酒調下如不能飲酒以白湯調下不拘時服神效

一經治暗風痫病證作暫時救倒者 芭蕉大株以竹簡刺入株中令汁流出以甜盛飲之取吐甚有奇效

一經治頭風暫 蒼耳葉晒乾為末每服一小匙酒調下日三服若吐煉蜜丸梧子大每服二十丸十日平好此藥善通頂門其功甚效忌豬肉 一方加荊芥香附等分

一經治頭暫吐逆乃胃冷生痰也 炮姜二判半甘草炙二判水一鐘半煎至半服果效

一经治风疾上攻目眩发汗，萝蔔根捣取汁入萝蔔心浸服为末食後热汤调下立愈

麻木

夫麻木之为病者，蓋因风寒湿三气合而为病，麻是气虚，木是湿痰死血也，故寒气多者为痛痺，湿气多者为着痺，其不痛不仁者，乃病久入深，荣卫之行涩，经络之理疎，故不痛，所謂不仁者，周身或四肢皮膚不知自己也，亦有血少气虚而不克行者，治宜随病而引方焉

一傳治手足麻木或不仁不遂久成鶴膝舉動不得者大蒼子
根洗淨切片一味平口好酒一斤浸入瓶封固掘土埋一尺
許深可容斤酒以下用棗殼填滿穴中用火燃之棗殼燒
盡雨添自寬至中夜將出埋別地一日去火毒每服一盃日
三服以愈為度

又傳方金英藤根取皂使男人向東以足踏地三次先下左
手掘以根矣遍刮去粗皮切細酒浸過適飲之一年病服一
月一月病服半旬即愈真仙方也

一僧治麻木痺濕痰弱不能步履灯籠草全用根枝葉洗
掌忌鉄器水捶打焫用好酒噴如霧陳拌勻鋪入土罐蒸之
陰乾三日又用酒噴再蒸如此九次共計二十七日乃成即
遵用多少酒浸于新瓦罐滴水猪之投藥粒于壇中候藥粒開
蒸將酒瓦出埋土下一日夜以去火毒每日卯午酉三次服
每服一二錢随日漸愈

又方大藤皮七分鋼鎌根四枝錦藤根三藤葉根三鶴虱根三
馬鞭根三黄芪根三吉貝根五分右各味洗淨剉細一大斗水

酒一大坏紧闭封固用巨锅隔水煮之投栗粒于水中以栗粒大闻为度又将出埋土中一日去火毒日三服以酪耐为度此为不忌诸物以多食为妙

一经治身体手足麻木不仁 芥子散末以醋调釜之妙

又傳方 姜黄桂枝去皮菊花石斛蔓荆子松叶酒洗各等分 剉细水煎食远服 又经方桑叶煮汁霜者水盥洗常洗效

一经治股肱麻痹不仁者 姜白矾多食自愈

痿躄 湯液論

夫痿躄者在足軟弱不能拳動趨步在手戰掉不能運使支持此症屬陰血虛虛則生內熱熱則筋弛而手足軟弱也經又分血熱濕氣虛血虛血瘀之論然治血者以補血為要血澁則崩榮筋榮則力壯也

一經治足雙筋急挂枝為末用酒調塗之一日一次神效

一經治腰腳不遂拳急冷痛虎脛骨五六寸打破去膜髓用酥塗炙黃為末以絹囊盛之酒一斗浸于瓶中以糠火微溫七日後任意飲云當少下利立愈

一傳治手足痺　鷄破腹去腸以生姜三兩澤漆切細混入鷄肉滿水煮之熟食鷄肉如此數次效

一經治膏腰痿軟足弱不勤及遍身瘡痒何首烏牛必各一斤並忌鉄器去黄水洗淨浸滿七日晒乾爲末煉蜜丸梧子大每服三十至五十丸空心酒湯或湯送下忌食猪肉

又方　何首烏一斤忌鉄器用竹刀刮去外皮未經打破米泔浸一宿晒乾又壯婦生男乳汁混拌晒乾再混再晒二次爲末以棗子水煮取肉和爲丸或久病者用白蜜煉爲梧子大

和服三十丸每日加五丸勿過空心鹽湯送下大妙

一經治手足痿弱小便頻數面色無光及治陰事不舉鹿茸一兩去毛切片山藥末一兩用綿裹蒸之浸酒七日取酒日飲三盃又將鹿茸焙為末神效又云鹿肋豬肺多端食甚效

一經治丈夫陰痿不舉蛭蛾到去頭翼足炒乾為末煉蜜丸梧子大每夜服一丸可御十女以菖蒲浸酒飲一杯即止

又方鯉魚腦一个雄鷄肝一个為末用雀卵和為丸如小豆每吞一丸又經方雄鷄肝三个兔糞子一斤勿用同為末

崔明心搗和為丸如小豆每服一百丸空心酒送下漸加即止

又經方 磁石一斤為末清酒浸十四日每服二錢日三服久乃見效

又經方 五味子不為末每服一升漫酒下日三服冬一剂即得力百服百中

又經方 好酒和黃土泥塗塗瓦除一日其湯乃起

又經方 瘦舍子酒炒乾研末每服三方清晨酒調下效

又經方 蜂房燒為末每用二分空心用新汲水調下可御十女

又以蜂房燒存為末和塗上即熱起也

又傳方 牡蠣火煅蛇床子乾荷葉乾等分為末每用

三日水一味煎至四五沸候温浸洗極效忌犯風寒

癲癎

夫癲癎之爲病雖是一般如癲者喜笑不常言語錯乱顛倒重復者此心血不足而發癎者狂乱而無定也若見妄言妄走妄行此痰火鬱盛而發癎由喜傷于心怒傷于肝乃二臟有餘之症大凡癲者多爲求望不遂其志而致宜安神養血清火降痰爲本癎者多因火盛胃熱治宜下之不可飽食熱助胃火又經云陰陽偏勝則狂陽陷陰則癲脫陰者目盲脫陽者

見鬼有見此義治者宜致意焉

一經治癲狂不止得之憂愁極者　甜瓜蒂半升爲末每服一匕井水調一盞服之吐後膠熬白合爲起神效

一經治癲狂失心憂痰血結聚心竅所致　乾薑金丹七白礬三兩爲末糊丸梧子大每服五十丸白滾湯送下經中所述甚致

一經治邪狂癲病不眠妄行不止　白雄鷄二隻猪熬用蔓菁熬調和作羹至妙

一經治五癲五癎　黃丹白礬各一兩用磚一塊鑿一堀可容二

味置丹在下勞在上用炭五斤煨令炭尽取為末以豬心血
不犯水者調丸綠豆大每服三十丸漆皮去白煎湯送下食
一經治心羔狂惑　無灰酒一碗真麻油四兩火上煮之以竭
為二十條每條擘下一二遍候油酒和勻為如膏煎八分灌
入口中使熏臍或吐或無覺來即醒
一經治天行熱狂　芭蕉根搗取自然汁飲之乃瘥
一治狂乱不識人　伏龍肝為末每服一二匙水調下日三服愈
一經治頭狂或中熱喉咽塞語令人奪魄　蚯蚓糞研烟井

水調服即安　一傳治狂言乱語嗟嘆一夕燒為末酒調服自解

一經治病笑不休　鹽炒紅為末用河水煎沸服之以鳥毛探喉中取吐得熱痰效不逐愈

癇症

夫癇症者發則倒仆涎沫亂無知噤舌吐沫皆反眷強張目上視手足搐搦或作六畜之声者是也蓋癇疾之条或因受大驚神気不安或在胎之汀母受驚惶雖已生来亦帯此疾也因癇症有五等之分有虚実之論凡癇疾一月数発者為実症

易治週年一発者為虚症難治医宜者攻之虚者補之在
平通変尔

一経治驚癇方　石昌蒲（二男去毛）神砂（火ル）研末水飛過半分八葉
半分為衣二味細末猪心血打糊糊丸梧子大神砂為衣毎
服七八十丸空心白湯送下乃愈

又傳方　酸漿草洗浄搗爛絞取自然汁毎服半碗日一服取效

又傳方　猪頸膆水洒相半煮熟食之初病二年食三膆二年
食六膆計毎年三膆神效

又傳方　鸛鵲巢精選一合焙乾爲末每服一匙空心酒下大驗

健忘

夫健忘者卒然而忘其事行于始忽忘于終言于前忽忘于後也蓋由思慮太過勞傷于心心傷則血耗神不守舍傷于脾則胃氣衰憊而慮愈深故斷病之所爲皆在心脾二臟也治者宜安神養血室慮冷煩則保無差矣

一經治心神不定火不降水不升健忘多惕　名島蒲七月七日取根忌炊器用木槌打破米泔浸晒乾爲末每服一匙酒

調下久服聰明益智

一經治心膏多忘　牛馬豬鷄心各等分切片乾晒為末每服一小匙調下日三次則聞一知十

一經治健忘此方能鎮心安神開達心竅　山棗去皮晒乾為末每服四五小匙空心白粥調下大妙

一經治心虛健忘令耳目聰明方　桃枝東向者於戊子日截取二寸槐之神效　一方於端午日太早取東向桃枝長三寸刮作人形入頂帶中帆之並妙　一方用鼈甲一片蓍水

帶中一方取硃珠網收作一丸著衣領中勿使知之大妙
一經治健忘補中益氣長心志聰耳目蓮子去壳心爲末每
早用白粥濃取汁一碗入蓮子末二匙再煮一二沸食之服
愈功效愈大

驚悸

夫驚者忽然驚動似人捕捉戰慄而不安也驚者驚怖也悸者
怔忡也蓋人之所主在心心之所养在血心血既虛神氣不
守遂成此病也大凡健忘驚悸怔忡之症名異而病同故治

者瘦人少血心君惰弱宜補血以充之肥人多痰心君壅蔽宜去痰以清之誠總論也

一治驚心下悸病　麻黃去半下姜製半分為末煉蜜丸綠豆大每服三丸白湯下日三服神效

一經治忽過夢悸卒死漫酒灌之即醒

一經治痰盛迷心作夢悸者　甜水煮炒赤小豆各一升共為末每服一小匙豉一合煎湯調下以吐惡痰必愈或冬瘵凝而又吐者飲冷水即止

一經治肝受火邪合人參停　煎湯調養神安

一經治驚悸神方　柏子仁炒過酸棗仁炒過香附米各等分

同為末每服二錢用麥門去心煎湯空心調下久久大益

虛煩

夫虛煩者心胸煩擾不寧也蓋因調養失宜榮衛不和使氣血有所偏勝或陽虛而外寒陰虛而內熱或陽盛而外熱陰盛而內寒大率虛煩所生總是一般熱論故人之損弱則水虛

獨而失業燥上焦遂成斯疾矣治者推此而投机壽

一經治肾氣煩熱　青蒿一握　猪胆一枚　取汁　杏仁四十个　去皮尖　用童便

一味煎至半空心服最神效

一經治虛熱作渴　桃膠一丸　如彈子大　含之每日一丸絶妙

一經治大病後表裡俱虛津液枯竭煩渴心燥及諸虛損煩熱

與傷寒相似但身不疼痛不惡寒可用汗下　淡竹葉麥門

冬等分水煎常服即安

一經治虛煩内熱懊憹不眠　竹瀝一碗　人白蓉末一兩　同煎

至半空心服便已

一经治大热心烦 槐子炒焦为末每服二钱米饮调下大效

又经方 豆豉一合 赤小豆半合 支子去壳七枚 水煎温服效

又经方 甘蔗攘取汁一盅 入糯米煮粥空心常服大验

不寐

夫不寐者有三因焉有病后虚弱及高年老人阳衰而不寐者有痰在胆经神不守舍而不寐者又有心经烦热胆经寒冷而不寐者其法虚则补之热则清之痰则导之乃端的也

一经治膽虛驚卧不安心多惕者　酸棗仁一兩炒令香熟
散末每服二㕮不拘夜竹葉煎湯調下則驚
一经治夜不合眼雞驚者　灯心煎湯飲代茶飲即得驚
一经治陰氣滿不得入于陰陰氣虛故目不得眠宜此方
半下五合用長流水八升揭之過通濾取清五升以蒂薪煎
大棗八枚米一升用半下煎至一升半每服一盞日三服以愈為度
一经治晝夜直視不眠　黑豆煮乘熱抱之冷即易終夜五更
以又新布火炙熨目上自安眠也

一經治虛勞不寐，鼈甲為末，溫湯送下三錢，取微汗妙。

一經治人每至夜則目澁好睡，鼠目一枚，燒存性為末，水調，正日中即食。

一傳治人多眠昏迷不醒，馬頭骨燒炭為末，每服二錢，酒調下，日三度，如不能酒以溫湯任之。

又經方，酸棗仁生搗末，每服二錢，姜茶湯調下，效神。

孔子大聖枕中湯，常服令人聰明，出傷寒不寐門，見中藏服遠志菖蒲等分為末，酒服日三服。

厥症

夫厥症者手足皆冷也蓋气属阳阳虚则阴凑之故发厥其血属阴阴血虚则阳凑之故发热此阴阳二症相对凡厥之为病与中风相似但先则身温厥则身冷宜按方治之

一经治脱阳虚症四肢厥冷不省人事或小腹紧痛冷汗气喘

盐炒热熨脐下取暖即苏

一经治阴症虚寒极冷厥逆频燥腹痛脉无气甚

硫黄三钱

为末艾煎汤调下就时汗出而愈

痼冷

夫痼冷者獨寒之謂蓋人之氣稟不同或稟于热或稟于寒其痼冷之症無異舉火之症相对故痼冷之為病由真陽虛弱所致或坐卧于風霜寒湿之氣外侵或飲食生冷寒水之味內積以致臟腑傷惑而成斯症也有手足厥冷有腹中久痛痢泄無度有腰腿重痛如坐水中有陰痿不舉冷精自泄有久嘔逆腹脹飲食不進有汗戰慄者治者宜從類而療之

一经治陰症舉腹痛身冷　硫黃四分　胡椒二分　細末每服二

分燒酒送下便愈

一經治陰症小便玉莖縮入腹中　母鷄肥一隻刀破背上開手開出連毛帶腹覆在腹脇上令人以鄉證住鷄上須臾熱透小便即出而斬

又經方　胡椒姜乾各二為末嗽津液調塗手心及塗綿紙阴處上側卧立效

一經治陰症秘方硫黄入磁器火上化開傾入井水内取水為末餘為丸桐子大每服一丸溫酒送下亦應

又经方　黑豆不拘多少，锅内炒熟，乘热以好酒淬之，急以器盖勿令泄气，待温以酒饮之大效。

又经方　芥子七分，乾姜三分，细末调作饼，贴脐上，手帕缚之，上加此盐，以铜斗入火炭熨之，数次汗出为度，又将病人玉茎牵引于上，或玉茎头至小处用艾灸七壮，神效。

一傅方下焦冷气　陈皮一斤，汤泡炒过为末，煞蒜九捣子大，每服三十丸，空心温酒送下。

一傅治一切冷气脾痛，或鬼邪毒气　乾姜为末，用生艾绞取

汁和丸梧子大每服十丸漸加至三十丸病愈即止

一傳治陰症腹痛面青色者　鴿鳥糞一丈令炒黃為末投入酒榲勻待澄澈去滓空心飲之

一經治臟冷腹痛服此方能溫和胃氣　香附末為末每服二匙用生姜十片搥碎同煎湯調下

一經治一切冷氣　紫蘇子高良姜陳皮等分為末醋丸梧子大每服二十丸空心酒送下立妙

發熱

夫發熱者蓋又然發於皮膚之間就是熱也其症與潮熱寒熱不同潮熱者有定而熱有定而止信不差也寒熱者寒止而熱繼也凡發熱者甚熱無定然病有四候傷邪有四處煩勞故分外感內傷之殊寔熱虛熱之別若心上不解而医之投一治之則医之死人也非命之死人也

一經治發熱口乾小便赤澁甘藁多食之尤佳

一經治勞熱皂角刺置相續度取滿天者以酥一兩釜炙酥

冬為度為末煉蜜丸梧子大每服十五丸漸增二十丸白湯下重者不過二劑愈

一經治急勞煩熱体疲　皂荚子皂角刺白皮皂荚刺等分燒為末以水淋汁去汁面淋如此三五次煎之候少凝入麝香少許以童便浸之取皂角炭用煮餅搗丸小豆大每服七丸空心温湯送下甚效

一經治筋虛骨煞勞熱　青蒿連翹葉花子洗淨搗絹入大椀中用長流水煮通米去滓面入小椀浸火熬成膏每服米壹

空心童便一碗和匀服此为大補劳傷能不冬速

又经方　童便七歲以下三碗煎至一碗蜂蜜一盃調下空心服之輕者二十日重者五十日乃安

如服做二旬後有虫自身中出或十步之遠聞病人大便大臭者乃愈

又经方梔子仁炒半焦者為末每服二刂空心用生姜六七片水煎服湯調下效驗

一经治熱病後餘毒攻手足疼痛欲斷糯稻穰燒灰水煖浸之即安

消渴

夫消渴者，上則思飲，下則放溺，日夜無度也。蓋由任情縱慾，飲酒過度，膽受嗜炙，或服丹石，遂使腎水枯竭，心火燔熾，三焦燋燥，五臟乾燥，自是而渴，初生焉。然其病有三，焦之別上焦者，肺也，多飲少食，大小便如常，此心火燥于肺金而生渴也。中焦者，胃也，多飲食而小便黃赤，此胃土血熱則消食善飢，血中伏火，則津液枯燥而生渴也。下焦者，腎也，小便淋濁如膏，煩渴引飲，耳輪乾黑，小便頻數，能食者，必發癰疽，常飲

不能食者必傷中滿腹脹須分症采方治之

一經治百合病渴　天花粉　牡蠣等分為末每服一錢湯調下

一經治三焦渴病　糯米炒去白花桑根白皮等分每用一兩水二碗煎飲神效一方淘取糯米泔任飲病愈即止

又經方　傷寒渴無度飲之極有神效如無傷寒以蘆根煎湯代之亦可

又經方　雄鷄脫毛渴置澄清服之大驗

一經治消渴飲水日至一石者　浮萍晒乾天花粉等分為末

用人乳汁和丸梧子大每服二十丸空心米飲送下三年病者三日愈

又经方　学薛洗净绞取自然汁服之以愈為度

又经方　薏苡仁為末用粳米煮粥食之乃已

又经方　枝要剉半两烏枚一个水三盏煎至一盏温服乃止一经方　韮菜每用三五两或煮或作羹入鹽入醬亦可食之至十斤愈止　又经方　豆豉水煎任服一方豆豉一合烏枚七个水煎服日三次效

又经方　冬瓜一枚，削使埋湿地中一日取出，破开取心，清水日饮之，或烧煮，后取汁饮之，乃尽。

又经方　黑豆为末，入牛胆中阴乾，百日，每朝服一九，吞尽，即已。

又经方　绿豆猪汁，煮作粥食，自瘥。

又经方　葛勒老者三根，洗净，切片，晒乾为末，每服二刂，用猪肉水猪为汤送下，日三服，或生者捣取汁，或煮粥食之，亦效。

又经方　生姜晒乾为末，以鲫鱼胆汁和丸梧子大，每服七九，未饮送下，过意饮之，或入末少许尤妙，勿用盐。

又经方 蔷薇根洗切每用一把水煎空心服取效

又经方 鱼沙蛤乾为末每服二钱冷水调下不过数服见效

又经方 鲫鱼一尾去肠以茶叶纳满腹中湿纸厚包煨熟食之不过三四次即愈

又经方 田螺五合洗净水一盂煮熟食之每日一易新螺一法用糯米二合猪稀粥一碗取田螺五合洗净放盒中待螺食尽粥吐涎出收取凝做之立效

又经方 雄猪肚一具豆豉一升水煮以汁饮其肚食之效

一傳治大人小兒熱渴久不愈　吉根不拘多少煎水常服

又傳方　生藕搗汁一盞調蜜一盞服日三次甚妙

又經方　人乳汁入蜜相半煎沸空心常服多日並善和服見治使利下即好

一經治消渴飲水常節頻熱　芭蕉根搗絞取汁煎服二合效

又經方　烏梅肉二兩微炒為末每服二小匙二硫煎至一硫去滓入麝香二百粒再煎至半硫空心溫服取效

一經治消渴方服之則水從小便出　蒙求子蕊子並炒名

三两為末每服二钱用梨白皮煎湯調下日三次愈

一经治腎虛消燥难治者　黑豆炒去皮粉各等分為末糊丸梧子大每服七十丸黑豆煎湯送下日二次至善

一经治消渴愈後可防發癰疽預先服此　金銀花或根莖葉亦可不拘多少入瓶内以無灰酒浸用糠火煨一宿取出晒乾八廿章少許為末以前浸酒打糊為丸梧子大每服五十丸漸至百丸淡酒任下此方不但禦癰疽亦大能止渴也

五疸

夫五疸者曰黃汗曰黃疸曰濁疸曰穀疸曰女勞疸大要是黃病也緣於脾傷濕熱脾本屬土色黃故其為病通身皆黃四肢痲煩飲食日減小便赤澁者是此病不疼不痛宛若水狀無聲無銷多致殺人蓋脾胃臟腑之母母傷而子能安乎治宜分位上下濕在上可汗濕在下可利小便使二法分消而病愈矣

一經治黃疸初起　赤枝水煎濃每半斤服之神效

一经治遍身面目皆如黄纸 茵陈一把 麦子式十四粒 枚水二
煎至半去滓用石燕一块 火煅赤投入汤药中温服重衣
覆取汗出为度 又用粉敷遍身

又经方 麦子去壳 只是去根炒 每服一升 医救五人 水二升
煎讫温服 大妙 一方加吉根三升 炙草五分

又经方 麦蘗子炒为末 每服一大匙 饮调下 日三次服 甚妙

一傳治諸瘡疥 使效 便血通用 麦半盏 生姜五片 新汲水一盏
同煎 日二服 小便渐清而瘡自除

一傳治遍諸黃瘟症　蝴蝶根洗淨切片三錢水煎至半空心大服

又傳方　田螺水浸去泥煮肉常食并飲汁又用螺殼燒灰為末每服二錢用火酒調下效

又經方　葶藶子炒微焦為末黃昏掌心舌尖黃苓名者各

作剪水煎服神效一方有甘草只是無黃苓

又傳方　鵝子一枚連殼燒為末醋一合和勻溫服見皋中出虫為效如身体黃極者不過三次服神效

一方鵝子混入陳米煮粥每早服一枚久見大效

又经方　大蝦蟆一个、黑豨小雄猪肚一个、入二味于肉烟熏去
蝦取猪肚含之大效或无黑豨亦可
一经治湿热黄疸如金　桃根於清早勾使婦人窃犬見乃拔
取桑枝根老筋大一握剉细水一大体煎至半空心服之後三
五日其黄離又如雲百日方愈冬虫如黄去後可食又飲清
酒一盞則服中易散否則散迟忌食热鹅猪魚等物神方
又经方　葡蓄洗净生捣绞取汁一升服多年者二服愈
又经方　灯草四两水酒各半入鍋内煮半日露一宿服效

又经方　生姜捣烂，衣又遍身擦之，其黄自退，一方加茵陈同
滤捣甚效　又经方　葱茎根水煎服，一方捣取汁和酒服，甚效
又经方　胡荽带土香各四十九个，焙为末，每用一字吹
入鼻中，取出黄水，亦可擦牙，追出即
又经方　车前子调井花水服三五日乃瘥
一方　车前子炒，通为末，米饮调下，并好
又经方　茵陈支子各一分，水通草根一两，作剂水煎服，甚效
一经治食积黄疸　绿矾建子一枚，烧存性为末，每用二钱，因

多食黏得病者以黏湯下因多飲酒得病者以湿酒湯下連
進数服即愈

一經治酒黄如金好眠吐涎　茵陳白蘚皮各等水二煙煎日二服
一經治諸瘡汗出如黄栢汁者　猪膏一斤火煎化去滓每日
三服取利下燥糞乃止神效

一經治黄疸喘滿小便自利不可除熱　半下製半姜各半斤
水七升煮至一升半分兩服有人氣結而死心下猶温以此少
許入口即活

一傳治病後黃疸肚腹脹大小便不通　蓝根搗爛以酒豬八塩混勻塗臍中愈

一經治黑疸危疾　天花粉一斤搗汁六合頓服過有黃水從小便出未出再服

一經治黃疸困篤　雄鷄大者用刀破背上連毛帶血乘熱合在病人胸上冷則易之日易三四鷄即被去積毒自愈其鷄埋棄勿令人食大害

一經治酒疸黃色遍身者　萱草根搗絞取汁服大妙

又经方　茵陈四根、支子七枚、大田螺一个、连壳煨捣、用百沸汤调白酒一大盏饮之效

又经方　茵陈一两、好酒一钟半、煎至八分、食远温服、亦效、服而愈

又经方　未详、子醋磨服一二盏、下利则效

新刊南桑神效十科应治卷五完

廉陵孝子赖玉瑾奉写