卷捌



新刊南豪神效十科應治卷八

婦人科

調經

夫婦人者乃陰之象也上屬乎月故月一月而一盈勿婦人之經行亦配於是蓋女子十四則月水行男子十六而陽精至此方合子陰陽之效是以男子之精氣宜藏女子之月水宜泄則百病無染而女子自超矣當飲食乖宜即百病由此而作大底內外百感初病痛悉

男子治同惟胎前產後七癥八瘕崩漏帶下之症始分異耳係經行

之行愈甚每日同一发其证为病不浅经者经络也行者血行也或过期而行者血寒也未期而先行者血热也经行作痛者气滞也来极后也其色紫者为风黑者多热淡者多寒痛拒按者血实也治宜辨虚实寒热而投方每日提早一刻免之误也

一傅治扫帚人经脉不调或上攻头目胀晕呕吐或上攻胸胁满闷刺痛或场中结魂一切诸气香附米三ソ陈皮紫苏乌药各一ソ乾姜三分水煎温服

一经治月水不调腹痛难产红花苏木牡仁去皮牛膝三ソ五灰泽兰姜黄炒各等分水酒各半煎效再温服

又傳方紫卿紅花逢木桂枝去粗皮香附末醋炒各等分同為末每服一刀酒調下不拘衣

一傳治月水不調或未行或當行腹痛疼痛雖以成胎紅花末木香烏炒肉桂逢木醋炒等分水煎空心服

一經治經行久而不止白帶赤附炒一錢艾葉各一刀半水煎服立止

一經治婦人血氣逢走作痛逢我乾勝二月為末酒服一刀卽效

一經治女人作病或赤白帶下及經候不調腹痛烏附末一分為四分每分酒送

一方醋浸一分童便浸一分鹽水浸各三日夏一日秋五日冬七日取出水淘淨晒乾炒過搗細為末醋煮糊丸梧子大每服六七十丸酒送下其切最勝瘦人多

熬加文等炒二月木通一月
一经治小腹疼痛及经月初来便觉腹切
痛逆肾同共雖及砂劑不可思之者無一医得效逆候
為末每服二少好醋二盞調勻平旦空心服之每旦一服
逆候桑二月半加犹仁一百粒去皮尖炒為末以宗煉丸梧子大每旦空腹以水飲或
酒送下每服三十丸日再服以愈為度忌葱菜
一治婦人熱病四肢煩疼胸膈有痰丸系附炒过三分為末燒过一分共為
末水一盞酒醋各半盞打糊為丸梧子大每服七八丸空腹酒送下兼病小而
無水煮下外感無汗姜水煎下火病百神湯下痰病波羅湯下痰多

每當湯下咳嗽痰白及湯下服漏陳皮湯下

一傳治婦人經行不調或當行先先秋腹痛堆以成胎當貝根二桂水二鍾煎

至半先期服即效

又傳治淫漏淫漏常服即愈　又傳方柳樹皮去粗取內二月好嫩一觔浸之如至行經

期先日空心服之如服二三盞至經冬即愈　又傳治痛斯青至同婦常食甚良

又傳方蒲黃炒黑華水盞水半炒乾各等分為末糊丸梧大五七服二十丸空心酒飲

下或米飲亦可　一傳治月水不調血氣作痛下血無期華水盞炒蒲黃炒

等分為末煉蜜丸梧子大每服二三十丸空心酒送下妙

又傳方姜水良姜等分並炒為末每服二匙調下不拘

一經治婦人每服恶露行服痛甚寒壯熱面赤支子去殼取仁一合用生姜搥碎汁

拌炒黑水一碗煎至半分一服立愈

一傳治多經將服中作痛者木香

水調各半錢前服愈

一經治婦人血氣刺痛蒼朮炒薑炒存性半兩魚附米

炒一兩共為末每服二匙鹽湯或米飲調下即愈

又傳方蒼朮米漿浸根葉一把搥爛

絞取汁一盞調酒一盞服之效

一傳治婦人血氣不調氣刺痛香附

炒蓬蘇搥過毛及刃 蒼朮揉炒黑半兩同為末每服三匙用米湯入鹽少

許洞下甚效

一婦人生男老者子竹刀切臍帶為末每服二匙溫酒調下神效

經閉

經閉者經云期而不行或少行而又止以致心腹結痛或吐積聚是也蓋由血經乖度經中多病有人固大抵經在虛疾故變人常少血之虛則經絡枯竭不盈科不行肥人常多痰之聚則經絡壅遏而不得宣通也九法虛者補之水氣則流壅者開之經通則行切物以寒補虛以虛故寒致損人命可不慎焉

一經治婦人血虛不調上沖心腹寒為乾血為病未有不死此為末每服二匙空心酒調下效甚

一经治经闭不行甚至一年腰腹疼痛脐腹重坠热往来者参芎二刀为末每服二钱煮热酒下效

一经治妇人经候不调久闭不通蚕沙炒黄为末每服二钱酒调下

又傅方白帝丸效莫为末每服二钱米饮调下日三次如乏有兔甲炙炒

又经方煮茶水煎一瓶入沙糖少许露一宿服半种通雌成胎三月服之亦堕不可轻视

又经方蠹虫根一刀水煎服之不过三服效

又经方厚朴三刀姜汁炙切片水三升煎至一升分三次空心服不过三四剂效

北仁红花各一刀炒效

又经方杀虫乾者一枚为末用白鸡血调作饼晒乾为末每服二刀匙空心酒送下或先服四物汤前服此名先救

一经治室女经闭雄鼠粪烧末者一男妙真为末每空心服酒送下二刀匙

又经方治疟藤使君子各半两去壳六个为末每服二刀酒调下即通

一经治妇人体实经闭腹结癥瘕鳥鼠一枚炮烟煎汁服整成骨与服一起空心酒调下如下

一经治妇人癥瘕种恍惚腰胸胁背痛引阴中小便难如食美状似有子者雄鼠大者一个以好绢裹之用炭火色为标把一个以置鼠于下以柴柴烧

干上一日夜取末吉土翁入桂心六铢同为末每服一刀圭酒调下不过二服当自下也
一经治妇人经闭久结瘕瘀血疼痛义(宜)末炮乾为末水酒调服大妙
又得方童便常服日三四次久必使下恶物而愈
又传方香附炒去毛末姜黄炒牡蛎黑豆炒各等分为末每服二刀圭霜前下空心调下
又得方乾胶烧灰(存性)为末每服一刀酒调下乃愈 一方乾胶烧灰更入麝末各二月香附末四两为稍调丸梧子大每服五十丸空心酒汤下
又得方鲮鲤舌炙焦红以酒二盏浮入三次以酒吹之愈愈

崩漏

崩漏者經期下而血淋漓久而不斷也蓋由勞血氣沖任之脉虛損遂成此症之內又多為陰陽兩絡亡掃人五十以後經止數年忽經又行腹痛身熱口渴者陰症也曰崩者三四十經行頓暴不止者陽症也曰漏治者宜審症方可一併治崩中去血過多因絕脏暈不省血附米速宜槐花各等色並炒人髮燒灰存性各半錢前服息餘　又經方炙葉燒為末每服二錢酒調下立止　一經治血崩及下血五色漏帶並宜半服治血調氣治婦人之仙方也當附米炒黑為末熱酒調服二錢立愈有孕者加三錢安胎湯下一方加代赭名火燒赤淬醋中等分

一经方治崩中漏下五色今人多子蜂房烧存性为末每一刀圭温酒调下
服之大有神效　一经治血崩不止不问冷热一条治蜂房荆芥穗各等
分同烧存性为末每服二刀圭米饮调下三服见效
又经方蜂房烧存性香附米炒黑为末等分为末吉根前汤调下
逐止　一经治崩中有血不问新久拙木耳烧存性为末每服二刀温酒调下
即愈　一经治风热血崩荆芥穗灯火上烧灰为末每服三刀童便调下
即愈　一经治崩血不止白鼠粪花烧乾为末每服二刀用米炒黄人盐少许
水煎汤空心调下自愈　又经方经验老者一枚炙焦为末每

末每服二刂空心酒或鹽湯調下乃止

又经末再二男炒見烟乱髮燒灰三分同研末每服二刂空心好酒調下乃止　又经方秤腫燒紅淬酒中九次飲酒飲見效

又经方烏梅肉七个燒存性為末每服二刂空心米飲下

又经方梅葉焙探皮燒灰等分亚為末每服二刂酒調下乃止

又经方捉猴燒存性為末每服二刂酒調下日三次即愈

又经方豬肉四两豬熟白皁霜二男篩过好肉食乃止

又傳方牛角腮燒全性為賊骨各等分共為末入射香少許每服

一刀圭空心酒下一日三服自安

又经方黄累切水酒煎服之亦止　又傳方鹿角燒灰為末每服二刀圭空心酒調下如无鹿角用黄牛角腮尖頭燒灰為末米飲調下乃愈

又傳方兵柳燒存性為末每服二刀酒調下立効

又傳方蚕沙為末每服三刀酒調下即止一云如伏龜胛

又经方猪蚕用母者燒為末每服三刀酒調下乃止　一经治婦人漏血乳

又經方鹿茸炒黑髮洗淨燒灰為末二刀空心溫酒調下神效

為末或加面草霜或加荆芥穗或加橘皮燒灰並好每服二鈸食前温

酒調下甚妙　又经方　楮樹刺白皮刷各等分水煎服切效不可
尽述　又经方荷葉燒為末五ノ蒲黄黄芩各一分為末每服三ノ
空心酒調下甚妙　又经方燕支一團如鷄子大乾姜二ノ水一斗煎至半
乃以黄明膠五ノ炒过傾葉玉妆膠入溶化分三服一日服尽神效
又经方砂仁炒先焙為末米飲調下一二ノ大效
又经方蓋智仁炒為末用米飲煎鹽少許服一ノ效
又傳方赤童男葉楊烟調水一碗後取汁服效一方加麥門志白新女
各等分水煎服　又傳方桃綿藤用葉洗淨絞取白汁半碗服之

以洋參頭煎上狀不可言

一經治月水不斷（幽）容多（或）黃變血竭暫止日又發勞

劑又發先治及崩中漏下桑木焙乾為末每服二刂食前熱酒調下日

二次效　又經方烏龍尾炒性候烟冬為度副芩穗等分同末為每服二刂

茶湯送下乃止　又經方側柏葉炒白芍等分每用三刂水酒各半煎服至

室女側面黃木賊炒吃食各等分為末每服二刂米飲極妙

又經方連翹陳久者性燒存性為末每服二刂酒調下乃止一方加芙蓉花陰

乾木等分米飲調下即止　又傷方木賊炒三刂水盞一煎至七合溫

服日一服效　又經方釣藤微炒每用三刂水一碗煎服逐息

一痛治崩漏及月水过多山栀每用一分酒煎下效

一经治月水太过缠豕子或豕子去壳取仁为末以绵包椎打烂去油水调服

每服二三分食

带下

夫妇人未自主宰与男子遗精白浊相对皆由寒有热湿兼又喜怒思虑

产育房劳及经行未尽而遇交接使沈寒湿入胸胁枝流末梢物象白或

黄青黑五色或多或少以面色如垂腰腿疼痛饮食减少精神短三

皆带下久而致此凡治者不可用热药盖助其火亦不可用寒药折败

中気大要以温補榮衛血気壮盛則其病自安

一経治婦人赤白帯下年久不痊何首烏為君臣用炒刀剉去粗皮以雄打破米泔浸一宿晒乾為末每服二銭空心酒調下久服延年

又傳方椰子売焼存性為末每用二銭用鶏子一枚打開一竅如白帯去白心赤帯去赤心入椰売末于内以湿紙重包煨熟空心食之三次即愈

一経治赤白帯下年久諸薬不效者貫衆全用一个刀斫外皮用好醋湿紙包煨慢火炙香為末每服二銭空心米飲送下甚效

一経治赤白帯下不備新久並治炙甪焼灰存性為末空心将酒調下若火

女加乱髮烧灰存性等分為末每服一ソ冷水調下效

又經方槐枝烧灰為末每服一ソ食前酒調下效　又經方猪膏三合酒五合煎沸待温分服大效　又經方鶏子清頂一孔入硫磺末二分湿紙包煨火煨食之酒調下乃止

又傳方牡蠣火煅盆母根烧存性等分烧存性香附米各等分乾姜烧存性半分共為末每服二ソ温酒調下

又傳方柒蝶酒浸炒乾為末每服二ソ生姜煎湯調下

又經方服凝草陰乾為末每服二ソ酒調下經驗

又經方白扁豆炒為末每豆子同乾猫乾為末每服二ソ米飲調下甚良

又傳方大皮藤蓮

炒黑香附末各等分共为末每服二钱用茅根煎汤调下或米饮调下亦
又经方焉黄芪取汁二合和鸡子清二枚煎之待温顿服不过三次即愈
又经方桑木耳切碎酒煎服取胜　又傳方牛角腮烧灰以烟尽为度
香附米盐水浸炒乾再浸再炒如此七次各等分为末每服二钱空心米
饮调下　又傳方代赭石火烧红淬醋研龙骨煅烧黑香附米各二月
共为末每服二钱空心米饮调下
又傳方黄鳝大者一个截取三寸烧灰加胡椒十五粒共为末调酒饮不
过三次尤效　又经方白鳝一条不拘多少米泔洗去手足炒为末如兵

殭蚕用殭沙炒為末每用二分酒調下大效

又经方蓋母草帶花晒乾為末每服二分空心温湯飲效

又傳方苧根堋煤根各一把洗淨水煎空心服　一经治赤白帶下经水不来牡蠣煅粉白礬等分童便浸晒乾為末每服二分温湯調下用蛇茶子粉白礬等分為末醋糊丸彈子大綿裹納阴中良久抽用換日一次即愈

一傳方婦人白帶多用七情内傷或下元虚冷砂致龍眼根皮去黑皮每用一把水煎濃空心服四五早愈

一傳治帶下神方淡竹葉車前子各二分生姜猛取一盞水一碗火煎半

同煎空心服二早即愈　又傳方附子一枚炮去皮臍切八片甘草一兩炙去皮切
心服大妙　又經方槐花炒牡蠣火煅等分為末每服三ㇷ酒調下效
一傳治婦人白帶下辛夷葉木雞葉等分水煎空心服
又傳治治痔虫蝕肛者燒存性為末每服二ㇷ空心臺便任下至
愈為期　又傳方蝟皮燒灰洗淨猪胰二條水二鍾煎至一鍾空心服三
次愈　一經治女子白帶下冬瓜仁陳久者佳炒為末每服五ㇷ空
心米飲神效　一經治白濁滑数虛冷者鹿角鰓出炒黃為末每服二ㇷ
酒調下自愈　又傳方鷄子去壳五男燒存性綿子二男炒黑烟尽

為度共為末酒調糊丸梧子大每服二十丸空心米飲送下綿子五月取者佳

虛勞

虛勞者男子先起於傷精女子先起於經閉皆能生死症矣蓋掃人以血肚氣衰為本心生血肝藏血血衰而氣血虛者由七情六淫所傷鬱結在心傷則血逆渴而月水先閉其諸臟俱受而病生焉或精神勞倦飲食不思皮拈鬢焦肢体煩疼甚至羸瘦潮熱者傷于烟不足陽往乘之水不能勝火以致火炎水涸者治宜養陰血為本惟回以益通為力

一傳治掃人除熱則成勞熱肌瘦食減經候不調雄

猪肚每用一个甘草一本去皮截取通草捣破同猪肚空心食之不过五六个大益

一经治妇人寒热痿软经月不调形容瘦者仍妻仁青黛各一分香附童便浸洒为末密绸每用一分食后下至愈

一傅治妇人头痛目眩打槿花茶末等分为末每服二钱水煎取一盏服以瘥为度

一经治妇人黄疸因经月不调触犯房事以致形容黄瘦劳倦等症白矾五分陈皮二分同为末艾叶五分火上滚化调前二味为丸梧子大每服五十丸用四物汤下

胎養

阴阳交而万物生精血搏而胎孕成门自然之理也盖天地有太初太始
混沌一判晓晃气象故曰太初无形矣故曰太始气形具而万物彰矣大凡妊娠
之始与树初结子一般要在安静温和刻可成其实若寒暑风雷骤动则不免凋零
惟人生而为人得天地之正气聚缊之机智出百出之灵感故其生其育高与物多
异是以来历仲师以断遏为主重以断长为最阐有祖宗方有子孙有子方有祖
宗允断长者宜详加细理不可疏视也

妊娠宜忌

凡妊娠初始以后意宜喜乐而忘忧思身宜运动而忘疲逸心宜和平而忘情慾

居室清深而忌燥热食宜温煖而忌冷寒衣宜適体而忌冷濕热帶宜常起而忌久坐体宜頻動而忌久卧足宜数步而忌久行膀宜勉强而忌久倚寢宜定時而忌倒卧出宜端正而忌偏倚坐宜平重而忌委躲言宜忠良而忌佞諂視宜多當而忌壅滞咽宜善事而忌邪声運時令而生子賢良過於人也

食雞鴨禁忌

受胎之後切忌牛羊物非独有激動胎氣之或然於物理亦有厭忌投或不能成忌非特妊月難產亦能令兒破形損母可不戒哉　食鶏肉令糖米令子多虫食羊肝子生疳疾　食魚鱉蛤及鶏卵子成痼病多瘡

食犬肉令子無声　食兔肉令子缺唇　食鰲令子項短及模胎

食鴨卵及桑椹令子倒生心寒　食螃蟹子横生　食雀肉及豆漿子面生黑黡　食豆腐水漿令霍乱墮胎絶產　食雀肉令子多淫不孝

食山羊肉子多病　食生姜令子多指生瘡　食燉蒸鼈魚令瘡癰

食騾馬騾肉延月難產

菜味禁忌

這般菜味是胎神　他掃狂胎不可逢　蚯蚓水蛭并地胆

鳥啄附子與天雄　鄉獨野葛婁姑須　鳥啄附子皮蠹出

牛蒡冰根并巴豆　大戟蛇蜕及蜈蚣　牛膝葉并煮飲

金石鱉老及雌雄　牙硝芒硝壯丹桂　蜥蜴粉生及蠹虫

伐(代)捕蚱蜢粉射

桃仁硝黃黃芩根　槐根硼砂及乾漆　亭長、浪流菌草中

罌粟荷葉連鬚用　蹋皮、赤箭赤頭紅　馬刀石蚕衣魚等

半夏南星通草尚　姜桂小蒜及鷄子　駒肉鬼肉不須供

十月之中宜切忌　此歌須記在心胸

一治婦人胎始覺轉女成男蚕沙每用一粒井花水送下日二次服
一經傳易產方帝乙王用一塊吃胎至八月將入小囊佩之至產
辰取落未一月以酒送下大妙

胎動

胎生者婦人之大事故飲食合法居處得宜則子順母安而生育之道全焉為調養失當嗜欲乖張則母病子傷母傷子死逆生諸病而生育之道難哉姑列逐方注宜應治

一傳治安胎寬氣進食瘦胎易產設或居處失宜卒然朴倒

漏血腹痛並有奇功香附山茶各三錢砂仁一錢紫苏甘草只壳各五分共為末每服二錢熱湯調下

一治胎孩忽然心腹疼痛不可忍者鹽一撮炒赤急投入酒一杯熱服立安　又方香附末炒為末每服二錢以紫苏砂仁煎濃湯調下　又方甘蔗去皮量胎每一月用一節切片水煎常飲母子俱安

一傳治胎氣不順或誤食熱物毒物冲動胎心不得呼息煩悶反要飲死者天竺黃艾葉蟹爪各三錢鯉魚燒存性二錢寄生

壯驅燒黃明膠一兩為末每九梧子大每服二十九苧根煎湯下如已葉口用流水煮濃幹開口灌下

一傳治胎動腹痛苦劇竟眼業用束向枚一把水三碗煎至一碗服立安

又方童小便每服一碗日二次大妙

又方鵪子一枚調酒服立應

又經方豬胆汁一方入小竹管引入咽中灌下母子全安

又經方鯉魚一尾去鱗腸首尾切細黃明膠用炒黃鵪米二合水一昧同煮爛面入姜葱橘皮鹽令中適用豬五六片空心任食四五日甚善

又方黃明膠炒杞菜寄生等分芝葉五片水一昧

煎至半温服即安

一经治妊娠腹腰甚痛手不敢近及堕胎作痛鲤鱼一尾重二斤以上者粳米一斤调盐酱煮食大妙可一月食三次最能护胎

一方鲤鱼豆豉葱白同粳米煮粥调姜盐常食大好

一经治妊娠腹痛如转胎之状棵工塵土伏龙肝等分酒调服即安

一经治妊娠未满胎动欲产者蒲黄末二钱井花水调下即安

一方加槐子炒黄为末每兔格子大酒调下二十丸以痛止为度

一经治妊娠中恶忽然心痛闷绝欲死豆豉二两生姜半斤水煎

服一方有冷皮一寸無姜

一經治胎動極痛欲墮服醫重五錢水一碗煎至半去滓溫服立安 ○一經治月数未足胎動疼痛子死腹中毋問数死者黑豆二三升炒醋煽淋頓服立出

一經治妊娠痛腹或吐血艾葉一握水煎服神效

一經治妊娠心腹疼痛亏七月小便淋大便閉及傷氣熱病服此法訪胎伏龜肝為末每服二り白水湯下及和泥塗臍下

一經治妊娠忽然心痛或被物所觸或跌跌傷破血令胎損

疼痛者吃名把仁好酒一碗煎四五沸任意做之立安

一方砂仁炒令熟透去皮散末每服二钱酒调下或米饮下须臾腹中原痛处见极热者胎已安矣

一方茅根一把洗净老生姜五片水煎调酒半盏服自平

一傳治妊娠胎动漏血过多不省人事手足厥冷近死狠须生艾叶煎二盏取汁黄明胶一两白为一盏同煎服立安

一经治妊娠胎漏下血不止血尽即子亡鸡子三四个破取黄心以好酒三合同混猪油泥食之未效再下以愈为度

一方用鸡肝切细水泡各半煎服

一经治妊娘幸勿不多或腹痛胎转捻心下空不止或日月未足而欲产石葱蒲根生捣取汁温冯服之立安

一经治妊娘四五六月胎堕下空用冯难救者葱白一大把水三升煎至一升去滓服尚愈 一方葱白煮米冯猪粥食如胎未死即安已死即下

一傅治胎漏出空不止心腹疼痛家鸡羽烧灰为末每服二刀圭调下半夜冯服以愈为度

一经治妊娠下血未止为末每服一二匙调下日二次

又方黄明胶炒末一两鸡子一个水一钵先将艾草煎至半即下明胶鸡子搅化不拘时服甚效一方艾子一斤水三斤煎至二斤分服

又方盖毋仁半两研仁一两为末每服三钱空心白汤下日二服

又方蓬莪煮存性为末糊丸梧子大每服百丸用温酒汤或酒送下效

一经治胎动已出黄水若干乾者一枚炙为末用糯米水淘取汁一鐘调服即安

一经治妊娠误服热毒诸令胎动者黑豆炒熟甘草等分水煎服

又方白扁豆去皮為末清水調服二三次立安

一经治妊娠疾病，卒然胸膈目吊口噤不省人事名曰子痫砂仁
建皮炒黑為末每服二钱热酒调下或不饮酒米饮调下此方安胎
止痛功效难述。一方超妙用米醋炒極热以绢包熨脐下即愈

又方苦练藤晒乾為末每用二钱便调下或急用鲜叶捣烂调敷便
效取汁服大妙

一傳治孕婦傷寒惡動墮胎不救服藥伏龍肝一大塊研和冷服及填
臍下厚二三寸立安

又方井中泥伏龙肝者壹 三味同為末塗在臍中高一寸乾再塗三即安

一經方妊娠傷寒大熱煩渴恐傷胎用荷葉蘸尚卷未舒者焙乾

五分蚌粉二分半為末每服二匕用新汲水入蜜少許調服及塗腹上甚良

又方吉根麥門冬去心石膏等分研為九 每服一方先用蔔根搗

取汁服無根則用蔔乾水調服

一經治妊娠傷寒發熱惡寒芝枝一合煮取根汁一味煎至六七分溫服覆

永發汗即舒愈

一傳治妊娠傷寒上氣發渴腰疼体重心腹滿脹飲食不進四五六

日不解柴皮炙另先炒一麥門冬五錢姜三片葱七根水煎温服

一經治妊娠遇熱病者羊糞或黑羊糞亦可搗爛數膪中証安胎氣内服過症若可保無戸

一經治妊娠胎氣者班變為黑班下血者葱白一把水三升煎去服汁食葱令厚衣即愈

一經治妊娠感寒鯉魚一尾或鯽魚大者燒成為末每服二三匙酒調下汗出即愈 ○一經治妊娠痢疾先因傷寒變成此症矣高良姜炒刺以猪胆汁浸一宿来壁土炒黑下土用枣肉十五枚焙乾共

為末每服三匙水一盞煎沸將發食服神效

一經治孕婦子煩燥及胎動心痛竹瀝升入姜汁一盃飲之即愈

或竹茹一把水煎調酒一杯漫服

一經治妊娠子上沖心菊苗嫩葉一大把水煎濃飲汁即下其胎乃安

一傳治妊娠咳嗽不止柔白皮去皮心寸突三片乾去穰炒香研末各二半生姜三片竹葉五六片沙糖一小塊水一盃煎至七分食後漫服自愈

一經治乳癰血癰蒲黃末以以來飲調下自消

一经治孕中有虚慕苡仁水煎频频服愈

一经治孕妇燥热大便闭结姜黄末前子同猪血煅作美多食妙

一经治妊娠恶阻胎气不安气不升降喘吐酸水起坐不便饮食不进香附米一两藿香甘草各二钱为末每服二钱陈酒调下

一经治妊娠喘急不食或吐痰涎生姜根七分陈皮罗生姜三片兵郎上分兵作剉水煎空心温服

一经治妊娠胎动或腰痛抢心或下血不止手足厥冷或逆生子死腹中艾叶生用一块如鸡子大酒四斤煎至半斤分二服安

一方如黄明膠等分白湯一盞水煎温服立安無生艾用乾艾依如

一經治妊娠暴痛子死腹中不出令母絶閉者江花酒煖服二三盞即下

又方伏竜肝為末以酒調下或白水湯亦可

又方林硝為末以用童便温酒調下立出

又傳方荅子炒通為末每服二刂酒敷調下立消

一經治妊娠腫滿乃屬熱也支子一合炒為末每服二刂空心米飲調下或如湯荅尤妙

一經治妊娠水腫或腹作癥滿香附末炒砂仁微炒名曰二神仙方也水煎服

一经治妊娠水腫鯉魚大者一尾去心赤小豆一斗水二㪷煮食之飲汁一服令尽即下利尽惡物快愈

一傳治妊娠浮腫心腹滿悶胸膈痞塞胎下欲望蒙荅子妙（名七香飯米炒令先炒名七砂仁二分水一碗煎温服

一経治妊娠腰痛如折限器弄水一㪷煎至半取滓出温服之大妙

又経方鹿茸或取一段炙焼赤當火投酒中又焼又投酒如此三四次將出為末每服一匕酒調下或不嗜飲酒用温湯亦效

又経方黑豆（炒酒汁煎至七分空心飲之即愈

一傳治胎前產後赤白下痢垂危一片醋煨炭末每服三
錢空心米飲下必止。又傳治鷄子一个去殼入生姜汁自然
一起蒲黃三錢炒熬空心服食之效
又傳方五加皮葉助筆粗葉射干葉茄殼各三錢甘草小水煎空心服即
一傳治妊娠下利腹痛鷄子一枚開一小孔納黃丹六以箸攪白湿
紙塗包煨熟去殼安令黃香只作一服米飲調下如一服愈是男二服是女
一治妊娠下利白色日夜三五十次者黃柏等者一斤去皮切片醋炒
令焦為末用大蒜一根煨熟去皮搗爛和丸梧子大每服三四

十九宝心末飲送下極妙

一經治臨產難而下痢支子炒為末每服二匙酒調下甚者三四次即愈

一經治臨產水法不止陳皮炒黃為末每服二三匙米飲調下即止

一經治妊娠小便出血白茅根一把密一盞生姜七片水一盞煎過半服

又方独蒜根燒灰研末每服一匙酒調下日三下乃愈

又方用夫君指似甲燒灰為末調酒下即安

一經治妊娠小便不通臍下痞悶心腹脹滿砂仁者研末每服二錢水煎空腹服

又方車前草搗取汁調活石末服之小便立通

又易效

一傷治妊娠通痛大小便不通田螺擂烟和塗臍各少許煨熟臍上

冷用易良久即通　又方只先去穰炒黃明膠炒各等分搗為丸

梧子大服治為末為水每服二十九空心酒湯送下半日未通者再加二十九

又未通漸加至五十九

一經治妊娠忽然小便下白濁如豆汁等物或胎動腹痛一切热症並

治茅根二兩洗淨好銀三五兩或金銀器水煎每半日頓煎去金銀服效

或無金銀只用茅根亦可一方無金銀用金銀花並效

一經治妊娠患淋熱痛酸苦手足煩疼地膚子二兩水二斗煎至半斗服

日度

一經治孕婦熱淋車前子二分 葵子一分 無子用根切細一分水煎服 以利為度

一方葵子治石淋通草分量為末每服二三匙急根煎湯調下

一傳方壯服通而不渉壯婦右臂 各等分 共為末每服二匙空心淡酒調下

又方桑螵蛸十二个炒為末分二服空心米飲調下即止

又方鶏毛燒灰研末每服一匙冷水調下即愈

一傳治壯服氣在腹中如鼠穴土用多年室室中者取一塊合之自止

一傳治孕婦舉高舉手令兒口差腹中自啼者用桐歳一百文

撒于地面令孕婦俯而拾之每拾一文拾足即安

一傷治妊娠發瘡疽疹毒痛苦宜服此方胎安毒散鳥藥五分

切細黃明膠一兩水煎溫服

一經治婦人每懷孕三四月必瘡不肯服藥老母鷄四五年去毛洗淨焙陽入紅棗小黃米煮粥熟食之不效次而胎全固滿月而生

一經傷並母膏壽治月水不調胎前產後一切血症乃婦女之神藥並母草威夏花採取全帶花葉枝根洗用多少洗淨搗破納大鍋中用東流水灌入煎至三分之一以布巾濾去渣取濃汁再入小鍋慢火熬成膏淨罐收貯每用一小匙隨症引湯干后

一反魂丹經治諸症用陽並用益母膏法治並母掌全用花葉
莖根於五月初五日或六月初六日採取洗淨懸當風處陰
乾為末煉 ……
……
……

事以小臺使和酒服下。產后結成血塊臍腹奇痛衣發寒熱有冷汗或面如赭赤五心煩熱並用臺使調酒下或苗荷自然汁下。產后惡露不下結滯刺痛上衝心腹滿悶臺使酒調下產后流血水以棗子煎湯下。產後痢疾未歇渴下。產后血崩漏下糯米炒煎湯下。產后赤白帶下黃明膠炙葛湯下月水不調酒下。產后中風牙關緊急半身不遂失音不語臺使酒調下產后氣喘咳嗽胸膈不利惡心吐酸水面目浮腫兩脇疼痛拳攣失力溫酒調下。產后月內咳嗽自汗發熱久則變為骨蒸

產後調下　產後寧嗽古黑口乾產後病太
渴宜痛呵欠心人物氣短羸瘦不思飲食血風勞熱手足煩燥口
苦者薄荷煎湯下婦人陰冷久無子息溫酒調下

胎產

胎產者婦人最重性命甚閨閣有旦夕之不測安危有瞬息之
難測婦人之心各異而種種之病不同斯載調理諸法備
急者方以為檢悉之應　凡婦人之病惟產難為急子母懸
命于片時不可不謹故妊娠臨月須居處合法飲食得宜則

生育頻安而諸病可息矣斯參脈各異忌孝法其諸產母宜
切體焉　其一戒喧鬧令產母惶恐則氣散而難產其二戒早逆
當視兒頭已轉向下方可努力送之或延用藥催之若兒當轉
未頻而用力送之及用藥催之則兒被推逆而出或橫或逆皆由
此故其三戒室空如轉屋則扶起或令舉燭索而生不可空廬
產門則兒難出其四戒凍產若值冬月天寒宜着衣裳溫孝不
可單衾令氣虛洩滯不能速生其五戒熱產如夏值夏熱宜延清
涼不可多人聚氣令血暈逆沖犯之凡未生產宜飲粥以調其

氣令得力託送

一經治妊娠至八月周年內土三兩臨產取一兩和酒服甚效

一經傳胎活易產方如轉產宜先服事前予為末酒調下一兩不飲酒水調下甚佳 ○一經治漏血胞胎乾燥雞產黃蓉花燒乾為末各等分酒調下二兩或酒下尤效

一經治懷胎胞乾雞產香油蜂蜜各一碗入銅鍋內同熬二三沸去沫以活石一用為衣調入溫服外以蓉油塗臍上下立出此方不但活胎大能助血

一经治產難致日不出者桃仁一个破開為二一片書可字一片書出字合而吞之即出　又方金箔大者五片小者七片以小磁滴水一二点將金箔去紙入金碌中用一指研勻再添水一碗一人扶產母虛坐又一人以兩手指按于產母兩肩并穴將前藥服之其胎即下如產月未足服此方亦能安之

又经方海螵蛸用大者三寸香油浸透灯上燒之其油滴入酒中兼以其灰研末調入酒服立下

又经方螃蟹一隻用熱白湯和服取效

又方皂角子二粒吞之或皂角刺燒灰為末服一匕酒調下甚驗

又方雄鷄頭燒為末調酒服立下

又方蓮葉一片或蓮花一瓣書人字吞之即產生下也

一經治產難及胞衣不可或胎子不下草麻子十四粒去殼鵝烟塗兩脚心立下如已下即洗去不然腸從出或腸從出急以十四粒搗塗頂門上即上收矣

又經方童便一碗葱五根姜五片煎三沸熱服立下

一經治產難多日子死腹中班苗二个去頭翼足以糯米炒黃

去米取班蕾為末調水服立出未出再服但不過三服

又方益母草生搗絞取汁一斗煎至半服立生或用乾煎汁服亦效

又方艾葉五月酒三碗煎至一碗服即下自安

又經方紅花水酒煎服即下

一經治子死腹中視其母舌青黑者是朴硝三斤研末入溫童便服之化下鹹水胎出而安

一傳治子死腹中二三日不下胎脹急近危絶者取針百枚水磨三四分服或用刀舌磨服外以好磁石一塊置于產門立下

又方以利刀舌炭火煅紅淬入酒中待溫服之甚子即下

又後方烏雌鷄一双去毛洗淨用水三升煮至半去鷄用帛幅醮汁乘熱熨臍下即自出　又方雌鷄糞二十丸水煎澤下白米煮粥食之立下

又方雄鼠糞尖頭者十枚水三升煎至一升濾取清汁入米煮粥食即長服下

又方鷄子取黃心一个生姜搗爛絞取汁和白吞之立下

又方麻油麥等分調白煎溫頓服立下

又方葵子為末酒調服一刀圭或困急口噤者取漏灌之即生

又傳方小便用本夫者一兩煎沸來熱飲之立下

一經治胎死腹中及胞衣不下羊血刺取一杯乘熱飲之立下

一經治產後子死腹中或橫生逆產母氣欲絕者伏龍肝為末每服三錢

水調下及搽臍中其兒頭戴土而出大驚

一經治生先露手者謂之橫生先露足者謂之逆產當針法用小針於兒露手足心針入一二分刺三四孔以藥塗入針處輕手送入兒得痛勿轉一縮當回順而生矣

又方黃丹塗兒足心即順 ○一經治諸般橫逆產難及子死腹中不下用柱心入射者少許調酒服即下此藥不損人名觀音救苦散

一經治橫生逆產母子將死跪退一條蹲退十四字落髮一名同燒
為末分作二服酒調下須臾一又一服仰卧片時即下
又方蹲退炒蕎為末每服五分酒調不如神
又方車前子為末酒調服二り即頻生矣
又方陰毛二十七條用本夫者燒研酒服迫轉而下
一經方鬼箭子為末酒服二り一方加車前子等分
又方樑上塵二り調酒服立出　又方槐子十四粒吞下即出
一經方胞衣不下腹痛極將乾雞站一中水一碗煮二十沸灌入喉中即出

一经治脫衣不下用生葱白三根嚼下立脫

又方皂角刺燒為末每服一刀温酒下自出

又方鷄子用清心好酒各半和勻調入口中即下

又方葱白燔為湯用熏每服一刀服立下

又方紅花一男炒煮好酒五盞次入温服或不能酒用童便代之此症乃氣弱而血虛疼於脫也故用酒以和氣紅花以破疼一方加茱萸同煎

又方以產母鞋底燒熨小便上下冷用易之七次即下

又法令產母取自身髮尾含入口中令咽嚥其衣自下

又方大蒜一根搗爛調酒服立下。又方蒲黃末以井水調服之立下

又方葵子一合半必男水三升煮至一升服立下

又方黑豆半斤炒黑酒三升煮至半升一服即出

又方赤小豆生男七粒生女九粒以東流水吞下自吐出

又方伏龍肝醋和如泥塗臍中立下

又方蓮葉炒香為末服二刂用童便或溫酒調下脫

又方肉桂以為末待痛甚夜以童小便調下逐出

一傳治產下垂腸脫出乾不上收用醋一盞噴婦面一噴一縮不過

三五噴冬痛至妙　又方半夏為末當嚏鼻中得嚏則止

一經治產後盡腸從出草麻子十四粒去殼研塗頂上及心胸其腸即收

又方用紙捲作一枚以麻油浸潤燃火又吹滅以煙薰入鼻中如此三五次其腸即收　又方以生切片水煎浸之良久即入

產後

既產之後精神耗散氣血虧虛經絡疎脈筋骸弛一身之汗恰似暴風之掀逆浪之魚當此之後宜十分小心調養閨房謹寡情慾和平身体安舒言語微細飲食節戒衣服溫和如此謹

防則諸頓息苟或少失為患不輕經曰犯虛微若秋毫成病重如山岳豈不慎歟今附治方于后以備緊急之變

一凡產畢不問有病無病先宜攝服則諸病不生童小便同酒調服少坐床上倚高柱膝仰卧良良嗅醒不可大眠或產后血注作塊腹痛者亦依前服至效

一方麝金根炙含酒小便服　又方用一小炉火炭置于床边常以好醋炙入令細氣通入諸竅如此三日則血暈之病可除

又方剉苧或乾濕黑燒薰尤效

又方蔓荊葉一把洗淨搗爛調水服之可除瘀血悅顏色進飲食

一治產後百病諸氣桃仁一千二百仁去皮尖及双仁者不用炒極搗極細以清酒一斗半椀如粥納小罐中封入竈中燔一炭賒用每一盞調酒服日三次甚驗

一治產後血暈心神昏亂口噤服花紅花一味為末酒調下一方用童便一盞新汲水調服一方加澤蘭水煎

又方荊芥穗末童便調下即甦一方加桃仁炒半分

又方韭菜切細入罐中以醋煮熱趁入罐封罐口仍開一孔置入鼻中即醒

又方半夏為末丸如豆大納鼻中立醒亦治五絕神方

一傳治產后血逆昏迷將死熊胆一分麝酒灌下立醒

一傳治產后血暈上攻頭目昏脹馬鞭草益母蒼耳各一两酒浸紅花并木各分半為末每服三钱白湯調下必愈

一方用益母蒼耳等分姜三片水煎服

又方澤蘭青皁葉青新葉等分搗爛水一盆煎至半服以愈為度或調童便尤妙一方只有澤蘭紅花二味

又方荷葉紅花姜黃等分炒為末每服二钱童便調下

又方連錢草青新葉魚腥草各等分同搗爛入童便絞取汁服以

澤釜頂工　又方老棉皮去粗皮青新草澤蘭半兩水煎服及潤頂門上面效　又方鹿茸燒存性為末每服二分酒調下醒

又方茅木三男水二盅煎至半分二三服即愈

一經治產后下血過多不止或心腹疼痛者買豕一根全用利刀去皮毛以好醋濕紙重又包之煨火炙令香熟為末每服二分空心米飲下甚效

一經治產后下血過多羸瘦近死者蒲黃二男水二盅煎半服效

一治產后去血作渴逢冬二个生研末二分米飲調下立愈

一治產后下血暴崩不止石蓝研一两半酒二盏煎至半分三服食前温服即愈又方蓬莪二生香附二两同烧存性為末每服二钱米飲調下日二次大妙 人方山三柰搖為末每用一钱酒調下神效 又方虫蠹在柴樹中取下炒黄每服二钱酒調下二次效

又方桑白皮刮去黄皮炙黄水煮服之甚效

一傳治產后下血不止或惡血内攻煩悶面青冷氣欲絶者羊血生常飲之至妙 ○一傳治產后惡露不尽腰疼腹痛良作寒热頭痛不思飲食挾四良感發寒热香附末炒為末陳

皮紫苏各一分乾姜半分水一盅煎沸温服效

一经治产後血闷桃仁二十个去皮尖双仁者不用藕一节水煎服乃通

一治产后气血攻心痛恶露不下伏毫肝为末每服二钱酒调下活下恶物血段

一治产后恶血不尽流入胸膈腰脇令人寒热痛渍竹叶生姜等分水煎温服大效

一治产后恶血不尽注滞成块香附末童便炒桃仁去皮尖等分为末用醋煮糊为丸梧子大每服三五十丸空心盐汤姜汤下

一经治产后恶血不尽而攻腹痛者鹿角烧为末每服一钱用豆豉

煎湯調下日二次服神效　又方乾艾一大合醋炒熱壓臍上以綿帛覆之次須斗氣火炭熨上待口中艾氣出則痛自止

又方鯉魚用鱗燒末每服一勺酒調下即覺血通痛止

又方荷葉老在水面者佳炒書為末每服二勺用童便調服盡效

又經方蒲黃濾紙過更每服一勺長流水煎湯調下甚良一方加苧根尤效　又方荔枝殼一大把水煎濃服大妙

一傳治產後血亂血氣上冲或攻心腹痛藕根汲取汁二三升頓服即安　又方鷄子二三枚用童便一碗煮熟食之即安

又方柱心為末用狗胆一枚取汁和丸芡實大每服一丸酒送下立安

又方鼈金燒存性為末二分酯一杯調灌下

又方生姜三月切片水五升煎半分三四服甚妙

一經治產后血聚成癥痛柱肉為末每服二分酒調下其塊自消

一方加姜黃等分　又方刷竹子為末每服二分酒調下即愈

一治產后血氣刺痛各慶逢義炒乾等分炒等分水煎服大妙

一治產后血乱奔入四肢及地墜狗頭骨燒為末酒服二分甚效

一治產后中風口噤身直兩耆子是又張竹淫一二升入姜汁一二

杯兵和二服即愈　又方前荊穗各炒為末每服二錢以黑豆
浸酒調下或童便調亦可　又方苦練藤晒乾為末每服二錢用
童便調下或急用葉搗爛調小便絞取汁服大效
又方鷄糞白一合黑豆半合各炒黃酒浸或燉猪取一鍵入竹瀝半分服
之取汗乃痊　又方大蒜三十瓣水一大盌煎至三分之一灌下即愈
又方伏龍肝研施姜汁共為末每服二錢酒調下日二次不拘在服
又方童便一碗生姜汁取汁一杯調服立醒
又方蒼耳草陰乾為末每服二錢酒調下便活

一傳治產後中風煩渴杜花子三合炒黃搗破水煎絞又呷下即瘥

一治產後百病或血熱煩燥有餘血水氣或中風困篤或皆動口噤或但煩熱瘡瘕口渴或頭身皆腫或身痒嘔逆直視或手足頑痺頭旋目眩此皆虛熱中風也大黑豆三斤炒熏至微煙出以酒五斤同入罐中浸之經一日以上服酒一斤溫服令汗出身潤即愈口噤者加独活角搥破同浸之凡產後必宜常服以防風氣又消結氣功甚效大

一治產後胸滿或腹脹不能食者赤小豆十四粒燒存性為末冷

水調服即愈　又方鷄腹葉一把水煎服自消

又方白狗肾燒存性白湯調服一錢乃愈

又方青皮炒過為末每服一錢用葱白二三根水煎調童便溫服即愈

一治產後虛煩竹葉一把水煎不拘時服神效

一治產後煩悶脫汗不省人事羚羊角一兩燒為末用流水調下未愈再服

一治產後虛瘦大便閉結黃明膠切細炒乾只殼去穰炒各二兩

枯石一兩共為末每服二三十丸溫湯送下半日未見利再服

一治產後多汗大便結紫苏子仁去麻仁各半合洗淨研末用水雨

研取汁一盏分二次熁粥食之妙

一治產后大小便閉澁不通桃仁麥子各五兩郁李
服六宝心急白水煎湯調下

一治產后小便不通小通麥子麻仁各五兩即只是各等分甘
草半分同為剉水一碗煎至七分湯服

又方漆皮去白炒為末每服二刂空心酒調下立通

一治產后盜汗牡蠣為末用豬肉去脂膜精者一塊水煎去肉取
汁調服乃止　又方馬蕷覓搗取汁服止

一治產後虛汗竹瀝三合溫服良久再服神效

一治產後病泛痢津液枯竭煩渴引飲口舌乾燥四肢浮腫者冬瓜一枚以黃土泥外包厚五寸許火煨熟開後取汁飲亦治傷寒痢渴

一治產後痢日四五十度宜煮在桑樹者取炒黃以水洗之令濕丸彈子大每用一二丸未飲送下以愈為度

一治產後下痢赤白稠急後重腹痛者虎膠炒乾蒲黃炒過況香各半分為末每服二錢食前米飲調下效

一治產后下痢赤白相雜紫苑菜一握切細煮汁去滓入粳米令煮粥食之立愈　又方鼈板塗醋炙九次令黃赤為末空心米飲調下

一治產后痢渴飲水無度婆門煎烏梅二枚水煎往又呷下即止

一治產后並痢及治小便不通腸腹疼痛馬齒莧疼取汁一碗煎滿入蜜一盞調服即愈

一治產后下痢或腹痛扶老樹皮荔樹皮水一盆煎至半服之乃愈

一治產后或胎前下痢山梔子去皮取仁炒黑為末每服一匕空心白湯調下甚者不過五服全安

又方荊芥四五穗盞白用竹炙燒存性射香少許為末以湯下
神效此藥雖微能医大病不可輕忽

一治產后泄泻百草霜凍米等分同為末每服二钱空心米湯調下效

一治產后泻血不止乾姜葉半两老姜半两水煎濃一服立止

一治產后便空乱髮洗淨燒末二钱温湯調下即愈

一治產后遺尿不禁鵝糞草燒末每用二钱調下止

又方鵝糞白燒為末每服二钱酒調任下神效

又方鵝毛燒為末每用二钱温酒調下即止

一经方猪胞猪肚各一个糯米拌纳入猪胞内又以猪胞入猪肚内同
姜葱连皮盐焙食大效
一经治产后虚汗必小煎常服愈
一治产后羔热发劳四肢倦急雄猪肚去白膜切细用粳米调
盐焙粥空心常服甚妙一方用猪胃
一经治产后身热皮肉生疮如粟粒烧桃仁研烟调猪脂和
如泥涂之效一经治产后虚羸腰脚软弱渐消
为末每服二钱酒汤下即消

又方益母草水红花等分水煎服或调童便尤效

又方逆龙菜捣烧入盐少许混匀擦腭上以利小便即消

一治产后遇风邪心虚惊悸猪心一个去窍一小合水煮熟去豆取猪心食之自愈

一治产后发狂言鬼语烦渴不止生姜切丝香附末每服二钱姜三片枣一枚煎汤调下

一治产后发呃逆三四日不止危急欲死肉桂去皮切生姜捣取汁半碗同猪肺令人用生炭炙手烘背令热换取前药涂之尽药即止

又方乾柿切细水煎服之甚效

一治產后逆喘面黑欲死茅未那水一味煎至半八人參末一刼服之神效不可尽述

一治產后因怒哭傷肝喔清徐水韮菜一大握洗尽擣絞取汁入姜汁少許和服乃妥

一治產后舉動艱難婦為末童便調服二刂止

一治產后目閉心悶赤小豆生研末每服二刂長流水調下日二次見效為度

一治產后筋攣手足拘攣黄栝蔞一个香附米半刂苦参皮一刼半同為末以青豆粉打糊丸小豆大每服三九用蓮菜肉一塊納藥于內空心

各下如病人氣血壯實者同前三味等分為末每服使錢一匕
分四服一字酒調下甚效真仙方也

一治產後忽然腹中痛痒筋枝或發癮疹遍床席下勿令知之一
方用針線囊置席下勿令知即安

一治產後陰腫或作痛桃仁燒末敷之即消

一方治仁去皮尖五味子枯礬各等分為末摊帛片敷之自愈

一治產後胞衣肉挺垂下長二三尺觸之則痛引心欲死者原
來產後用力太過故爾生姜用老汁連皮搗爛入麻油二升拌勻

炒乾先以熏籠裂作方幅三四重令人輕手盛起重周使之曲盛作三圍呼入內戶乃以籠包前藥熏之冷則再易如此一日夜縮入過半二日冬入此方乃驗夫人傳

一治產后胞物脫脫肉長出先用溫水敷雄黃炙熨者遍于疏中火燒以竹筒引烟薰之即入神效

又方蛇床子綿盛熨之又法蛇床子五月烏牧四分水煎日洗四五次神效　又方荊芥皂角等煎濃湯洗之又以狀漿塗即收

一治產后胞翻胞戶燥熱逼成翻花澤蘭四兩煎湯薰之待溫洗之二三

次用入枯礬洗之妥 。一治產后勞傷陰門脫出硫黃烏賊骨各五分五味子一分共為末每服二次神效

小產

夫大產者滿月而生小產者未期而墜也大產是其常小產是其變大產譬如木盛果熟而自落小產譬如木枯果傷而墜零墜母之氣血不滿果臟腑有損伐而致先調治節戒又謹於大產之後方可無吉而以近小而輕視焉。

一治妊娠半期而墮心腹痛脹煩熱不安鯉魚一尾重二斤去鱗

膈用杏米仁並藥煮食一日三次善

一治產胎墮下血頻滿寒熱狂悶鹿角鎊出炒黃為末每服三刂水調下日三服神效　一方用豆豉一合煎湯調下前藥尤妙

又方鷄毛燒灰為末每服二刂溫酒調下良久再服以愈為度

一治墮胎下血過多腹痛面青近死鷄子半當抱度者佳用好酒半碗煎沸入鷄子以手酒中攪之去酒食鷄子立安

又方羚羊角燒為末每服三刂用熏豆湯調下即安

又方乾姜五刂生姜四刂水煎服立止

又方好醋好酒各半用有嘴瓶灌入煎熱將嘴瓶向病人鼻竅熏之令氣透入即甦

一治墮胎血漏赤童男藥搗爛調水一碗絞去渣飲之安

又方山三棄根為末每服二錢酒下效

一治妊娘月期未滿傷胎子死不下醋酸三斤熏大至一斤猪服即分解支骨胎便脫下未下再服

一治墮胎胞衣不下腰痛危困蟻穴土三分炒熏中色熨臍下自出

又方猪膏二盃水一碗煎至半溫服自脫

又方鸡子取清心煖之自出。又方矾石烧赤通红淬酒中待温煖之自出

一治婦人新產服毒藥墮胎腹痛或胎氣已傷未墮口禁手強自吐症似中風九死一生者白礬三寸炙為末每服二刂末煖下或水煎煖亦效

一治婦人每恠胎必墮血氣不固令胎不順宜服此方香附一斤分四分一分酒浸一分醋浸一分童便浸一分焙乾共為末糊丸梧子大每服七十丸空心淡酒送下產人加澤蘭赤芍各等味二刂

乳病

夫乳病者乳房結腫疼痛是也蓋乳房陽明之經乳頭厥陰所屬只因失於調養或忿怒逆場或思慮鬱結或飲食膏味皆能致此如有妊娠而患者名曰內吹乳有兒吮而患者名曰外吹乳令乳腫痛甚則增寒壯熱若治不效則成濃潰煩矣

一傳治婦人乳頭紅腫欲生癰者蒲根搗爛數之日即易消為度

一治乳癰初發結瘽疼痛寒熱但未膿者神效　鹿角尖三寸削破炭火燒紅存性為末每服三錢食後酒調下甚者二服必消又用鹿角磨汞濃塗之　○一治經脉壅塞乳汁不行邪氣注奮

乃作腫痛是方力能养血行乳服之内消毒疮外通乳汁姜子炒香砂仁等分同为末每服二钱食後温酒送下

一治乳癌初发作痛寒热但未成脓者 桑叶嫩表一把捣烟敷之以纸遮护乾再易之以消为度

又方黄明胶入醋少许火上溶化成膏船之立消内用香附末为末每服二钱食後白滚汤调下 一方葱根水煮一升频服即消

一方射干萱草根等为末每调数之神效

一方牛黄和酒数之即衰便消 ○一方用碗一口内以巨灯草

四條梯定十字于碗內令露出碗外一寸用用廣紙圈裁用水濕漫置于碗內灯草上紙與碗口相齊將碗覆在腫乳上放灯草頭在外將艾一大團置碗底上點火炙之艾尽再添炙至碗口流出水汗內痛覺止方住一次必消甚者次日用炙真神法也。一治乳癰腫痛馬鞭草一握生姜一塊搗爛酒二盞拌炙取汁服以滓敷之即消。

一傳蕭黃葉水煎服并搗爛敷之日三次服即消。

一方芙蓉葉搗爛和蜜敷四圍當中頭以減毒氣乾用易之即消

一方芙蓉調塗醋數之。又方南星熬湯磨濃以鵝毛塗之立愈

一治乳癰如乳初起堅紫累塞不痛者挪根搗極爛炒溫用帛包熨之冷再易一兩度消。又方人牙燒為末醋塗調之日三次大效

一方馬尿常塗之乾再塗不日即愈

又方紫苏煎汁服及生搗爛塗痛處神效

一治乳癰未成膿者即消已成者潰瘍痛者服之即安康皮湯泡去白晒乾數炒微黃為末每服二刂入射香少許調酒服其功不可盡述

一治乳房腫痛不問內吹外吹並效跳腦一又七寸燒為末酒一盃

調服即愈。一方生葱一把搗爛作餅烏置乳上用瓦磚盛炭火置葱餅上熨之汗出即消腫止痛內用紫蘇煎湯日二服神效

一方蚯蚓糞在蔬菜下者研末醋調塗敷乳上乾頻易之不三四次即愈

一方生山茶搗爛敷上即消已消即去之若遲則肉腐

一方用黃紙朱半小田大火大小　如此貼乳上立效

一方鳥桕根搗調酒服以滓敷之效

一方續骨藤搗爛調好醋入鹽少許炒熱塗之自消

一傳治產石乳汁不通瘀結脹痛及乳癰等症蓋母草熬膏調

好醋少許掃之如無腦用葉搗爛調好醋入鹽少許塗定立消

一方雀蜂燒灰每用二匁水半盃煮至半分去滓濕服

又傷方壯鶏為末每服二匁酒調下效。又方茶葉搗爛數之立消

又方皂莢刺薑荊芥等分同燒為末每服二匁酒調下立安

又方松葉搗爛用鹽糟各少許和匀塗之效

一治產後吹乳結瘕皂莢十个搗爛酒一碗揉搦取濾汁入朴硝五匁煮成膏塗之即愈。一治諸乳瘕久已成膿不能破潰白鶏翅兩邊第一毛共二莖燒灰研末酒調下立破

一方皂角去皮炙為末每服五分食後酒調下甚效

一方雀糞乾為末每服一小錢酒調下　一方研塗無服

一方豬膽切片冷水浸每以一片貼患處熱再易之立效

一治乳頭裂開嫩茄子用霜後者佳分二次乾燒為末每服二小錢食後米湯下愈

一方鵝糞白炒黃為末每用一文小錢酒調服不過三服愈

一治乳岩與乳癰同處而異病也乳岩初起一核如棗子不痛不紅不癢三五七年漸痛成膿潰爛則如岩穴之凹濃汁浸淫胸脇疼痛至此則難為治蓋因憂鬱忿怒不遂久積在心

不得發越乃成此症治者宜貫字初若已成瘡膿則十喪其九矣

一治乳岩初起或年久潰爛者青皮四兩水一碗半煎至一碗徐又服之日一服或為末調酒服日漸取效。一方鹿角膠酒服又塗患處即愈

一方穿山甲燒乾為末每服一兩食後用酒調下日二次

一方葱白連根一把搗爛作餅數枚先用礬一兩置炭火于內熨礬于葱上令熱氣透下汁出必愈

通乳

夫乳汁不出或出而少者由氣血虛耗而致也譬如源遠則流

急之急治宜滋補氣血則乳自溢而通

一治乳汁不通赤小豆煎汁頻飲之甚驗

一方鯉魚一尾燒為末每服二錢酒調不立通

一方絲瓜連皮子燒存性為末每服二錢酒調下覆衣取汗即通

一方牡豬足一具去毛甲未通一斗水二味煎至半分取汁服乃溢其歸肉任食

一方野猪腊和酒日三服十日可供三四究素無乳者亦下

一方天花粉穿山甲各一兩八猪蹄灌水同煮爛以猪蹄及原猪汁服食

一方穿山甲炒黃為末一兩桃仁去皮搗爛十个用黃酒調服一方無桃仁

一方小通牲水煎服 一方加葱白根等分用煎

一方三棱三根水二斤煎至半洗之以乳汁出為度

一方麥門冬焙乾為末每服二匙以酒煮半每做一次湯調下二服便通

一方葵子炒香研仁等分為末每服二匙酒調下便通

一治婦人乳少胡麻炒過為末入鹽少許頓食妙

一治產后無乳胡荽煎湯飲之即下。一方用搜未豬蹄常食尤妙

陰病

夫陰病者婦人陰門生瘡腫也蓋因七情鬱火損傷肝脾二經濕熱下注而致此症其為病或陰中挺出

如疣者形或突出如菌子如飛鷄四边腫痛者或小出痒不可忍若不早治則此虫食入臟腑即死或陰閉而不閉者或生瘡而潰濃血爛臭者其陰中瘡腫形症固多然大端由邪火所化矣又有婦人阴頭生瘡者由阴中尚有前精因又交接虛熱薰蒸即成此症矣經中號為妬精初發如粟米犯之則痛二日漫漶濃作門孔蝕之大痛婦人生此瘡正似男子疳蝕瘡相類但不痛為異尔

一治脬陰門腫硬如石不痛著痛不可忍青魚胆七枚或鯽魚

胆亦好用绸绿二三个烧灰研调鲫鱼汁取鸭毛搽上不
过半夜即软神效　一治阴戶腫痛坚硬臭橘皮切细炒
热用绸包熨之冷再易即安

一治阴腫坚痛二便不利只笑搽辟五六两炒热帛裹离二围
乘温从上至下痛处熨之冷即易一方有陈皮同熨烧口中闻
药气即腫消痛止便利

一治阴腫極痛馬齿苋搗爛數次即愈。一方鲤一合炒香布包熨之大
一方茶枝截取長三寸者二十條切细水煎極热以布包腫处此热湯润之即
效

又方甘蔗苗搗爛水煎渴先薰後洗效

又方馬鞭搗爛取汁塗之自消

一治婦人陰瘡蛇床子綠色燕燕熨之

又法蛇床子五兩烏梅十四枚水煎日洗五六次效

一方半夏五月酒三升煎至半去滓分三服即愈

又方鷄冠血或鷄血亦可滴入酒中飲之覆衣取汗即愈

一治陰門中生瘡痛如虫咬桃葉搗爛綿包納陰戶內三四次易即效

一治陰蝕欲尽蠶除一个燒灰鬼蓋等分為末敷之即愈

又方鸡肝切片纳入阴户引虫出尽效

又方猪肝炙燥纳入阴户则虫俱出而痒自止

一治阴肿作痒大蒜煎汤常洗之甚效

又方槐白皮水煎盛濃候温浸洗之即消

一治阴痒生疮胡麻嗜娴数之效

一治妇人阴疮母猪粪用黄土包火煨存性为末先用米泔洗疮处净以末敷之效 ○一治阴疮湿痒槐花炒向不见日者折一握或槐树白皮炒水煎温洗四五次瘥

一治婦人陰痒枇仁搗爛絹包塞之神效

一治陰門翻出流黃臭水疼痛取綠豬二三斤燒灰研末調酒以鵝毛掃之其毒一時即愈。一治歸人陰脫羊膏常塗之取應

一治陰下冷痛入腹則腫滿致人死茉根搗爛敷之即愈

一治陰門冤冷硫黃水煎頻洗見效

一治陰宮寒冷蛇床子為末白米粉少許和丸彈子大絹包納入陰即温又方五味子四兩為末以津液和丸手指大納陰中日一易效

一治婦人小产嫁痛牛必五斤水煎調温一鐘温服

可与婦女

又方烏賊骨二枚炙焼存性為末每服二刀圭酒調下日三服

一治婦人陰門肉挺如茄子赤色轉移出入及疼通用黄蓍葉白蓋女菜赤蓋男葉各等分同搗爛捻作餅炙焼熱熨之冷再易或納陰戸亦可

雜病

夫人一也而婦人為劣病一也而婦人為多医一也而婦人為雜凡病之常也已著门頗然或生奇病小差雜以目張故令彙雜病為一门以備施治尔

一經治婦人共邪物交通独言独笑自悲自恐悦惚不安者雄黄一男為末松脂二男混一处上溶化用虎爪擒之滴水不散為度九如弹子大每夜以炭火燒之用好篦覆罩令妇人坐上以被蒙之露頭在外不通三次即安内用人參防風雄黄五味子等分為末每服一匙空心井水調下神效

一治婦人因交接傷動阴血流出者五味子為末熬之即止

又方雞雄刺取冠血塗之自止

又方青布一片乱髮等分同燒存性為末熬之立效

一傳治婦人每遇冬季輒出血肉桂去皮伏竜骨等分同為末
每服二刂淺酒送下乃息

粧飾

夫婦人以彷色為一身之標致彷可守而色可粧苟為無所守
則垠了名節百年色無所粧則減了風光一世故錄等方
于左以備粧飾之一助云

一經方令面容悅澤冬瓜仁五月桃花四月橘皮二月晒乾為
末每服二刂食後　湯送下日三服致白加冬瓜仁致紅加

桃花服之三十日面白五十日肢体俱白大效

又方桃花三月三日採取鶏血七月七日採取同為末和勻塗面上二三日後脫下則顏色光華也

一方面黑令白冬瓜一枚以竹刀去皮切片酒一升半水一斗煑熟濾去滓再煎成膏掌藥收貯每夜塗之日洗之久久面自光瑩如玉

又方天門冬去皮心晒乾同寒食麵作丸水磨洗面

一治面体黧黑皮粗狀醜羊脛骨為極末調鶏清心夜則塗之至旦以白梁米泔洗之三日如续神效

一治面黑黯鹿角尖水磨濃拿塗之乃愈

又方蒼耳葉焙乾為末每服一刀食後米飲調下不過一月不愈

一治面生黑子胡荽水煎日日常洗之自愈

一治面上粉刺瘡子如米粉浮萍小如蠶者楊姻日日塗之大妙

一治面上雀斑瓜蒂子仁瓷瓶硫黃各一刀為末用羊髓調勻夜夜塗之愈

又方黑牽牛研極細調鷄子清心夜塗早洗三旬內好好

一經治唇紧面脆馬齒莧水煎日常洗之大效

一經治少年面皰浮萍洗淨揉水服以澤塗之效

又方浮萍常皆四月内已一月水煎濃洗之又以浮萍揉爛热搽班
點五日四五次物雖微末其功甚大不可小視
一治面上癜瘕蕎子少支子各一合共為末醋塗調夜旦洗神效
一治身面生疣目南星醋磨常塗之自落
一方塗髮長黑方蘇脂蔓荊子等分為末和勻醋調夜又遍搽至妙
又方桑葉麻葉等分以米泔煮洛之七次可長效又
又方令髮長黑及髮落不生麻油用桑葉同煎香桑拴又搽之久久其髮必雲
一治髮斷落不生冬收葉搗絞取汁常塗自生

又方猪膏猫月取火熬溶把用生铁一件投入童三沸停冷收贮每用
时以好醋米泔洗净以布擦令热以膏涂之乃生

又方古烟筒用麻油磨浓涂之即生

又方桐叶一把麻子仁三升米泔煮五六沸去滓日日洗之则生长甚妙

又方芭蕉大株以竹筒刺入皮中令汁流出用瓶盛之每用润梳又頭
则自坚而长黑

一治眉髮脱落椰叶阴乾为末每用姜汁调入铁器中夜又擦之
渐又生齐

又方茶根皮二斤去外黄皮以水淹浸煮五六

佛去澤類又洗沐自周

一治髮黃赤不黑黑至醋煮濃染之

又方羅脂塗遍頻以梳子梳散于床下伏地一食頃即出不過脂

一斤冬變黑緑　又方側栢葉生搗爛一斤猪膏一斤和九

如彈子大每服一丸布包納米泔汁化擂沐之一月則色黑澤矣

又方羊糞燒灰研極細以臘月猪膏調之塗日三次夜一次

又方蒺藜子仁香魚去澤二日後去头氣取刷之好

一治髮拈不潤末服為末浸蒺油日日梳頭則緑浩矣

又方桑根皮刷取白側桕葉各一升水煎沐之則愈

一治頭髮不生側桕葉陰乾為末調麻油日日塗之久而自生

一治眉毛不生羊乎半下拳方為末生姜自然汁調搽数次即生

一治人無髮甜瓜葉搗後取自然汁頻頻塗之即生也

一治白髮不生桑椹熟紫黑者水浸日乾搽塗令黑而復生

一方拔白換黑狗胆汁每拔去白根即搽入根下自生黑也

一傳染白髮方桑椹大熟紅紫者半斤斜半斤用磁盆封固

懸於屋東頭百日令化為黑洗用以染白髮永黑如漆

一治眉髮忽被瘡痕不生者生蹉擂擂入瘡処日二三次即生
一治髮黃赤不黑以髮一程洗淨晒乾燒入麻油煎令焦用油
研盡細塗常擦之久則長黑

新刊南臺神效十科應治卷之八完

壬辰年十二月初四日