卷玖

卷九小兒科

急驚慢驚慢脾痧熱症感冒傷食吐泻瘧痢痧
咳嗽客忤腸脹胎熱胎黃胎驚腹肚不乳撮口噤風
腎風　夾食夜啼中惡天吊口瘡撮舌病牙疳丹毒
赤遊喉痺腹痰癇痢疳脫肛便閉腫脹腎癰癬顱
諸通竜腦竜膏導順顱喘顱滿痘疹麻疹

新刊南梁神效十科應治卷出九

小兒科

初生　夫小兒初生乃一葦之軀稚弱微之氣血精髓未滿臟腑未充筋骨未堅皮膚未厚故易寒易熱易飢易飽使母養失宜則不能免于病耳惟初生之際宜十分防謹保終吉凡小兒初離母懷於口中有惡血一塊急以絹包手指探入口中洗去若不及而已吞下即煎甘草黃連濃汁灌之令吐出惡血方與乳且亦聰明矣或用一朱砂研末

水煎過時再調服小兒乳汁代服三日三九以免疹痘胎熱之患

凡小兒初生以桃柳梅桑槐一五根洗淨切碎或加苦參白芷同水煎去滓又加豬胆汁一枚稍溫洗兒洗畢方可斷臍若先斷臍而後洗者少則成瞎風長則成臍疾斷臍畢即用乳髮燒灰調清油塗之忌水

凡乳食不可兼于一辰令兒有癖疳積又食不可太飽亦不可太饑常令帶一分飢寒者以免生病

凡小兒三歲以前不可食甘肥葷腥生冷及鷄肉免生羣病

一小兒沐浴神方益母草水煎濃常浴之永不出瘡疥

一小兒初生解毒方甘草炙過打碎水煎濃滴入兒口中倾一蜆殼許乃吐出惡汁令兒智慧無病後痘稀少

又經方蓖菜洗淨搗取汁許多滴入口中吐惡水惡氣自校無諸疫病 ○一治小兒初生寂然不啼由娠產少氣故也溫水灌之及將兒臍向大人心中取溫氣并以口呵氣至百度令嗄氣入腹又以葱葉拂又觸兒身自然啼發

一傳治生來痘閉煎將目新墓上土取一粒如梧子大調煎藥

为一口吞之或调冷水饮之每月调理二服至十二岁方止永保延年百发百中但勿令母知识破不效

变病审法　夫小儿初生或遭病苦非特身上而致多由父母所遗或哺养非宜居处失节或父母常亦淫七情之汁而交接之后胎火熏蒸遂遗禀那热之气多是不和故受而生来难免于病矣凡小儿之病为治最难问之不能言脉之而不端部苟不辨形察色则其表裡寒热之症未免有差今述诸经云以详其治焉

入门審候歌　　筑形紫色加因由脸弱陽強髮硬柔若是傷寒从足冷要知有熱旺皮求鼻冷更知是疹痘耳冷應知風熱症澤身皆熱是傷寒上熱下冷傷食病

五指稍頭冷痧痘証相得女右男分左分明仔細看

凡小兒三歲已下有病須看女右男左手虎口三關從第一指側看第一節名風關第二節名氣關第三節名命關辨其紋色紫者為熱紅者為寒青者驚風白者有病黑者中惡黃者痢困也若現於氣關為重現於命關則難治矣

三關紋脉之圖



風關卽寅位第一節氣關卽卯位第二節命關卽辰位第三節虎口卽手文處是也

紋形圖魚刺形主驚風發熱口懸針形主傷風痛病及泄瀉痰水字形主食積喘嗽痰瀏亂紋主虫珠形主死曲虫形主痛虫大腸錢積口紋斜向右傷寒七字形傷食中手字形主憩悶双鈎形主傷冷山字形主驚綠紋形主

癸指㇀斜向左主傷風  形如新月向右主氣痛㇇向左者風痛  形如三疊曲者乃傷硬物為病  形如環主吐泻痛痛  或如工下鈎皆為傷冷

五臟見症

一心主驚　實則叫哭發熱飲水而搐虛則欲眠而悸動不安

一肝主風　實則直視大叫呵欠項強頓悶虛則咬牙多欠（氣熱則外生氣濕則內生）

一脾主困　實則困睡食熱飲水虛則吐泻生風

一肺主喘　實則悶乱喘促或渴或無虛則硬氣長出氣

一腎主虛　無精光畏明体膏重惟夜瘡瘡膏溢則変黑箔

急驚

夫急驚者大人為中風小兒為急驚也驚者屬風熱急者屬陰亢乃陽盛而陰虧也蓋肉虧火熱外挾風邪心受熱而積驚肝生風而発熱牙関緊急吐涎嚢視反張搐搦抽動是其候也若服藥潮轉口中逆血兩足攣搖肚腹搐動或撲床哥衣裳脊乳促心中熱痛忽大叫者乃難治之症治者宜清心熱去風痰為要法也

一经治急慢惊风发热口渴手心伏热痰涎上壅咳嗽喘急并宜治之　鳖甲一片炙黄为末调乳汁灌下立醒

一治小儿急惊肺胀喘满胸高气急脑门胀闷乱欲嗽烦渴痰潮声嗄若不急治死在旦夕黑犀牛白犀牛各半生半炒研细取初须末二小大黄煨各二小为末每用五分煎水煎汤调下即愈

一治小儿诸惊风症昏迷搐搦角弓反张灯草蘸油点火烧其颞门及两肩臂之上下如眼上视不下者烧脐之上下如

不省人事者即掐手足心及心之上下如手拳不開口湯上者即掐頂心及兩手心撮口出白沫者即掐口上下及手足心乃治屍之秘法 ○一經治小兒不問急驚慢驚甚效蜈蚣一个擂搗水一盞入蜈蚣于內又用水一椀煎令百沸將藥盞安入椀中隔水煮之候熱將出去滓服即效

一方治小兒疾病諸症雄鼠糞擇取兩頭尖中大者為是燒存性為末水調下立醒

一經治小兒驚風因驚氣吐急逆作搐疼涎壅塞手足掣疼眼

睛斜視只先去穰勻炒豆豉等分為末每服二錢者半
錢湯荷湯調下日三服取效

又傳方黑貓頭燒成灰為末每服半錢用湿湯八滴少許調下
一經治小兒奪甩半下生甩息角等分為末少許吹入鼻
一經治小兒口葉牙閉不開南星一枚煨熟以紙包外壓一小
孔令透氣向口中牙自開也

又傳方雀糞妙為末水煎灌之妙又
一傳治小兒急驚發熱搐喘口張活鹿葉酸漿草共搗烟入水

少許放取汁灌之又以滓塗按遍身及頂門即蘇

又經方蚤泳一炒白芥子一炒等分為末每服三分至一小兒大小約量用一生姜三片茄荷八九葉水煎湯調下大效

又經方大蒜五根先以火燒地上一處令紅以蒜磨于熱地如齊用姜蚤五个去首足安于蒜上以碗蓋覆之勿令洩氣一夜將出取蚤研末納鼻中口含水甚效

又經方田螺殼用多年者燒灰入麝香少許同研末調溫湯灌之即醒

○一經治小兒乖戾啼哭似有痛處不知痛狀

雄鷄血刺取少許滴入口中即安

一經治小兒驚痫搐搦不能言南星以湿紙包煨熟為末雄猪肝猪渴取汁調下逐愈

慢驚

夫慢驚先有外感风寒内傷乳食而作或吐泻後病過服吐下致令脾胃兩虚遂成此病矣其為病也吐泻無度目偏喜閉疾滯咽喉如痰鼾声状口鼻氣冷唇皆面青涎流口角将發癎是也大率急驚屬陽陽強而陰弱慢驚屬陰陰盛而陽虚

治宜祛风活痰健脾壮胃为要

一经传灸法凡此症乃元气虚损而至昏愦急灸百会穴则活若待下痰不愈而後灸之则元气已散而难救矣

一经治小儿吐泻或服冷药脾虚生风痰慢惊南星一个重八九分去皮先掘黄土一坑深三寸以炭火煅红入好酒半盏安南星在内仍架湿土候南星裂如片再炒熟为末用五月天麻煨熟为末一分麝香一字和匀三岁儿用半分以生姜汤煎汤调下永治久吹恶心

一经治小儿慢惊吾见拘攣者乌梅水磨灌之立醒

又经方只先去穰炒炭豆豉等分为末每服二分引甚者半钱用荆芥煎汤入酒五滴调下日三服取效

慢脾

夫慢脾者属阴冷气太盛阳气极虚为病之至危也其症面赤额汗舌短头低眼合不开腮中搐頰吐舌常喘腥臭口叶牙咬手足微搐不收或身冷或身温而四肢冷卷由慢惊之后吐泻病傳已遍有前本经惟脾所受故有慢脾风若逐先

则无此可证镇惊则无惊可镇但脾闷痰壅塞滞而已

一经傅炎小儿惊风此于乳黑肉上男左女右以艾一小豆状炎之一岁者炎三壮二三岁者炎五七壮神效一炎百会穴尤妙

一经治小儿慢脾风因吐法后而成者黄丹五寸者十条去白朮如指头三块全蝎二个生苗前桑白皮炒乾各为末又以苗前葱汤下二岁以下服一字三岁以下服半钱神效

一经治小儿因久病后或吐法后生惊将成慢脾症全蝎十个捣烂细用石榴一枚剖去心纳蝎于内调无灰酒又盖定

慢火熬梢皮外衣二撚之候減膏取出放冷每服二分用
金銀花苗前煎湯調下自安

疳病

夫疳病者由母養鯉愛餵以甘肥生冷之物飲食無節乳哺不時或禀賦怯弱乳血不足皆致此病蓋十五歲以前為疳病
十五歲以後為勞病其病之狀身体耗瘦氣力短少肚大筋
露皮膚瘡疥或大便泄瀉小便作赤作濁或身熱骨冷
飲食減少是也經分五疳病出五臟其本在脾經一臟若不

早治則傳引諸經變發多症但脾經病去則諸經自安雖病
症分冷熱不同治者當以補益為要

一經治小兒雜病變成疳症長大未白青黃雜劑口爛煩熱髮
焦皮枯眼淡面黃四肢瘦癱鼻孔赤穀道閉青黛每服一分
溫湯研調下神效

一經治小兒疳塊腹大飢瘦面黃漸成疳瘧史君子仁三分木
鱉子仁五分共搗為末水和丸黃眼大每以一丸用鷄子一
个破頂入藥子內飯上蒸熟空心食之日一次甚妙

一方用木鼈子仁史君子仁等分搗爛飯米丸芥子大每服称半匁米飲送下日一二次大良

一經治疳病目瞷不見物木鼈子仁二匁胡黄連一匁為末米糊丸竜眼大入鷄子内蒸熟食之至妙

一經治疳病浮腫墨、犀牛白犀牛各半炒研細取初頭末煉蜜丸青皮各等分為末糊丸緑豆大三氣空服二十丸五六歳加五丸米湯下自消

一經治疳氣攻胃耳聾瘡腫犀牛研細取初頭末一匁猪胃半个

去膜切薄片拌藥末加鹽少許外以濕紙包煨空心食之
一劑治小兒冷痢面黃腹大雖鼠糞大者幸勿去皮腸用粳米
猪粥常食將將 ○一經治小兒久痢休塵不食及諸痢狀後
天柱骨倒痢痛醫不試謂之五敗證矣白菊蕊微炒為末每
服半刂用薄荷煎湯調下神效
又經方蜣螂一个用黃土泥包煨去蕊將出與兒食之見效
一經治小兒痢痛黃瘦骨立須生疳疼蟾蜍於立秋後每取一
个去首腸內以麻油釜之用尾二片一上一下相押炙熟食之

積穢自從大便而下連服五六个月之內形容變好妙不可言 ○一經治小兒疳疾及下痢雜色鷄鴨肉日日多食之即愈此味大補最益

一傳治小兒疳疾飲食不生肌肉日夜啼哭腹脹面黃愛吃泥土石榴根炙君子去殼炒煅研醋調丸乾各一小青黛蜂蜜丸去口是水洗兵郎名昌蒲是鉄器打碎米泔浸晒乾各五小共為末用豬胆汁浸極白九如黍米大每服二十九空心米飲送下即好 ○又經方決明子二兩為末煉蜜和九如青

立大每服一钱加三丸食後特热汤送下大妙

一经治五疳有虫蚀喉一个烧存性研细去蓄尾各三寸炒黄研细洗净去口足各一分入鲮甘半分共为末一二钱每服一二分午时热汤送下又用苦楝枝赤枝水煎汤待温洛之更青盖衣覆之见虫出即愈

一经和治小儿虫积者肚腹胀痛口吐清涎是其候也由於受蓄甘肥而生此虫也或不急治日久乃成疳积肚大肢瘦筋露面黄罹矣史君子三四枚或以敲水煎嗽下或为末五更

未飲調服一刂次日出蛰下死忌飲熱茶湯犯之則活

一經治小兒蚘虫咬心痛面青吐涎將死或有虫形如蜈牛食下部痒者蕪荑多搽水煮烟去滓再熬成膏飢服一盞虫尽下也

一經治小兒蚘病羸瘦猪膏空心服一鐘即效

又傳方鼷頭一个燒灰為末敷下门其虫尽出

又傳方苦楝子取肉為丸納肛门其虫自出

又傳方艾葉一大把洗淨搗爛入水少許絞取汁空心服之一

長尺其虫尽下而愈 ○又經方慈菇根一把洗淨水一
鉢煎至五分之一空心服之打下虫積
一經治小兒中蠱毒下血欲死者蠱毒生瘡蝕取汁常服之良
一經治小兒中蠱毒腹內堅硬面目青黃筋露脊立桃寄生為末
每用一小調入混湯点服日四五次神效
一傳治小兒有虫腹大身瘦面黃煎炙君子去皮炒黃色苦
練子去外皮肉榧取肉炒各一兩等朴去皮姜汁炒陳皮泡去
白各五分為末用豬胆汁和為丸如小豆大三歲以下服五

九七歲以下服十九十歲以下服十五九空心米飲送下五
痢赤皮湯下寒熱詩荷湯下虫咬心痛艾葉湯下乳積乳結
赤白下痢腹痛下焦腸鳴泄泻水穀不化並用陳皮湯下
一傷治小兒痢虫食積肚大筋青或唇青黯或泄痢五色雜下
並宜服之槐花炒黃史君子去皮炒麝金切片焙乾青黛各
等分為末每服一小半小兒大小用豆豉煎湯下不拘食服

熱症

夫小兒純陽多屬于熱然熱之為病有虛有實之不同實熱則

面红目赤气窒口乾燥渴小便赤涩大便坚闭五心烦热日在焦啼夜日壮热虚热则面白眼青气微口中清冷恍惚神缓大便稀而小便数夜则盗汗是也经分十六热症所主不同大抵热则生火火生风风生痰矣治者随症而择方焉

一经治小儿虚热肾羔劳瘦天门冬膏每用做一小热汤调空心服其方见在补益

一傳治小儿肾羔潮热满食瘦弱猪皮刮取白水煎服 吐涎煽渴咳嗽自安

一经治小儿心热狂语在胆鼻衄竹沥入姜汁少许在服二合即安

一經治小兒壯熱病疾惡痢李葉煎湯浴之大良

一經治小兒搐熱在下身熱狂燥寄迷不食支子仁七枚豆豉五丿水一碗煎至六分服之或吐或不吐亦效

一傳治小兒暑熱連日不解屢與水磨濃頻飲之大效一方如葛根大皮藤木通各等分㕮咀三片水煎不拘時服

又傳方取蔬菜青新草同搗絞取自然汁塗遍身頂上足心乾再塗以涼爲度

一經治小兒發熱不問先熱飲食時行痘疹並宜麻油入葱根

汁少許調搽胸中手足心及頭面頸背等處最能解毒凉肌
一經治小兒煩熱作渴不止生葛根擂取汁砂糖等分每服一
盞量兒大小加之不拘時服大效
又經方石蓮肉二十枚去壳心炒過浮萍二小半生姜二片水
煎三分頓服甚妙。又方葛根五小水煎服效
又方黑豆小猪熏以水飲之以豆食之
又方水一碗生姜一片浸之良久聞出姜味飲之乃止
一經治小兒頭熱鼻塞不通眩弱熏作餅貼顖上日改易即效

一傳治小兒風熱兵郎二分如鷄心者佳犀牛半生半炒甘草
味各等分共為末每服半刂用溫湯調和服乃愈

感冒

夫小兒素稟輕弱臟腑未充皮膚未密故遇四辰不正之氣易
為感染治者宜發散為主

一經治小兒感風或冒寒頭痛鼻塞流涕葱白三根搗爛入糜
米加鹽煎粥熱食取汗愈外用老葱三四根搗爛擦于他人
掌手火上烘溫就病兒身通擦令嫂出汗立愈又不相妨

一經治小兒風寒無蓋子生研末一匙以葱根煎湯調酒少許和服以被汗即愈　○一經治小兒傷寒辰氣桃葉三兩水五升煮十沸取汁稍身拭之日五六次後以兩頭尖三粒燒存性調濕湯服之乃效

一經治辰氣傷寒壯熱一竹葉一葛根搗取汁無鮮葛以葛粉水煎濃各六合入姜汁少許常令嗌下神效

一經治小兒寒熱及熱氣中人猪蹄甲燒用足者燒灰為末每用一撮調乳汁服日二次即愈

又經方豆豉半合去皮一枚去皮水一碗先煎去豆
豉再煎取淸濃服大效

一經治小兒傷寒辰氣病後失音不能言肉桂一丸如手指頭
大舍之良久漸又發声神效

傷食

夫傷食之病起於乳哺不節或已飽又增或乳而繼食食而繼
乳及許以生冷堅硬之物或夜卧不蓋腹自是小兒脾胃怯
弱雖以消化初得成積久則成疳疾可不慎歟宜兒

切莫加飽煖常令一分飢與寒誠金玉之語也若其為病初則頭痛身熱面黃目脏微腹痛脇脹足冷壯熱多臍神煩不思飲食或惡食或惡乳或嘔或噦或口煖酸氣或大便臭或氣短痞悶按之則痛或胃口作痛此皆積為患矣

一經治小兒嘔吐壯熱食少葛根粉二刂水二合調和入銅盞中重湯煑熟以粥飲和食愈

一經治小兒霍乱牛口從乘取一小盃入鹽少許頓服即安

一經治小兒霍乱吐泻噦呃一塊和乳汁飲之大效

一經治小兒嗳膈處每黑豆筆尖為末和乳汁塗母乳頭令兒吮之即止

吐瀉

夫小兒吐法有由臟腑未完那乳易侵兼以乳哺失宜遂生此症大抵傷於胃則吐傷於脾則瀉凡症中有冷有熱有食積三者不同如冷者脾胃虛寒水穀不化小便白而大便青或如糟粕或吐或泻手足厥冷或兼有外感風寒內傷生冷身中不熱不渴者熱者脾胃有濕大便黃而小便赤口乾煩渴

四肢湿痰或吐或泄兼有中暑者食积者饮食失节生冷过多停滞脾胃则吐腹胀发热若吐酸臭若泄臭是也治宜当症投方庶不悞耳

一经治小儿泄泻不止不问寒热二症并治山药炒为末不拘多少入粥食之立止。又方石榴子用皮炙乾水煎空心服立安

一僧治小儿吐泻兵部一枚切片焙乾为末米饮调下而止

又经方藿香生姜竹茹各一小甘草半钱水煎温服大效

又僧方鹿角锉出不乱发烧灰半钱同研米饮调下日三次即

一经治小兒夏天伏暑霍乱吐泻腹服黄芩子研细每沉香煎湯
水磨服甚應

一经治小兒吐乳蛾烟熏在田中者為末每服半匕空心米湯調
下不過二三次即止

一治经小兒或痢或泻大蒜搗爛貼兩足心亦可貼臍中即止

一经治小兒热泻黄柏去皮焙乾為末以粥和為丸如豌豆大每
服十丸空心米飲送下自止

一方用鷄子清心塗之黄柏尤效次尤妙

痢疾

夫小兒痢疾者由內傷飢飽積毒外感寒暑濕以致臟腑不和脾胃受傷遂成此疾再其為病各有所傷之不同凡傷熱則赤傷冷則白傷飢則純下清血傷濕則下如豆汁冷熱相并則赤白雜下若裡急後重而急痛者有火伏也宜細推之一經治痢及疳法日久不安黃蠟一塊如棗子入銅鍋內火燒化以鷄子一枚取心拌調入蜜少許妙熬空心食之神效

又方薔薇根生用洗淨切細水煎濃稍冷服之以愈為度

又经方猪脬除去心膜烧存性为末每服一小匙饮调下又方用服瘦

一经治痢痢欲死羊粪新者一合水二合浸一宿滤取清汁调服半

日始许食雞兔重者不过三服全愈

又经方益母草嫩叶米煮粥食之取效及煎饮代茶

一傳治小兒下痢日久不止蔥须根水煎空心服大妙

一经方徇颈壁烧為末白湯任下神效或一小盏半月随大小

（蒲黄）

一傳治小兒泄痢日夜無度紫粘皮晒乾為末每服半小匙飲調下永安

又经方側柏葉炒過水煮代茶飲之甚效

又方鯉魚一尾燒存性為末每服一刀米飲調下一
又方羚羊角燒為末溫湯調下一刀至二刀
又方車前子紅糀花煎濃空心服大效
一方用車前全草葉搗絞取汁入蜜少許服之乃止
又經方金銀花三分鳳尾根六分草角三分水一碗煎至半分三服
又得方苦瓜搗爛絞取自然汁調蜜半分服之乃效
一經方盤香生搗取汁一升分四服愈
一經治紅痢及葉口田螺搗爛安臍中立效

又方百千料葉炒過水煎濃服之至妙

一方治小兒及大人五色雜痢諸藥不愈白痢米一撮為末蕉葉一枚去皮炮臭葉半握去葉卷共混一搗爛摊作薄片用蕉葉押上下置糯中炭火焙之翻覆令黃熟為度研入大小任食以末前穗炒過水煎為湯調下神效

瘧疾

夫瘧者外感風寒內傷飲食而發也其症一日一發為病淺一日間一日者為深發三日間一日者氣血俱病起于陽發于日而多熱起于

陰者發于夜而多寒然小兒之癎多由於飲食積
滯胃氣此祕旨也

一經治小兒癎疾鹿角鎊出生爲末調乳三分先發服神效

一經治小兒癖癎壯熱不寒黃丹二分蜜水相半和服大效

又經方壯瘧爲末每服一分米飲調下

一經治小兒諸癎不問新久青蒿草五月五日採取晒乾每用一兩枝去皮五片共炒爲末每服一分未發時煖酒調下如夏月加香薷末

痰喘

夫小兒痰喘皆由熱症蓄熱則生火火則生痰痰者火之留也惟火之一種變化非常休囚入非常形靜則伏於脾土動則發於肺金故小兒痰喘乃心火起于肺金或寒邪停在肺胸寒化為熱必生痰喘嗽運工氣肺張鼓韜韜之病治者宜壯水降火消肺祛痰為要道耳

一經治小兒喉中痰壅喘急巴豆一枚去殼研末填包納鼻中男左女右孔痰即塗下神效

一經治小兒痰熱咳嗽鴿糞半下南星等分為末牛胆汁和丙

八胆南星當風處待乾煮餅丸綠豆大每服四五丸姜湯下

一經治小兒痰涎痙癎青魚胆一枚枯礬半分大黃少許用活魚葉水挼濃收前三味磨入潼之又以鷄毛掃在喉中即愈

一得治小兒喘急越王鞭取白血白礬等分同熬成膏用桃仁去皮尖為末入膏中作丸如龍眼核每用一丸含化神效

又得方黨甲燒為末每服一二用不拘多少以葱一把水煎濃去滓調入服之不拘良以愈為度

咳嗽

夫小兒咳嗽者乃肺受火邪而致蓋肺為五臟花蓋其質最清其位最高為呼吸之府故外則風邪易於侵感而則濕熱易於通蒸遂成斯症耳但咳嗽二症不可並行咳謂有声無痰肺受火燥而不清也嗽謂有痰無声脾受濕注而生痰也咳嗽謂有声有痰肺氣傷兼脾動濕也如外感风寒者則鼻塞声重停寒則痎瘧惡寒发熱則焦煩蒸熱受濕則鏖滯停水則胠仲痰飲則咳有痰声痰出咳止火極者咳声不轉面赤痰結肺脹則喘滿氣結息重風痰壅盛則咳至極頻吐乳食其痰俱令方

得少息又或有虛有實則視嗽痰黃之白稀稠而便知又以四季分症春乃上升之氣夏乃火熱之候秋乃濕熱內蒸冬乃氣寒外束以一日分症清晨曰痰火午後曰陰虛宜逐症而引藥苟痰不去久則為蠱悖矣治法風寒宜疏散頑熱宜清利濕者勝之水者泣之痰則豁痰火則降火肺脹宜養血疏肝虛痰壅盛宜去其痰而養胃大凡肺生胃門當順助其氣滌潤肺經調和三焦溫中壯氣則嗽漸愈益胃調則痰不生肺潤則嗽不發治先審明之

一經治小兒暴咳嗽百部根去皮心搗取自然汁入蜜半分煎
成膏含嚥自愈

一經治小兒咳嗽氣促生姜四兩水煎湯浴之效

又經方蜂房洗淨燒為末每服半刀米飲調下或調乳汁灌下

又傳方蝉蛻去翅足趙水洗醫金簪子為末調乳汁服 或水煎並可

又方桃仁去皮尖搗爛每用五刀同白粳米煮粥食之

又方生姜切細用赤蜜煎如膠任意食之大效

又方蒙荊子用四五刀為末水和搽去汁入白粳米煮粥食之妙

又方甘蔗搗爛絞取汁八白投米煮稀食之妙

又方天门冬膏每用做一个調热湯服之甚益膏方見補益门

一經治小兒哮嗽濃血桑根是鉄氣用米泔浸三宿擦去黑皮

去骨取白皮二两糯米五个同炒黄为末每服一个用米飲調下大良

又经方芩根桑白皮支子炒黑各等分水煎不拘辰服

又方槐花微炒荷葉燒乾等分共为末每服一个童便調下即愈

又方猪肺煮熟切片用薑茨仁微炒为末混匀常食乃止

又方乾柿做工煮熟批開每一枚用青黛一个擠入臨卧食之湯荷湯九下神效

一經治痰嗽咳嗽芋根燒存性為末以生豆腐混食三五日即效
或未愈以肥猪肉二三片混食甚效

腹脹

夫腹脹者腹脹如鼓伏狀蓋由脾胃平常氣本虛而攻作寔也
宜分虛實氣血虫食而治之

一經治小兒食積腹脹半夏少許姜猪妙為末酒和丸粟米大每
服二丸姜湯下未應加之或以半下煨為末姜汁調下亦妙

又方蕪菜根一握搗絞取汁一盞調猪膏一盞服之下惡汁即用白

又方独头蒜煨熟去皮用绵包塞下门令气透大肠即愈

一经治小儿腹胀取父母爪甲指烧为末塗乳上令儿吮之效

又方用白米粉白盐等分炒变色以巾包之乘热熨脐上按即消

一经治小儿癥瘕雄鼠大者煮粥常食之见效

客忤

夫客忤者乃小儿初生而犯外人異处忽来及衆人乘馬沾汗或衣服污秽或異物将入而致此症矣其病体微温號哭不绝反侧不

定是也先以李樹皮同芙蓉嚼以津液遍擦身体黑此病者必出旋毛而瘥

一治小兒客忤驚啼伏龍肝二兩半研末鷄子一枚去殼和勻先用桃枝柳枝煎湯洗過方用前藥塗心窩及手足心即愈

一經治卒中客忤石菖蒲搗汁灌之立效

又經方桑根東向者刮取白皮搗爛後取汁灌之效

又方衣魚十个研爛塗乳上吮之入咽即愈亦可用二个塗母手中掩兒臍上吐即愈

又方陳葇二三合水和濾去滓煎溫灌之立安或馬糞湯煮三沸將息風處並效。又方射香少許同乳汁調塗兒口中取效。

又方牛口涎取一小盃灌之即愈一方塗母乳頭令兒吮之立效。

又方取犯人頂上髮十根斷取兒衣帶頭少許同燒為末調乳汁滴兒口中即愈。又方白羌蚕七个去口足炒黃研末用乳汁調下立效。

又方馬齒一丸調水少許絞取汁灌之下咽即愈。

胎熱　以下初生諸症

夫小兒胎熱者生下身熱面赤眼閉口中氣熱焦帝燥渴或二

便不通是也盖因母孕之长饮食热物而致治宜令乳母服药令兒乳之徐又取效不可欲速以凉药救之必致呕吐而成大患也戒之慎之　○一经治小兒胎热方黑豆二两甘草一两灯心七寸淡竹一茎水煎许母服令兒吮之效

胎黄

夫胎黄者生下遍身皆黄如金色身体壮热大便不通小便甚黄乳食不思啼哭不止者由母孕受热而传子焉

一经治小兒发黄皮肉面目皆黄天花粉生捣取汁二合蜜二匕和服

日二次神效無生用枯水煎服

鎖肚

夫鎖肚者由肚中挺毒壅盛結於肚门大小便閉腹脹欲絶者是也一經治濕水令婦人嗽口發咽宪前後心二處腎下一處手足心四處共七處吸至紅赤為度立通不尔無生理

胎鷩

夫胎驚者緣慢脾近似雖分候月內溫壯翻服極搐口咬牙身腰強直腿潮咽吐痰搐鳴啼腮縮顖開或頰赤或面青眼合者

是也蓋由胎母濕氣乘宜食怒撲毒母有所觸胎必感之或外挾凡邪觸傷於胎故子來母乳生下即病此症宜視其面色赤紅鮮碧者可治若黯青黑者不治虎口食指紋曲入內者可治反出外者不治宜解散風邪除毒化痰順氣為要不可作慢脾治而用濕藥者悔之

一經治方全蝎一个以荷葉包炙乾加朱砂麝香各少許共為末每用一分麥門冬去心水煎灌下即效

不乳

夫不乳者謂初生下而不吃乳也要兒初出胎衣其胎始終急以手指拭口中取惡血學令不得嗽下即無他病若拭口不及惡穢入腹則令腹痛乳妳不能吃乳或產母取冷過度胎中受寒皆令兒腹痛也宜用後方治之

一經治小兒不乳雀糞四粒為末水調少許吞下自吃

又方蜘蛛二个去口足炒焦為末調豬膏灌下及抹口中神效

一方調豬乳汁尤效

又方香附荊芥羌蠶蓑荊子荷梗細辛葱白等分同為末調童

便和洗粉額上絶妙 ○又方半口涎筆口及額上大效

撮口

夫撮口者舌強唇青緊口乳喘声啼不出者是也蓋由胎気挟熱凡邪入腑流毒于心脾二経遂成此症矣

一経治方當視其齒齦上有小泡如粟米狀急以青綿或青綿布潤湿水包手指輕輕擦破即開口使安

一経治小兒撮口最喫跳跟燒灰為末先以湿湯洗淨敷之即開後以乳汁調此藥常点兒口中

又方艾葉燒灰填臍中以帛繞束效或用大蒜一片安臍上灸百
壯艾炙之候口中有艾氣即愈
又經方黑豆長莩生搗絞取汁和乳汁灌之大驗
又方雀糞內出子一个研取汁和乳汁灌之甚驗
又方白鳳蚤二个去腸微炒為用麝調塗唇口內或用雲蜈去翅
足炒亦妙。又方衣魚每用二个搗爛塗乳上令兒吮之神效
又方鼠婦搗爛兒水少許絞取汁一蜆殼灌之
又方蜈蚣半五个研爛塗口或加麝少許搗末半分研勻塗之尤效

喋風

夫喋風眼閉口柔啼吉撒小舌上聚肉如栗米狀吮乳不得口吐白沫二便皆通自滿月至百二十日見此名曰喋風凡臍風撮口喋風三者雖派異而同其源治者倣此

一經治法當看兇齒齦肉有点子急以指甲輕又刮破隨用方治

一治小兒口喋身熱竹瀝二合入姜汁少許分三四次溫服即效

又方鷄糞白收取一丸如手指大綿包以水一合煎之分二次服 一法研末調服亦效

又方雀糞為末水丸如麻子溫湯送下二丸即愈

又方牛口涎半杯行行者以器盛取少許灌之大效

一付治小兒噤口不能吃乳如昧二字去足炒焦研末用猪乳汁一小盃和白矾又灌下大效

臍風

夫臍風者多因斷臍為風邪所乘亦或胎元有热毒則生下辰視其臍端硬直定有臍風必自臍發出青筋一道行至肚部生兩盃行至心者必死凡見青筋初發急用灯心蘸香油点灯於青筋頭并盃行不處燎之以截入心之患

一經治方生急全根葉搗爛絞取汁以羌蚕三个研末調塗乳母頭令兒吮之或灌之即開

一經治小兒腎濕或腫赤或出水若不早治則成腎瘡當為末入麝香少許敷之即效

一經治小兒腎腫前荠苨湯洗之又以葱根煨熟切薄片貼之消即

一經治小兒腎風大蒜独頭者切片安臍中以艾炙之覺口中有蒜氣者止

一經治小兒臍腫柱心炙熱熨之日三五次即消

失尿

夫小兒初生不乘者因在胎之長母食糟鹽辛矣等物熱氣流入胎中兒服此氣是以生下肚腹脹腎腫不乘如竟睛之四傍有青黑色及撮口者不可治或熱氣通于膀胱致令小便不出或多遺溺者可採方于後

一經治不乘者葱白切四片乳汁一小盃同煎沸分作四次服即通不吃乳者服之即吃又方鹽安臍中以艾灸于鹽上三五次立通

一經治小兒每晚遺溺不竟燕窠中草燒黑為末空心水調服大效

又方薔薇根洗切每用五小水煎濃調酒半盃夜服效

又經方白紙二張鋪在席下正臥處待其溺下取此紙晒乾燒入水
酒中研勻空心服乃止

夜啼

夫小兒夜啼者乃是邪熱乘于心經而然
一經治方灯花三枚以乳汁調抹兒口或抹母乳頭令吮之
又方尋取無葉竹一株名仙人杖截取三尺置睡處不使人知神驅
又經方用火頭柴一个長四五寸劈平一面以硃砂書卅大杖卅大杖
差来捉神將捉着夜啼鬼打殺不要放急急如律令

又治方蜂退七个用下半截为末前药煎湯八酒少許調下即止

若不信再將上半截依前湯調下服隨後知神仙方法真不易

又方青黛量兒大小二分一分半以水研服之即止

又方黑犀牛一分為末水調空腹上即止

又方井口草鋪席下勻令母知即止

又方白花蛇用服腊每用一隻為末用竹瀝少許調灌之妙

又方白雄鷄用左翼毛二三枝安席下勻令母知神效

又方鷄巢中草安席下勻令母知乃止

一经治小兒驚啼狀如有刺者猬皮三寸燒為末敷乳頭令飲效

又方乱髮燒為末調乳汁灌之立止

又经方明鏡懸於床上踏下即止此物能辟邪故也

中惡

夫小兒中惡者皆犯邪氣卒中惡毒心腹刺痛悶乱欲死者是也甚則淹忽而死此為急速之症可究方治之

一经治小兒無故卒死急向臍入下门及兩鼻孔中令氣通 或吹或吸或搐或

一治小兒魘死勾起尖照勾令人多手搖動急拿牛一隻立在兒上即醒

一经治小儿魁病夜明砂一二个用红绢作囊佩之大妙

一经治小儿中恶卒死小便灌面效次即甦此痧胀法也

又方皂角为末每用如豆大吹入两鼻孔中顷嚏即气通又用管管令人尽力吹入下门气通即活

又经方盐一合水二碗煎至半碗灌之得吐则愈

又方掌颈七个烧灰为末水调灌之即通

天钓

夫小儿天钓者乃潮热之症也

一经治小儿天钓头目仰视痰壅内热蹄踢退去黄冀足洗净用

漿水同焙晒乾為末每用三分水調下逆醒

一經治小兒天鈎柔根東向者刮取白皮搗取汁灌之即愈

又方木魚五个用乳汁和研灌之立甦

口瘡　夫小兒口舌生瘡者由心脾受熱而發也凡口瘡赤則心臟熱黃則脾臟熱白則肺臟熱宜審此調理

一經治小兒口瘡白屑如鵝口南星去皮臍生研醋塗調足心男左女右日一換使脫○一經治小兒唇瘡紫紫覓茶擣汁洗之極良

一經治小兒口瘡甘草皮燒為末敷之甚良

一方白礬裝入五倍子內燒透同研搽之

一經治小兒唇腫系皮刮去粗皮搗爛取汁塗之即愈

一治小兒口瘡白苑蜜炒黃去醬足并外皮為末用醋調塗之效

一經治小兒重齲跳過燒為末以醋塗之即愈

一經治小兒燕口兩角生瘡或唇腫黃煙乱髮燒灰為末二三分水調服及取髮搔之或和豬膏數之大效

一經治小兒口舌生白胎黃連將煮用水一盌調蜜少許豬泥膏黃連灌之又用吳茱萸好醋研如泥塗腳心神效

一經治小兒口瘡鐵墨為末屢常塗之效

又方黃丹二分生寮一男兵和蒸黑以鷄毛掃塗即愈

又方密陀僧為末醋塗調塗之愈則洗去大妙

一方鉄衣水研和塗之而已○一伊治小兒口瘡不能吮乳臙脂膏白蜜各一盞甘草為末二分同煎盡每含少許稍久吞下乾妙

舌病　夫小兒舌病者謂赤舌重舌弄舌舌胎也赤舌乃舌忽腫破而不柔和是脾經實火故也重舌乃舌下忽生肉如小舌是經脾亦實火也弄舌乃露又收收又露乃心脾二經虧損故也

若舒長而收後名吐舌乃心脾積熱也舌胎者舌生白苔苔一層是胎熱所致治宜求其本而投其方白以一藥論耳

一經治重舌薄黃為末竹瀝調塗之大妙

一法用針刺在舌下紫脉漏半分即愈。又方皂角刺燒灰入朴硝少許先以水嗽口即以此藥摻入舌下即出白沫

又方桑根刮取白皮水煎濃塗母乳上令吮之即愈

又方竹瀝入姜汁少許用黃柏磨入吞又治之即愈

又方螳螂一个燒存性為末敷舌上神效

又方魚衣四五个火燒為末塗舌上甚妙

一經治小兒重舌脫退燒灰為末調醋少許塗之即效

又方鹿角鎊出一刀為末塗舌上日三次神效

又方乱髮燒為末半刀數舌上立愈。又方黃丹一豆許安舌下大驗

又方伏龍肝酒和塗之妙。又方烏賊骨燒為末調鷄子心塗之至效

一附方蜂房燒存性為末每服一刀水半碗煎至六分溫服

一經治小兒木舌脫退燒灰為末少許和乳汁灌之立愈

牙痛

夫牙痛者牙根臭爛流涎腮腫是矣由於陽明之

热而然。○一经治口牙急痛若不早治效日即死急须遍敷之

日十次夜四次神效

一经治走马疳蚀透骨穿腮臭烟出血南星一个刻心中空纳雄黄一块以面包火烧候雄黄化开以二壶合定出火毒去面为末入射香少许拂疮即效日即愈

又方五倍子青黛黄柏枯矾等分为末先以盐煎汤漱净以此药掺之

一经治走马牙疳侵蚀口鼻骨脊一个黄土泥包固火煅令乾乾黄连各二钱半青黛一钱射香少许同为末敷之即愈

一经治痈疽腮穿牙落蛀虫一个同鸡子抱脱敲内白皮并蛀虫纳入鸦嘴口内待定用黄土泥包固火煅乾取出为末敷之以愈为度

一经治小儿齿根出血不止竹叶一掐水煎浓入盐少许温含之冷即吐出再含 ○又方五倍子烧存性研敷之

又经方童小便含之冷即放出再含以愈为度

一经治小儿齿根腮痛松叶一把盐一合好酒一盏水一钵煎至半温含良久冷即吐出大效

丹毒 赤游

夫丹毒者忽生赤腫甩熱痒燥腸胃不安胸膈閉滿喉咽腫痛或九竅有血妄行遍身丹毒是也蓋因臟腑積熱九遇寒濕風雨冷熱相搏而發若不急治毒走入痛亦能殺人宜泰其先起處為用藥之準

本草赤白遊痺炙炎熱瘡未藻茶搗傅之摩三分乾即易其效 新地

本草丹毒從首起赤未灰水調塗之

一先從頭起連及遍身如錢赤色名曰星子丹毒枝丫向燒灰為末油塗調之 ○一先從首上起黃赤名曰住火丹蟹土猪槽下土

白礬末生姜汁油調塗之

一渴身並起名蜘蛛丹急尋燒白礬猪槽下土共研調塗之

一先從臍中起名曰胎漏丹伏竜肝多年者佳為末用屋漏水或新汲水或鷄子清心或猪油和泥塗並效乾再塗

一先從頭上循至滿身片片赤色名曰灶顙丹猪槽下土一塊挪枝皮蕊枝皮搗爛調生油塗之

一先從腰起遍身黑色疼痛名曰灶尾丹屋四角茅草燒灰白礬火許用鷄子清心調塗之

一先從右手起引次跟行赤色名曰君灶丹伏龜骨研末油調塗之

一先從左脚起名曰母灶丹猪猶無者用猪肉猪湯調灶灰塗

一先從右脚起連至遍身名曰朱黃丹益屋草用四角每角少許為末和磨刀水塗之

一先從陰上起名曰女灶丹女兒小便土塗灶刮取右邊調塗

一傳治小兒初生面卷紅斑或生于肢体者椰子取汁調搽之立效

一治小兒丹毒從兩股走入陰頭李根燒為末以田中水和塗效

一治小兒头丹熱如火遠臍者緩治殺人馬齒莧生搗塗之神效

一经治小兒丹腫片片紅腫因内熱遇風或陰氣搏而得只宜切片細水煎濃多採塗之即消　一经方鉄一塊燒紅淬入水三次飲一杯而已

一经治小兒癍疹入腹身腫舌強蚤沙二合水二碗煎沸去滓就溫洗立愈　一经治小兒熱丹蓋燃救之即消

一得治小兒赤遊身体浮腫小便不通高情根刮取白皮焙乾為末糊丸如菉豆大九服一二三九量兒大小用熱湯送服立尽腫退便通

一治小兒丹毒麻油塗之即愈　又方黑豆水煑濃塗之大效

又方綠豆五升大黄二升為末用生苗荷汁無者用枯苗荷煎濃湯

八審調之甚妙　又經方胡荽搗汁塗之立瘥

一經治小兒丹頭椰葉多用水煮濃淋洗亦妙日七八度即效

本草身面丹腫如瓜狀者以雨滴階下苔痕花水塗瓜頭上即愈

一經治小兒火丹桑根皮刮去黃水煮濃洗之效

又方鯉魚血塗之立瘥　又方豬肉生切片貼之即消

一經治小兒斑疹乱髮燒灰為末水服調一二刀乃愈

一得治小兒及大人全身丹腫五靡葉洁處葉等分酸漿水葉半分

同搗爛入鹽少許絞取汁飲之以滓塗外盡效

一傳治大人小兒十二症丹腫茉莉葉牡丹葉五加葉治疮葉羊蓬葉魚腥菜血樹葉羊坦葉改校葉茶抓葉楸葉各十分鬼箭葉三表冬瓜三片禹餘糧三片共搗爛水調絞取汁飲之以滓擦患處更乳步如烟即愈

喉痺

夫小兒喉痺者乃喉中腫痛嚥吞苦疼矣然兩傍腫者為双乳蛾則易治一傍腫者為单乳蛾則難治又乳蛾差小者為喉痺熱結於咽喉耳痛耳痒腫遠於外者為纏喉風宜炤方施治

一經治喉痺乳蛾乳絕者即辰灰活用巴豆一粒去壳打碎納入蚕壳内塞于单孔如单乳蛾痛左边寒左孔右边塞右边若双乳蛾则作二个塞二孔神效

一治小兒喉痺腫痛跳退燒存性為末每用三四分調乳汁灌之入咽即愈

又附方蜂房燒灰為末和乳汁一个灌之或已灶用米飲調下效

一傳治小兒猴閉鯉魚胆汁伏竜肝和勻令小人手指蘸入喉中即愈

一傳治方綠放葉洗淨搗爛入鹽少許絞取汁含之稍久嗌下又以滓外塗神效

眼疾

夫小兒眼目浮腫赤痛者乃工焦火盛故也宜煩方治之

一經治初生目閉由胎中受熱也熊胆少許水一盞滴湯煎化日七次点之乃佳

一經治嬰兒目澁不開草歷子為末調豬胆汁粉額上神效

一經治小兒目赤作痛車前葉搗絞取汁調硼砂為之見效

一經治小兒眼翳迷花或白膜賁睛或淚流難開甘菊花三百朵剔去蒂細末炒米糊丸梧

子大每服四五十丸空心白湯送下常服清頭目大狀
一經治小兒雀目至晚則不見物夜明沙水淘去塵炒乾為末以豬
胆汁和為丸如綠豆大每服五丸高粱米飲送下神效
又方羊肝一片同鬱仁角子二个炙
熟食米飲調下　又方地膚子蓋研三兩決明子七錢為末
米飲和丸梔子大每服三十丸食遠白湯送下久久自愈

瘡癤　瘡疥附

夫小兒頭瘡疔癤者皆屬于胎垢留熱矣宜妬方治之

一经治小兒疔瘡初發優樓樹孤樹白血推紙貼瘡処即消

一傳治小兒疔瘡或痘後結毒及大人疔瘡初起鶴蝨草用葉入竜腦少許搗爛調鵝羽清心作片數之乾再易不過三四次即消

朝数暮消暮数朝散其功甚速

一经治小兒胎生瘡瘍并疥疥涂其四圍甚妙

又经治瘰癧在壁流上多年者拾取燒灰烏竜尾等分為末油調塗之

又経方服蟾蜍剥取皮貼之能收毒氣而消愈

一经治小兒疔瘡已軟不潰以竜大者一个去穰石上磨平口以糊

抹旋口粘瘡上自退出膿血不更無疤也

一經治小兒身体發瘡初出甚小後有濃汁浸淫不已日漸連大各浸淫瘡從頭連下者易愈從四肢向頭面者難治鯽魚一尾長三四寸者豆豉一合共搗如泥塗之乃愈

又經方一晚退燒五六一時彦妙五六棵上塵三六共為末油調塗之即已

一傳治小兒頭瘡或遍身瘡爛膿汁浸淫者蟾蜍一个破開膿一把坐檀一片各燒存性每味二分研退無老子各燒存性每味一分用麻油或清油混勻熱熱塗之至妙一方有乳發毒菜名鴨甲菜

子先並燒灰無鹽毛

一經治小兒煙瘡初起膠漿似大瘡者桃仁搗爛敷之即效

一經治小兒惡瘡皂角為末用麻油調敷即愈

一經治小兒濕癬蔥樹刮取青皮為末和腊塗之即愈

又傳方蛇床子研末和豬膏塗之

一傳治小兒瘡疥優檀嫩葉搗爛拎之即乾落即愈

又傳方鷄骨燒灰百草霜同研末調油塗之即愈

又傳方摩朴葉一大把水煎濃熱薰洗效

又经方艾叶烧灰敷之大效

一经治小儿头面肢体疮癣麻油一两用小竹烧存猪肥汁一枚和匀
頭又塗之二三百即愈

一经治小儿头疮面疮月蚀诸疮蛇退烧灰为末腊猪膏和塗
之甚效　一方昭明鳖烧灰和腊猪膏塗之

又傳方青豆枯礬黄丹炒焦各等分同研末敷之

一治頭瘡及瘡疥浸淫黄爛塗蝕等症並母以猪漉洗敷次效

又傳方伏龙肝乱髮烧灰等分和猪膏塗之

又傳方陳皮燒為末數之良愈　又方扶老葉晒乾燒灰為末又用扶老葉水煎濃洗拿以末敷之立乾即愈

一傳治小兒頭瘡臭爛及魚口瘡燉雄腰腸鷄子不拘多少取紅心入鍋中火熬焦取油調松脂塗之一方用乱髮燒存性研調鷄子油塗之一傳治小兒頭瘡及遍身瘡疥父以親小便去首尾卵夜擦已良以冷水洗之不過三日見效

一經治小兒頭瘡實即水瘡濃晒乾成粉初取油調塗之神效

又方松脂五分豬膏一兩熬化擦之日攻次攻日即愈

又方松脂二两黄蜡一两半铜锅一口麻油一两半文武火熬收贮瓶用
摊于纸上粘之神效　又方黑豆炒存性为末水调敷之效
又方羊粪水煎洗净又以羊粪烧灰乌龟尾同为末调清油筹之妙
又方田螺烧存性为末清油调筹之即愈
又方石菖蒲为末油调频频筹之效
又方乌龟尾和泥烧以皂角煎汤洗净筹之效
又方只笑烧灰为末用猪膏调筹之效
一经治颈疮诸方不效者败鼓皮一片烧为末用米糕烧冰内服

油等前菜先以蕉葉水搽極濃洗擦瘡処令淨滲乾次菜敷之效

一傳治小兒耳瘡馬骨燒灰為末敷之　又方鼈甲炙燒灰為末敷之

一傳治小兒頭瘡及牛馬瘡疥並效蟾蜍貴者一个柳彥樹工自瘡枯者各半分用燒為末用猪油調塗之大效

一經治小兒頭瘡及白禿者馬齒莧多用入大鍋水煎取濃汁熬膏塗之或燒灰調豬膏塗之神效

又方杏仁燒為末敷之即愈　又方烏梅燒為末油和塗之效

一經治小兒白禿頭上圈又白色大蒜擦烟日日擦之效

又方蜈蚣一个盐少許清油一盃浸七日取油釜之極效

又方苦菜燒為末先以鹽湯洗淨敷之效

又方虎骨為末和油釜之至骭　又方鷄子先抱出者尤效

一治小兒胎肥及為先者皂角燒為末以諸苦菜洗淨敷之絶效

一治小兒吸大人赤先頭瘡出濃昼閉夜合馬蹄甲燒為末用清油調敷之效

一治小兒肾瘡煙痛出血流濃水跳取皮一條燒灰為末油調釜之神效

一治小兒胡瘡生於面耳白粉末搽細研辰數之不過三四次即愈

一治頭瘡出蛆皮肉辰有蛆出綠衣葉擂汁拭之蛆出尽抱

病氣　下附痢

夫病氣者謂陰囊腫痛下痢者主莖生瘡腫痛是也由於寒邪所襲而然其治後方應療

一治小兒病氣偏墜疼痛烏藥二ヲ香附米八ヲ炒去皮各一ヲ
空心鹽湯調下　又方槐子炒末每服一ヲ入鹽三分黃酒調下之效
又方茴仁炒香搗爛調酒服以澤瘡之神效

一經治小兒囊腫辨說五ヲ去口足洗淨水一碗煎湯洗冷再煎湯洗
用前末未通車前子炒心等分水煎服

又方治阳明热以苗荷生捣取汁无生用乾水煎取汁调服治频上堂之即消

又方猪囊调水和治猪蒸猪包缚腰痛即平

又治治阳明鸡子清心和研和治先用葱根煎汤漫洗后堂之

一经治小兒生疮疡囊疼痛川椒荆芥槐枝柳枝治枣子煎汤漫洗后用朴硝鸡子清心敷之即愈

一治小兒阳明经风热温气相搏玉茎或阴囊忽胜或痛壮 瘕大癥为末热仁等分以津液调研和治敷之神效

一经治小兒玉茎胜痛由小肠气引牛必根连茎叶水一盅入酒少

許同煎服愈　○一治小兒陰下生瘡膿汁不已紫苏葉水煎濯後洗及為末敷之大效　又方烏賊骨刮末敷之立乾

一經治小兒陰瘡猫頭骨燒灰敷之立愈

脫肛　　脊附

夫小兒脫肛者下門大腸頭出而不收是也蓋因久患法痢氣虛乏而不能升提乃成此病矣可炤後方治救

一經治方葱根煎湯乘熱薰之又洗令柔軟以手送上或以五倍子為末敷之後又送上或以五倍子煎湯洗之亦效

又方鷺頭燒存性調香油數之一方以鷺頭燒烟薰之久久自收又以

綠豆土煎湯先薰後洗神效

又方剃荒皂角筆分煎湯洗之又以鉄漿塗之神效

又方魚腥草搗爛洗以井硝水洗通用芭蕉葉鋪魚腥草于上坐之自入

一經治大腸脫肛烏龍尾鼠糞等分同燒烟于桶當內坐上薰之效次即收

又方浮萍紫背者佳搗擂貼之即收　又方革齊子仁一男搗爛作餅

子粘額角候收工即去粘藥水洗之大效

一治小兒五疳不論新久以真檄炒為末煉蜜丸如梧子大每服

二三十九道兒大小空心米飲下即愈

便閉　夫小兒大便不通者有虛有風有濕有火有寒有氣結之故小便不通者系腎應于心心火盛則小腸結熱熱微則小便雖熱甚則小便閉故也常從類對方療之

一經治小兒初生二三日二便不出葱根搗取汁一分乳汁一分調抹口中

同乳吮下即通

一治小兒初生二便不通麻油一點入皮硝少許同煎濃待冷稍大蘸入口中服下便通

一治小兒二便不通服服飲乳者令人以溫水洗數口學用口吸咂兒心前後二

延膈下一延手足心四延每次吸咂五次令紅赤為度須更自
通不尔則無生理

又方急向連鬚葉一根生姜一塊豆豉二十粒搗一小丸用湿指頭作餅炙
熱納臍中用綿向包住良久氣透自通未通再換一餅神效

一方有豆豉一合田螺十九个蔥一把無生姜豆豉
又方蛾蜘蛛七月間尋取半蠹中不拘多少用綠豆烟乾收貯臨用
全性一个置掌垛上面吹入鼻内乾研末次新汲水調下如二便俱閉全
用一个大便閉用上半截小便閉用下半截其效如神

又經方蜂房燒為末每服半匕一日進兒大小酒水相半為湯調下日三服效

一治小兒初生不乳人乳二三合急取一寸煎沸分作四服大效

一經治初生尿溺不通事前草搗絞取汁入蜜少許灌之立通

一經治小兒小便不通小腹脹急葵子二分水通一分共為末每服一匕

水煎服以通為度　又方吳麻仁燒灰酒調服通快

又方葵菜子不拘多少炒令黃研末溫酒調服立通

一經治小兒大便秘澁只宜煖吉穰甘草各一片水煎服取效

腫脹

夫小兒腫脹者其病有二曰氣腫曰水腫凡

氣腫者脾胃虛弱蓋脾主肌肉肺主皮膚土弱則不能生金肺金受虛而傳於通身上下皆浮腫矣治宜調脾行氣為要水腫者因上焦煩渴引飲過多而致蓋脾虛不能約制其水水乃能傷主冲決乱行上冲于肺流走於皮膚而光腫矣治宜寬脾利水為要

一經治小兒腫病二使不利黑牽牛白牽牛各一兩為末臨卧先須末以井花水和先服三分之一次每服二十丸用紫菊子煎湯送下

一方加陳皮青皮炒各等分

一經治小兒鹿腫頭面陰囊俱浮史君子一月去壳為五分釜史君子炙冬葵為末每用一分食後米湯下即效

一經治小兒腹脹水氣流腫膀胱脫窘熱小便赤澁雄牛生研一勺以青皮煎湯空心調下一方加木香半分為末乾服並效

一經治小兒浮腫綠衣灯心煎湯濃汁服并洗之即消安

一傳治小兒頭身水腫香附末砂仁炒過等分水煎服盡有驗

腎癆

夫小兒腎中生癆膿汁淋漓不乾或突腫者由初生時剪臍頭外傷風邪而致用等方療之

一經治小兒臍傷不愈蜂房燒灰為末敷之神效

又方燒骰甘草等分同矣並為末傳之即乾

又方燒除一名燒灰為末敷之甚驗又方蒼耳草燒灰研末敷之

又方伏龍肝為末敷之即乾或東壁土亦效

又方蛩虫燒灰存性為末敷之而已又方蜂房燒灰搽上麝和研敷之　又方馬齒莧燒灰敷之神效

又方豆豉一合壁五片滴水少許搗如泥作餅圈圍上矣熏熨之冷再炙效　○一經治小兒臍腫腫柱枝一片去粗皮炭上炙熱

長常莫之以消為度

解顱　夫小兒解顱者生來顖門不合也蓋腎臟虛
弱不能填髓生骨令兒色脂白肢体消瘦宜媚方治之
一經方跪退燒為末以豬脊髓相和塗之日三次易見效
又經方紅雄鷄刺取冠上血塗脳處又用赤苔菜為末數日一次妙
又方黄狗頭骨火上炙黄為末用鷄子清心和塗日三次甚妙

諸遠

夫諸遠者謂行遠語遠蚤遠髮遠凡遠限度
而未能者謂之遠蓋行者屬肝肾肝主筋肾主骨肝肾虛弱

而未能行語者屬心心主舌心虛而未能語舌屬腎腎虛而未能發髮屬血血虛而髮未能生各從其經通其類而充補之耳

一經 治小兒髮延久看方二月水一壹盞煎濃入豬膏調白日日塗之即生

又方 鯽魚全性燒灰為末調漿塗之

一經治小兒四五歲而未能語者赤小豆為末調酒頻塗舌下神效

又方百舌鳥去毛治瘖失音許食之天效

一經治小兒齒延不生或落而不生黑豆十四粒納于棗中一日食將出每用一粒去皮搽之如齒落處揩入日三易即生大效

一經治齒折多筭不生鼠骨為末摩之甚效

一經治小兒行遲五加皮木瓜等分共為末每服半匙空心酒湯調下

又方用塗衆未開口者辰巳食集餉之三日便起行

鼻胸　夫鼻胸者胸前凸起如鼻形也蓋由肺熱脹滿攻於胸膈或由乳母多食熱物及伍辛之類轉受胸起高突遂成此症矣　○一經治方鼻系頭又点其骨節自愈其取鼻系法先以蓮葉安置鼻于上以明鏡照之其系自出

鼻背　夫小兒鼻背者背後曲弯也只由初生不謹

致風邪客入肾脊浸湊骨髓遂成此症矣

一經方竟煎骨節自愈　　服竟療法見前

又方何首烏為末用竟承調塗肾上骨節久久自平

滯瞤　　夫滯瞤者乃瞤閙流涎出而潰也凡涎者脾之液脾胃冷熱不平故涎自流不能收約也治當温脾為主

一經治辯瞤脫白不能取止南星為末姜汁調塗兩頰一夜即止

一經治有痰流涎皂角椒二小半裹姜湯泡七次五分共為末用姜汁和丸如麻子大每服五丸温水送下神效

一經治小兒流涎牛涎常釜口中及頤上即愈

一經治小兒脾熱流涎鹿角鎊出為末每服三分米飲調下即止

又方桑白皮擣取汁釜之即愈

顳頷

夫小兒顳頷者臟腑有熱渴飲水漿致生法痢久則氣血虛弱不能上交腦骨故顳頷下如坑不得平滿也

一經治黃狗頭骨炙黃為末用鷄子清心調釜之即合

一經治顳頷不合牽塞不通南星炮去皮為末濕醋釜熨貼之以手炙熱常熨之立效

顖填

夫顖填者顖門腫起也蓋脾主肌肉因乳食不節飢飽乖宜或寒或熱暴于脾經故使臟腑不調其氣上衝謂之填脹顖突而高如物堆塚毛髮起黃自汗是也如寒氣上衝則堅硬熱氣上衝則柔軟其治者寒當溫之熱當凉之

量兒大小制分輕重

一治小兒生下顖腫黃柏為末水調足心自消

瘡疹門

夫瘡疹緣於熱毒而致蓋小兒在胎之長感其穢毒而致之氣

或父母精血之虧或胎火胎毒或受此熱氣傳入胞胎之中故其生來常病此等乃生是症惟發展有遠近不同輕重差別若值寒暄不正之候則瘡疹隨此邪氣而發大凡所發之症有因外感風而得者有因內傷飲食而得者有症氣傳染而得者有撲跌驚恐而得者係初起未見紅点發熱煩燥瞼赤唇紅頭疼身痛作寒作熱噴嚏咳吹咳嗽與傷寒感冒相似但身熱未明者宜服散邪敗毒之藥以疎輕之

一凡小兒未出痘但尚微幼及羸弱至長人多發痘者宜作此等

方以断药之或有出亦稀粒尔

一预解痘方若天气暄煖恐发痘疮服此不发痘疮亦轻麻油一盅水一盅煎倾油内以柳枝搅匀每服一匙长幼二三匙临卧服服四五次大便快利妙

又经方绿豆赤小豆黑大豆各半斤甘草一两水四斤煮极烂任意食之连七日乃止

又方绿矾藤於五六月採取卷攒阴乾至正月冷名疸子将以二两半煎汤父母只令一人知得温沐浴小儿身体上下以去毒热永不出痘苗

出亦少也　又方鯉魚大黑者一尾小者二三尾於除夕黃昏長取魚水猪湯洛兒遍身七竅俱到勾可嫌腥若不信但留一手不洗至過出痘此手要審乃神方不可輕也

又方鸛鳥胆一个取汁用水調者服之永不出痘或出亦效

又方泉鳩白色者於冷夕居取一裏取活或受令兒食之仍以猪湯洛之則出痘稀少

又方木犀花取葉水煎多年初年宜服代茶及洛之大妙

又方鯽魚一尾去腸鱗勾犯水取胡荽搗細入鹽少許調魚腸內用

湿纸重又包外炭火煨熟捣烂去火毒共究食亦尽其须者埋土内
又方主毒一条乌鸡子一个开一穴入主毒于内湿纸重包入饭锅上蒸熟
共究食之每岁立春日食一枚及邻近发瘟作食之至妙
又方蝉退研末退风退即鸡子花出白亮似退即父母剪食甲各等分共
一处新坛上焙乾为末婴孩为丸如绿豆大每至除夕一服三年
三服永不出瘟名曰脱丹
又传方小田螺连壳煨糯叶青二相叶各半分捣末调清
水去滓每日洛之至妙

發熱三日痴用藥

一經治辰行發痘見小究初發熱疑似之際急用清火解表使痘
輕疎綠小豆赤小豆黑大豆水煎熹食豆飲汁神效

又方葛根紫蘇等分甘草半分水煎溫服

又方梔子茅根紫苏葛根各等分甘草半分生姜三片水煎服

又方胡荽菜一把滴一鐘搗爛令人吸吹滴噴兒通身汗發家廉亦可霜基妙

又方梅花脳乾為末煉蜜丸如梧子大量兒大小一歲起服五丸
效每歲加三丸溫水送下日三次

一傳治小兒發熱痘尚未發沐之輕稀連竟葉僂樓葉水煎菜

小田螺各等分搗爛調清水沐之即不發或發亦輕

又傳方棠梂葉水煎濃急沐之即不發或發亦輕

一九痘初發至落痂宜以綠衣老菜脚乾每用五个灯心一小水煎為

放標三日期用藥

一凡發熱之辰見生紅点如蚊蚊者即以紅作小條蘸油燃之平照眼角及鼻边右照左兒左照右兒看其皮中有之可指或赤或紫或塊或点了然明白如兒浮于皮外肉內無根則是痧疹若

肉内湿根则是疮疡急用方清解之

一傳治痘初發辰王甬生等蓮優櫻葉香麥葉桑葉枝
掌蒲公英鴨掌草生水中者各搗爛調清水去滓噴肢体各
処露又如露日二次甚妙此方身暴熱痘紫色者宜用平常
分用

一經治痘毒熱甚恍惚土壹寸條掣細大田螺二十个同浸入
水一昧去滓服之

一傳治痘發過三日而熱尚未退宜解熱催痘則病自平葛根
青蒿薄葉茅根各等分甘草節半分生姜三片水煎服一方加支子柒

一傳治瘡瘡久生癰疼不通葛根只宪去穰炒各二分研退去滓是
晚空心糯米百粒同作剉水一盌煎分三服不拘長
一治瘡瘡熱氣口乾如烟而作渴者紅花煎湯飲之無花用子搗烟水煎亦效
一治疼瘡生不快此藥能解毒消膿定痛下氣氣勻則瘡生亦勻無
葡花水煎長又飲之大妙無花用子生研調水服妙
又方青蒿根一男甘草二分為末每服半分或一分取鷄冠血二三点同温
酒少許調下神效　又方綠依取近帶三寸連皮子燒存性為
末入猪油服之即發重者令輕輕者令愈

又方胡荽二两切洗以酒一大盏煎沸以物盖上勾令地气候冷去胡荽以酒喷之微以和霜状从头至足令遍勾喷头面

起胀三日期用药

一经治疮出起胀期宜和赐汤使解毒气易贯脓也荆芥葱豉各一分甘草节半分精糯米百粒生姜三片水煎服

一经治疮已起胀期遇毒气而伏屬着橄榄核截断为二水煎服少许

一经治疮疹倒陷毒气壅遏於裡则為便也急膳不省醒其法甚惠鸡子壳以抱出者去内白膜用新瓶煅為末每服半分热酒下立起

一经治痘愈所遇风寒外袭倒靥不起者此方服之万无一失荷叶霜
后败水紫菊者矣乾白菊花亦可用
胡荽水煎汤调下立起快活
又方石灰火烧通红投醋水盆中置房门外闻气则胀足
一经治痘出而倒靥或变色黑唇口冰冷危笃者狗蝇七个研细
和酒少许调服即发红活真起死回生第也
一治痘出不快或黑陷口渴荔枝干先水煎浓饮神效
一治痘靥发搔黑陷者疏脐一块煎汤服之或冰熬成膏点水酒

少許調服即快發易落也

一經治疹瘡不快黑陷者人牙一二个以每服藏之外以泥土包固火煅為末用雄豬血調下或用服寒涼之藥血滿而倒陷者入麝香少許水酒調服其效如神

膿三日期用藥

傷治瘡瘡膿期宜服排膿托裡湯使膿漿充滿而易收無生肌症前參紅花子搗破金銀花忍冬藤優檀葉等分甘草半分生姜三片水煎服如膿漿不滿加糖米一撮。又方糖米粥常飲大好

一傳治瘡瘡膿將愈不充滿者蚕蛹男七个女九个糯米一合同煮粥日分三服立長充滿真仙藥也

又傳方水楊柳葉忍冬藤赤小豆同煎湯待溫徹洗噴患遍身日三次功效如神

一經治瘡不潰膿皮薄虛浮者扶錦藤葉金恨花等分水煎濃待溫徹洗噴之日三次見充孝為度

一經治瘡瘡皮黑穿山甲蛤粉炒黃去蛤粉為末每服五分入麝香每歲加一粒用酒調下立見紅色功效如神

一治瘡瘍黑陷雄豬心中血一分竜腦一分研勻調酒服須臾紅活甚捷如用臘月豬心血淨罷收乾之尤妙

一法用猪尾血入竜腦少許水調服並效

收靨三日期用藥

一經治瘡疹不收象牙刮取末銅銚炒黃紅色為末每服七八分兒大者一匕白湯調下神效

一治瘡過期不收靨穿山甲燒為末麝香少許水調塗立靨

一治瘡瘡疼痛蜂蜜用鳥毛塗之大效名百花膏用

一治瘡瘡潰爛不收白蠟壳哥取土墻中多年者佳洗淨火燒為末敷之立乾

一經治瘡瘡痛觸膿水不絕蒲壳以出蚘者進瘡多少用生礬為末納于蒲中合滿置瓶上矣枯為末敷之甚效

一經治瘡屬之時熱毒太甚或遇凡邪毒氣令瘡瘡潰爛者敗草一味乃益屋墻茅草多年經之氣霜露者佳多取為極末敷之或甚者撒于牀席一宿則乾收自落。一方黑豆研作粉敷之

一治瘡瘡爛臭生蛆蟲老紫菜經霜者 佳茄荷葉分水煎

濃洗之其出自去或先用艾燒熏後洗尤妙

又方赤葉嫩者採取鋪席上以之阻不出而愈

一傳治瘡膿水落苟荊芥大葱葉菊金青枣澤蘭無患葉水煮洛之　又方紫花葉一大把水煎濃日日洛之大妙

落痂三日期用葉

一治瘡瘡結痂不落成斑痕者馬齒莧搗取自然汁猪膏蜂蜜等分用熬成膏頻頻塗之瘡痂即落好肌即生

瘡中雜瘡用葉

一治痘出火觸于胃令乾嘔者竹葉三十片灯心三十條水一碗煎
沸待溫常服大好
一傳治痘毒內攻心痛前胡根葉一把切細水一鉢煎至半待凉調
葛粉二服之即安
一治痘瘡正氣不調腹脹不能食藿香香附等分同為末用熱
湯待溫調下一二錢立安
一治痘發咽痛綠依葉洗淨搗爛入鹽少許湯入喉中即愈
又方鵝黃草洁底葉甘草水煎湯徐徐呷下少許神效或每日常

服少許治其未萌亦可

一傳治瘡癤疼燥失声梅樹根一把洗淨打破水一昧煎至半盃空
呷下即清亮矣

一治瘡癤頻喘小便不利灯心一把鱉甲二両水一斗半煎至半分二服
愈

一治瘡癤法用逐毫菜荔枝皮車前子炒各等分加煎空心服通止
又方車前連根葉逐毫菜鳳尾草等分水煎服類法加荔枝皮炒
赤用加苗根茅根白用如敗荷葉

一治瘡癤熱氣不退小便黃赤或

車前子茅根赤通灯心各

导矢水煎效　　每每煎入服之至尽

一治瘡瘡前後痒蹄退二十一个去當足洗淨　矣导矢水煎止服

又方茗茶宜烧烟常置于房中熏之

又方野羊根切五寸片水煮調蜜少許酬藥乾又掃过立止足鷄毛能動尾

又方茵陳莽导分同為末紙捲如手指大熏瘡処乃安外用鵝毛掃痒処以止為度

一得治小兒瘡瘡忽生咬牙人牙豬牙犬牙用井水煎服大效

瘡後雜症用藥

一经方治瘡入目白矾子為末水和釜心足引毒歸下令不入目妙

一治瘡後目漲天花粉跑退毒分洗淨癌乾研末羊肝切開入藥在內以米泔煮熟切食旬餘即愈

一傳治瘡後白膜貫睛黃藤根切細隔水煮濃一杯將出待溫用黃蠟血滴入三四点生磨膏入少許每常点下必效

一經治瘡入眼生翳障桑螵蛸矢令焦為末入射香少許米泔調下每服一个初下神效

又方蜱退洗淨去嘴足白菊花等分每服二三个水一碗煎至六七分調麝少許溫服愈

又方蓽茇為末取少許吹入鼻中三五次效

又方猪蹄甲灰燒為末湯水浸持瘡濃淨洗之至妙

一經治瘡生鬚半年以上者可治久者不治猪懸蹄甲細尾鼈肉
妬裏共服三月蹄退去須足洗淨一月矣羊每副細一个共為末
兔每滿一字以二歲以上三个用溫湯調服日三次至妙

一伴治瘡後遍身拖生瘡瘕末搗末成粉敷之立乾

又方羊糞燒存性研末和清油塗之妙

一治瘡後瘡毒潰爛不收螺螄殼在洗壁上多年者洗淨燒為末敷之

又方荔枝核水磨和泥晒乾為末和粉扑之或磨水釜之甚效

一治瘡後生癮毒赤小豆為末以鷄子清心調勻頻釜之即散

又方黑大豆赤小豆綠豆等分為末醋調頻釜之即消

一傳治小兒瘡後餘毒結成疔瘡初起者鵝蛋單葉摘烟入竈脚少許用鷄子清心調作餅敷上乾而易不過二四次即善散

又方荊芥金銀花忍冬藤牛蒡各等分剉煎服外用前三豆散敷之

又方馬齒莧擂取自然汁入猪膏半分熬成膏搽之立消

一傳治瘡後不瘡不膿不痒忽然手足指甲腫鷄子去殼

取仁水煮澄用服掌研末要之和匀再鸡毛蘸再延日十
餘次逆断伸舒神效
一傳治小兒身上忽然發水泡服掌一把洗淨水一碗煎至半共服一二
口又以此水塗抹即乾而落

麻疹

夫謂麻疹者疹出如麻成聚痘出如痘成粒皆以形而成也
凡胎毒根原文論一也但痘出於五臟臟屬陰陰主血故痘有形
而有粒其症有熱有寒疹出於六腑腑屬陽陽主氣故有形而

無論其症寒熱而無寒化為症既異則治法亦殊症宜內寒可用補劑疹忌內寒只宜解散惟初發表畧相似耳既出之後症則補氣以生血疹則補陰以制陽此其大法矣又如疹發之初多似傷風惟疹則咳嗽噴嚏鼻流清涕眼胞微腫合淚汪汪面目浮腫双腮紅赤憂心乾嘔為疹候矣但見此狀便宜證　　葛曜之味用葉以散表之使皮膚通暢腠理開而疹毒易出矣

一經治療稍不正人多發赤疹初得身熱頭痛咳嗽拿塞疑似之間可服

此方感风寒者即清热散邪发寒疹者即按善解表使轻疏也盖澈
一是用新汲水一盏和服大效　又方葛根紫苏叶分甘草半分姜三根水煎
服一治咳嗽六七日寒热微出而不快或出而后收者乃腠理闭寒或遇风寒
寒邪攻于内令吐泻热困者柳絮晒乾为末每服二钱用荠根
洗净水煎调下外用绵蘸姜切细酒蘸一二沸将出待温以摩寒皮擂软酥
酒蘸擦遍须面肢体即疹随出而内自安

新刊南巢神效十科应治卷出九完

奉抄

壬辰年十月三十日