

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Quy trình chỉ định và phác đồ Điều trị Lao-vi khuẩn
nhạy cảm thuốc

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 27/10/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc đổi tên Bệnh viện chuyên khoa Lao thành Bệnh viện Lao và Bệnh phổi; Kiện toàn tổ chức Bệnh viện;

Căn cứ Quyết định số 4068/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ Y tế về việc Ban hành Hướng dẫn biên soạn Quy trình chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Biên bản Hội đồng khoa học kỹ thuật Bệnh viện ngày 10/10/2019;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - Chỉ đạo tuyến,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình chỉ định và phác đồ Điều trị Lao-vi khuẩn nhạy cảm thuốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các Khoa, Phòng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (VBĐT);
- BGĐ BV (VBĐT);
- Lưu: VT, KHTH.



Huỳnh Minh Tâm



QUY TRÌNH CHỈ ĐỊNH VÀ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ LAO – VI KHUẨN NHẠY CẢM THUỐC

(Ban hành kèm theo quyết định số: 253 /QĐ-BVLBP ngày 24/10 /2019 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Khánh Hòa)

1. Phác đồ điều trị lao vi khuẩn nhạy cảm với thuốc

Chi định / Tuổi	Người lớn	Trẻ em
Bệnh lao không có bằng chứng kháng thuốc	Phác đồ A1: 2RHZE/4RHE	Phác đồ A2: 2RHZE/4RH
Lao màng não, lao xương khớp, lao hạch	Phác đồ B1: 2RHZE/10RHE	Phác đồ B2: 2RHZE/10RH

CHÚ Ý

- Nếu người bệnh không dung nạp phác đồ A, phác đồ B thì điều chỉnh phác đồ cá nhân phù hợp.

- Điều trị lao màng não nên sử dụng:

+ Dùng Streptomycin (thay cho E) trong giai đoạn tấn công.

+ Corticosteroid (Dexamethasone) liều giảm dần trong 6 - 8 tuần đầu tiên

• Liều Dexamethasone ở người lớn:

Tuần 1: liều 0,4 mg/kg tiêm tĩnh mạch trong 7 ngày

Tuần 2: liều 0,3 mg/kg tiêm tĩnh mạch trong 7 ngày

Tuần 3: liều 0,2 mg/kg tiêm tĩnh mạch trong 7 ngày

Tuần 4: liều 0,1 mg/kg tiêm tĩnh mạch trong 7 ngày