(2) If $E_{n-1} \ldots E_1 A = U$ is the result of Gaussian elimination without pivoting, write as usual $A_k = E_{k-1} \ldots E_1 A$ (with $A_k = (a_{ij}^{(k)})$), and let $\ell_{ik} = a_{ik}^{(k)}/a_{kk}^{(k)}$, with $1 \leq k \leq n-1$ and $k+1 \leq i \leq n$. Then

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \ell_{21} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \ell_{31} & \ell_{32} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ \ell_{n1} & \ell_{n2} & \ell_{n3} & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

where the kth column of L is the kth column of E_k^{-1}, for $k = 1, \ldots, n-1$.

(3) If $E_{n-1}P_{n-1} \cdots E_1 P_1 A = U$ is the result of Gaussian elimination with some pivoting, write $A_k = E_{k-1}P_{k-1} \cdots E_1 P_1 A$, and define E_j^k, with $1 \leq j \leq n-1$ and $j \leq k \leq n-1$, such that, for $j = 1, \ldots, n-2$,

$$\begin{aligned} E_j^j &= E_j \\ E_j^k &= P_k E_j^{k-1} P_k, \quad \text{for } k = j+1, \ldots, n-1, \end{aligned}$$

and

$$E_{n-1}^{n-1} = E_{n-1}.$$

Then,

$$\begin{aligned} E_j^k &= P_k P_{k-1} \cdots P_{j+1} E_j P_{j+1} \cdots P_{k-1} P_k \\ U &= E_{n-1}^{n-1} \cdots E_1^{n-1} P_{n-1} \cdots P_1 A, \end{aligned}$$

and if we set

$$\begin{aligned} P &= P_{n-1} \cdots P_1 \\ L &= (E_1^{n-1})^{-1} \cdots (E_{n-1}^{n-1})^{-1}, \end{aligned}$$

then

$$PA = LU. \tag{$\dagger_1$}$$

Furthermore,

$$(E_j^k)^{-1} = I + \mathcal{E}_j^k, \quad 1 \leq j \leq n-1,\ j \leq k \leq n-1,$$

where $\mathcal{E}_j^k$ is a lower triangular matrix of the form

$$\mathcal{E}_j^k = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & \ell_{j+1j}^{(k)} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \ell_{nj}^{(k)} & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$