



## ORDONNANCE EXTERNE ADMINISTRATION FER IV EN AMBULATOIRE

**Note pour la pharmacie communautaire :** cette ordonnance ne vous est pas destinée. Le fer IV doit être préparé par une pharmacie préparatrice certifiée.  
Si vous la recevez par erreur, svp, l'envoyer par télécopieur à une pharmacie préparatrice (liste au verso).

**Note aux infirmières :** toutes les doses sont données par gravité ou pompe volumétrique.

Des ordonnances provenant d'autres établissements ou celle de l'INESSS peuvent être utilisées- voir code QR au verso

**POIDS :** \_\_\_\_\_ kg \_\_\_\_\_ lb **TAILLE :** \_\_\_\_\_ cm \_\_\_\_\_ po **CREAT :** \_\_\_\_\_ **DATE :** \_\_\_\_\_

☐ AUCUNE ALLERGIE

☐ ALLERGIE

Description de la réaction : \_\_\_\_\_

☐ AUCUNE INTOLÉRANCE

☐ INTOLÉRANCE

Description de la réaction : \_\_\_\_\_

### ☐ FER SUCROSE (Venofer<sup>MD</sup>) :

☐ 100 mg dans 100 mL de NaCl 0,9 % IV en 30 minutes

☐ 300 mg dans 250 mL de NaCl 0,9 % IV en 90 minutes

☐ 200 mg dans 100 mL de NaCl 0,9 % IV en 60 minutes

☐ 300 mg dans 100 mL de NaCl 0,9 % IV en 90 minutes  
(si restriction liquidienne)

RÉPÉTER CETTE DOSE CHAQUE (minimum q 48 h) \_\_\_\_\_ pour un TOTAL de \_\_\_\_\_ DOSES

### ☐ FER ISOMALTOSIDE 1000 (Monoferric<sup>MD</sup>) :

*Contre-indiqué si antécédent d'allergies multiples, contre-indication relative si hépatite évolutive ou cirrhose décompensée.*

*Les doses de plus de 1000 mg à la fois sont possibles, mais ont été peu utilisées dans les études cliniques.*

☐ 500 mg dans 250 mL de NaCl 0,9 % IV en 60 minutes

RÉPÉTER CETTE DOSE CHAQUE (minimum q sem) \_\_\_\_\_ pour un TOTAL de \_\_\_\_\_ DOSES

#### Dose POSSIBLE si poids de l'usager est au moins 50 kg

☐ 1000 mg dans 250 mL de NaCl 0,9 % IV en 60 minutes

RÉPÉTER CETTE DOSE CHAQUE (minimum q sem) \_\_\_\_\_ pour un TOTAL de \_\_\_\_\_ DOSES

☐ 1000 mg dans 250 mL de NaCl 0,9 % IV en 60 minutes pour UNE DOSE suivi de 500 mg dans 250 mL de NaCl 0,9 % IV en 60 minutes  
DONNER LA 2<sup>E</sup> DOSE DANS (minimum q sem) \_\_\_\_\_ pour un TOTAL de 1500 mg

#### Dose POSSIBLE si poids de l'usager est au moins 75 kg

☐ 1500 mg dans 250 mL de NaCl 0,9 % IV en 60 minutes pour UNE DOSE

☐ 1500 mg dans 250 mL de NaCl 0,9 % IV en 60 minutes pour UNE DOSE suivi de \_\_\_\_\_ mg dans 250 mL de NaCl 0,9 % IV en 60 min  
DONNER LA 2<sup>E</sup> DOSE DANS (minimum q sem) \_\_\_\_\_ pour un TOTAL de \_\_\_\_\_ mg

### ☐ GLUCONATE FERRIQUE (Ferrlecit<sup>MD</sup>) : Dose maximale de 125 mg à la fois

☐ 62,5 mg dans 50 mL de NaCl 0,9 % IV en 60 minutes

☐ 125 mg dans 100 mL de NaCl 0,9 % IV en 90 minutes

RÉPÉTER CETTE DOSE CHAQUE (minimum q 48 h) \_\_\_\_\_ pour un TOTAL de \_\_\_\_\_ DOSES

EN CAS D'EFFETS INDÉSIRABLES: Se référer au tableau de surveillance clinique des effets indésirables disponible dans les règles d'utilisation (RU) des fers intraveineux.

CESSER LA PERFUSION :

**Si hypersensibilité sévère** (se référer aux conditions de l'OC-037 Administration d'épinéphrine (Adrénaline<sup>MD</sup>) lors d'une réaction anaphylactique)

☒ Épinéphrine (Adrénaline<sup>MD</sup>) 0,5 mg = 0,5 mL IM stat dans la cuisse (face antérolatérale)

La dose peut être répétée aux 5-15 minutes pour un maximum de 3 fois si pas d'amélioration

**Si hypersensibilité légère à modérée** (ex. : urticaire/rash avec prurit)

☒ Cétirizine (Réactine<sup>MD</sup>) 10 mg PO (moins de somnolence que Benadryl<sup>MD</sup>) ou Diphenhydramine (Benadryl<sup>MD</sup>) 50 mg PO ou IM x 1 dose

**Si autres symptômes :** se référer au tableau de surveillance clinique des effets indésirables disponibles dans les RU des fers intraveineux.

|      |       |                           |                |
|------|-------|---------------------------|----------------|
|      |       |                           |                |
| Date | Heure | Signature du prescripteur | N° de permis : |

## SURVEILLANCE

- Avant la perfusion: pression artérielle, pouls, fréquence respiratoire, saturation en oxygène et température.
- 15 minutes après le début de la perfusion: pression artérielle, pouls et fréquence respiratoire puis régulièrement par la suite (q 30 minutes et prn selon l'état clinique de l'usager).
- Surveiller l'apparition d'effets indésirables plus étroitement durant les 15 premières minutes puis régulièrement par la suite. Poursuivre cette surveillance (signes vitaux et effets indésirables) jusqu'à 30 minutes après la fin de la perfusion.
- Les fers intraveineux sont compatibles seulement avec le NaCl 0,9%.

*Note pour la pharmacie certifiée : LES MÉDICAMENTS EN CAS D'APPARITION D'HYPERSENSIBILITÉ SERONT FOURNIS PAR LE CLSC.*

## LISTE DES PHARMACIES EFFECTUANT DES PRÉPARATIONS STÉRILES

*Note : Appeler la pharmacie si prescription envoyée moins de 1 heure avant la fermeture ou pour vérifier disponibilités les jours fériés.*

| Pharmacie effectuant des préparations stériles | Adresse                                                          | Téléphone                                      | Télécopieur                                     | Heures d'ouverture                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CALEA<br>(B.H Thinh et T.T Nguyen)             | 4929, Place Olivia<br>Ville Saint-Laurent, H4R 2V6               | 514 335-3500                                   | 514 335-3400                                    | Lundi au vendredi<br>8 h à 18 h                                                                   |
| Pharmacie Linda Frayne & associés              | 2012, boul. René-Laennec<br>bureau 275, Laval, H7M 4J8           | 450 902-1351                                   | 450 663-2568                                    | Lundi au vendredi<br>9 h à 17 h<br>Samedi et dimanche de garde<br>(appeler au 514 833-4973)       |
| Pharmacie Linda Frayne & associés              | 5858, ch. de la Côte-des-Neiges<br>bureau 400, Montréal, H3S 1Z1 | 514 342-8696                                   | 514 342-4996                                    | Lundi au vendredi<br>9 h 30 à 17 h 30<br>Samedi et dimanche de garde<br>(appeler au 514 833 4973) |
| IV TECH PHARMA<br>(Shefteshy & Shefteshy)      | 5955, boul. Gouin Ouest<br>Montréal, H1L 2N9                     | 514 373-2424                                   | 514 373-8484                                    | Lundi au vendredi<br>9 h à 17 h<br>Samedi et dimanche<br>9 h à 17 h                               |
| IV TECH PHARMA<br>(Bestarows & Shefteshy)      | 9080, rue Hochelaga<br>Montréal, H1L 2N9                         | 514 353-8745                                   | 514 353-8746                                    | Lundi au vendredi<br>9 h 30 à 17 h 30<br>Samedi et dimanche : transféré sur<br>Boul. Gouin        |
| IV TECH PHARMA<br>(Bestarows & Shefteshy)      | 85, rue St-Georges<br>St-Jérôme, J7Z 4Z4                         | 450 553-2378                                   | 450 553-5378                                    | Lundi au vendredi<br>10 h à 18 h<br>Samedi et dimanche : transféré sur<br>boul. Gouin             |
| UNIPRIX<br>Mélanie Pelletier                   | 1, rue Quintal<br>Charlemagne, J5Z 1V8                           | 450 581-4540                                   | 450 585-9787                                    | Lundi au vendredi<br>9 h à 17 h<br>Samedi : 9 h à 15 h<br>Dimanche : appeler pour vérifier        |
| PROXIM<br>Bergeron et Raymond                  | 200, rue Durand, local 101<br>St-Jérôme, J7Z 7E2                 | 450 438-9955                                   | 450 438-2469                                    | Lundi au vendredi<br>8 h 30 à 17 h<br>Samedi et dimanche de garde<br>(appeler au 438 341-5667)    |
| PROXIM<br>Pharmacie Morin                      | 5955, rue Sherbrooke Est<br>Montréal, H1N 1B7                    | 514 254-7513                                   | 514 254-6739                                    | Lundi au vendredi<br>8 h à 17 h<br>Samedi et dimanche<br>9 h à 17 h                               |
| EJM PHARMA<br>(El-Achkar Jetha Merrouni)       | 965-T Boul. Curé-Labelle<br>Laval, H7V 2V7                       | 450-681-1683<br>Ligne directe:<br>450-978-9736 | 450-978-9467<br>Courriel :<br>info@ejmpharma.ca | Lundi au vendredi<br>9 h à 17h                                                                    |



Référence au protocole médical de l'INESSS :

Auteur: Annie Lizotte, pharmacienne