



ORDONNANCES D'INSULINE EN PÉRIOPÉRATOIRE
OU PRÉEXAMEN DIAGNOSTIQUE

TYPE D'INTERVENTION : _____ DATE PRÉVUE : _____

AVANT LA CHIRURGIE OU L'EXAMEN DIAGNOSTIQUE :

- La veille, donner médication usuelle ou _____
- Glycémie capillaire à l'arrivée, puis QID ou _____
- Le matin, omettre la médication antidiabétique et l'insulinothérapie usuelle

SOLUTÉ	INSULINE SC LE JOUR DE LA CHIRURGIE OU EXAMEN (À L'ARRIVÉE OU À _____ H) Aviser l'équipe médicale qui a complété ce formulaire si une injection d'insuline intermédiaire ou lente est prévue et que l'usager arrive après 10 h
☐ D 5 % NaCl 0,45 % + ajout ☐ KCl 20 mEq/L	☐ Novolin ^{MD} NPH _____ unités SC
☐ D 5%	☐ Basaglar ^{MD} (Glargine 100 unités/mL) _____ unités SC
☐ Autre soluté : _____	☐ Autre _____ unités SC
Installer à l'arrivée ou à : _____ h Débit : _____ mL/h	

☐ ALGORITHME D'INSULINE SC

☐ INSULINE IV (VOIR FORMULAIRE ORDONNANCES D'INSULINE IV)

Type d'insuline	Fréquence des administrations d'insuline selon l'algorithme
☐ NovoRapid ^{MD} (Asparte) ☐ Autre : _____	☐ TID ac seulement ☐ QID (TID ac + HS ½ dose)
	☐ Autre : _____ ☐ Cesser/aucune insuline selon échelle

Valeurs glycémiques (mmol/L)	Algorithme des doses d'insuline SC en unités			
	☐ 1 (faible dose)	☐ 2 (dose modérée)	☐ 3 (haute dose)	☐ Individualisé
MOINS DE 8	0	0	+ 0	
8,1-10	0	0	+ 4	
10,1-13,0	+ 2	+ 4	+ 8	
13,1-16,0	+ 3 (½ dose HS = + 1)	+ 6	+ 10	
16,1-19,0	+ 4	+ 8	+ 12	
PLUS DE 19,0	+ 5 (½ dose HS = + 2)	+ 10	+ 14	

APRÈS LA CHIRURGIE OU L'EXAMEN DIAGNOSTIQUE

L'échelle d'insuline ci-dessus ne devrait généralement pas être utilisée seule plus de 24 heures; il est souhaitable de prescrire concomitamment des agents antidiabétiques oraux ou des doses fixes d'insuline rapide (si l'usager s'alimente) ou une insuline basale lente ou intermédiaire (si l'usager s'alimente peu ou de façon irrégulière)

- Cesser le soluté ci-dessus et installer celui prescrit en post-op. Sauf dans le cas d'insuline IV, poursuivre celui du formulaire d'insuline IV
- Reprendre l'insuline pré-intervention
- Reprendre la médication antidiabétique si l'usager mange plus de 50 % du repas (diète solide)
- Appliquer la nouvelle prescription (voir autre feuille) ou
- Communiquer avec l'équipe médicale si aucune autre prescription faite.

Si glycémie moins de 4 mmol/L: se référer à l'ordonnance collective « Initier le traitement de l'hypoglycémie OC-031 »

VALIDITÉ MAXIMALE DE L'ORDONNANCE : 24 HEURES POSTOPÉRATOIRES

Date	Heure	Signature et nom du prescripteur	N° de permis :