



D T 0 6 0 8

## ORDONNANCES D'INSULINE SOUS-CUTANÉE (SC)

CES ORDONNANCES ANNULENT TOUTES LES AUTRES ORDONNANCES ANTÉRIEURES D'INSULINE (SAUF SI DOSE STAT SEULEMENT)

FRÉQUENCE DES GLYCÉMIES CAPILLAIRES : QID OU \_\_\_\_\_

UNE INSULINE BASALE OU LENTE EST SUGGÉRÉE MÊME SI L'USAGER NE S'ALIMENTE PAS

DOSES D'INSULINE SC FIXES (Note aux médecins : si insulines prémélangées à domicile, il faut les convertir en insulines séparées)

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Déjeuner | Dîner | Souper | Coucher | Commentaires<br>ou doses STAT |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|---------|-------------------------------|
| BASALE    | <input type="checkbox"/> Novolin <sup>MD</sup> ge NPH (100 unités/mL)<br><input type="checkbox"/> Basaglar <sup>MD</sup> (insuline glargine 100 unités/mL)<br><input type="checkbox"/> Levemir <sup>MD</sup> (insuline détémir 100 unités/mL)<br><input type="checkbox"/> Tresiba <sup>MD</sup> (insuline dégludec 100 unités/mL)<br><input type="checkbox"/> Toujeo <sup>MD</sup> (insuline glargine 300 unités/mL)                                                                                                                                                    |          |       |        |         |                               |
| PRANDIALE | <input type="checkbox"/> NovoRapid <sup>MD</sup> (insuline asparte 100 unités/mL) <ul style="list-style-type: none"> <li>Immédiatement avant le repas</li> </ul> OU <ul style="list-style-type: none"> <li>Si l'usager s'alimente peu : donner ½ dose s'il mange de 25 à 50 % du repas d'une diète solide et omettre la dose s'il mange moins de 25 %</li> </ul> <input type="checkbox"/> Novolin <sup>MD</sup> ge Toronto (100 unités/mL) <ul style="list-style-type: none"> <li>15-30 minutes avant le repas</li> <li>Omettre si alimentation imprévisible</li> </ul> |          |       |        |         |                               |
|           | <input type="checkbox"/> Autre : _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |        |         |                               |

DOSES D'INSULINE SC SELON ALGORITHME (donner la dose selon l'algorithme avant le repas même si usager à jeun)

| Type d'insuline                                                                                            | Fréquence des administrations d'insuline selon l'algorithme                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il est recommandé d'utiliser le même type d'insuline que les doses fixes prandiales                        |                                                                                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> NovoRapid <sup>MD</sup> (insuline asparte) <input type="checkbox"/> Autre : _____ | <input type="checkbox"/> TID ac seulement <input type="checkbox"/> QID (TID ac + HS ½ dose)<br><input type="checkbox"/> Autre : _____ <input type="checkbox"/> Cesser/aucune insuline selon algorithme |

| Valeurs glycémiques (mmol/L) | Algorithme des doses d'insuline en unités |                            |                            |                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|                              | <input type="checkbox"/> 1                | <input type="checkbox"/> 2 | <input type="checkbox"/> 3 | <input type="checkbox"/> Individualisé |
| 10 ET MOINS                  | 0                                         | 0                          | + 0                        |                                        |
| 10,1 – 13,0                  | + 2                                       | + 2                        | + 4                        |                                        |
| 13,1 – 16,0                  | + 3 (½ dose HS = +1)                      | + 4                        | + 6                        |                                        |
| 16,1 – 19,0                  | + 4                                       | + 6                        | + 8                        |                                        |
| PLUS DE 19                   | + 5 (½ dose HS = +2)                      | + 8                        | + 10                       |                                        |

Si glycémie moins de 4 mmol/L, se référer à l'ordonnance collective « Initier le traitement de l'hypoglycémie OC-031 »

Pour toute insuline hors formulaire : substitution selon approbation du comité de pharmacologie (tableau au verso)

☐ Ne pas substituer : restriction aux endocrinologues (enseignement ou auto-administration)

|      |       |                           |              |
|------|-------|---------------------------|--------------|
|      |       |                           |              |
| Date | Heure | Signature du prescripteur | N° de permis |