

1. Curvas en el plano y en el espacio

1.1. Curvas en general

- Una **curva plana** es una aplicación continua $\alpha : I \subset \mathbb{R}^n$ definida por $\alpha(t) = (\alpha_1(t), \dots, \alpha_n(t))$.
- La **rapidez** es la derivada $\alpha'(t) = (\alpha'_1(t), \dots, \alpha'_n(t))$
- La **velocidad** es la norma de la rapidez $v_\alpha(t) = \|\alpha'(t)\|$
 - α es **regular** $\iff v_\alpha(t) > 0, \forall t \in I$
 - La derivada (o rapidez) normalizada es $T_\alpha(t) = \frac{\alpha'(t)}{v_\alpha(t)}$.
- La **longitud** es $l_\alpha = \int_I v_\alpha(t) dt$.
- Una **parametrización** es un difeomorfismo $\varphi : J \subset \mathbb{R} \rightarrow I \subset \mathbb{R}$

- El **signo de una parametrización** es

$$\varepsilon(\varphi) = \begin{cases} +1 & \text{si } \varphi'(t) > 0, \forall t \in J \\ -1 & \text{si } \varphi'(t) < 0, \forall t \in J \end{cases}$$

- Una curva está **parametrizada por longitud de arco** o p.p.a $\iff \|\alpha'(t)\| = 1, \forall t \in I$.
- Si para dos curvas α, β existe φ difeomorfismo tal que $\alpha = \beta \circ \varphi$ decimos que $\alpha \sim \beta$
 - \sim es una relación de equivalencia
 - Dos curvas en una misma clase de equivalencia comparten la traza o imagen.
 - Se cumple

$$\alpha'(t) = \beta'(\varphi(t))\varphi'(t) \\ \|\alpha'(t)\| =$$

- Una curva es **birregular** \iff para una parametrización α se tiene que α' y α'' son linealmente independientes.
 - En particular, $\alpha', \alpha'' \neq 0$ y por tanto α también es regular.

1.2. Curvas planas

- El **diedro de Frenet-Serret** formado por los vectores

$$\mathbf{t}_\alpha(t) = \frac{\alpha'(s)}{\|\alpha'(s)\|}$$

$$\mathbf{n}_\alpha(t) = J\mathbf{t}_\alpha(s) \text{ con } J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- La **curvatura** (con signo)

$$k_\alpha(t) = \frac{\langle \mathbf{t}'_\alpha(t), \mathbf{n}_\alpha(t) \rangle}{\|\alpha'(t)\|}$$

$$k_\alpha(t) = \frac{\det(\alpha'(t), \alpha''(t))}{\|\alpha'(t)\|^3} \quad \text{si } \alpha \text{ regular}$$

$$k_\alpha(t) = \|\alpha''(t)\| \quad \text{si } \alpha \text{ está p.p.a.}$$

- El **vector curvatura** es $\mathbf{k}_\alpha(t) = k_\alpha(t)\mathbf{n}_\alpha(t)$
- El **radio de curvatura**

$$\rho_\alpha(t) = \frac{1}{k_\alpha(t)}$$

- El **centro de curvatura**

$$C_\alpha(t) = \alpha(t) + \frac{1}{k_\alpha(t)}\mathbf{n}_\alpha(t)$$

- El **círculo osculador** o **circunferencia osculatriz**

$$\{p \in \mathbb{R}^2 : \|p - C_\alpha(t)\| = \frac{1}{k_\alpha(t)}, \text{ para } t \in I \text{ fijado} \}$$

- Las **ecuaciones de Frenet-Serret** salen de tomar la submatriz 2×2 de las ecuaciones en el espacio.

1.3. Curvas en el espacio

- El triedro de Frenet-Serret formado por los vectores

$$\mathbf{t}_\alpha(s) = \frac{\alpha'(s)}{\|\alpha'(s)\|}$$

$$\mathbf{n}_\alpha(s) = \frac{\mathbf{t}'_\alpha(s)}{\|\mathbf{t}'_\alpha(s)\|}$$

$$\mathbf{b}_\alpha(s) = \mathbf{t}_\alpha(s) \times \mathbf{n}_\alpha(s)$$

- Los 3 planos del triedro de Frenet-Serret para un punto $\alpha(s)$ de la curva [afines] son:

- El **plano osculador** $\text{span}\{\mathbf{t}_\alpha(s), \mathbf{n}_\alpha(s)\} + \alpha(s)$ cuyos puntos P cumplen $\langle P - \alpha(s), \mathbf{b}_\alpha(s) \rangle = 0$
- El **plano normal** $\text{span}\{\mathbf{n}_\alpha(s), \mathbf{b}_\alpha(s)\} + \alpha(s)$ cuyos puntos P cumplen $\langle P - \alpha(s), \mathbf{t}_\alpha(s) \rangle = 0$
- El **plano rectificante** $\text{span}\{\mathbf{t}_\alpha(s), \mathbf{b}_\alpha(s)\} + \alpha(s)$ cuyos puntos cumplen $\langle P - \alpha(s), \mathbf{n}_\alpha(s) \rangle = 0$

- La **curvatura** (siempre ≥ 0)

$$k_\alpha(s) = \frac{\|\mathbf{t}'_\alpha(s)\|}{\|\alpha'(s)\|}$$

$$k_\alpha(s) = \frac{\|\alpha'(s) \times \alpha''(s)\|}{\|\alpha'(s)\|^3} \quad \text{si } \alpha \text{ regular}$$

$$k_\alpha(s) = \|\alpha''(s)\| \quad \text{si } \alpha \text{ p.p.a.}$$

- El **vector curvatura**

$$\mathbf{k}_\alpha(s) = \frac{\mathbf{t}'_\alpha(s)}{\|\alpha'(s)\|} \text{ colineal con } \mathbf{n}_\alpha(s)$$

- La **torsión**

$$\tau_\alpha(s) = -\frac{\langle \mathbf{b}'_\alpha(s), \mathbf{n}_\alpha(s) \rangle}{\|\alpha'(s)\|}$$

$$\tau_\alpha(s) = \frac{\det(\alpha'(s), \alpha''(s), \alpha'''(s))}{\|\alpha'(s) \times \alpha''(s)\|^2} \text{ si } \alpha \text{ regular}$$

- Las ecuaciones de Frenet-Serret

$$\mathbf{t}'_\alpha = k_\alpha v_\alpha \mathbf{n}_\alpha$$

$$\mathbf{n}'_\alpha = -k_\alpha v_\alpha \mathbf{t}_\alpha + \tau_\alpha v_\alpha \mathbf{b}_\alpha$$

$$\mathbf{b}'_\alpha = -v_\alpha \tau_\alpha \mathbf{n}_\alpha$$

$$\begin{pmatrix} \mathbf{t}'_\alpha \\ \mathbf{n}'_\alpha \\ \mathbf{b}'_\alpha \end{pmatrix} = \|\alpha'(s)\| \begin{pmatrix} 0 & k_\alpha & 0 \\ -k_\alpha & 0 & \tau_\alpha \\ 0 & -\tau_\alpha & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{t}_\alpha \\ \mathbf{n}_\alpha \\ \mathbf{b}_\alpha \end{pmatrix}$$

2. Superficies

- Un **homeomorfismo** entre dos espacios topológicos es una aplicación biyectiva continua y con inversa continua.

- Un **difeomorfismo** es un **homeomorfismo** diferenciable con inversa diferenciable.
- Dos conjuntos son **homeomorfos** si existe un homeomorfismo entre ellos.

- Una **superficie regular** S es un subconjunto no vacío $S \subset \mathbb{R}^3$ tal que para todo $p \in S$ existe un abierto $U \subset \mathbb{R}^2$, un entorno abierto V de p en \mathbb{R}^3 y una **parametrización** $\mathbf{x} : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow V \subset S \subset \mathbb{R}^3$ tal que

1. \mathbf{x} es diferenciable como aplicación $x : U \rightarrow \mathbb{R}^3$
2. \mathbf{x} es un homeomorfismo
3. $\forall (u, v) \in U, (d\mathbf{x})_{(u,v)} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es inyectiva \iff los vectores coordenados son linealmente independientes $\forall (u, v) \in U$.

- Puede ocurrir (esfera, cono...) que no valga con una única parametrización $\forall p \in S$. Si nos vale con una única parametrización entonces S es homeomorfa a un abierto de \mathbb{R}^2 .

- Los **vectores coordenados** en un punto $\mathbf{x}(u, v) \in S$ son

$$\mathbf{x}_u(u, v) = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial u}(u, v) = (d\mathbf{x})_{(u,v)} \cdot \mathbf{e}_1 \mathbf{x}_v(u, v) = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial v}(u, v) = (d\mathbf{x})_{(u,v)} \cdot \mathbf{e}_2$$

- Los **campos coordenados** asociados a la parametrización \mathbf{x} son dos campos $\mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v$ diferenciables en el abierto $V \subset S$.

- El **plano tangente** a S en $p \in S$ es un subespacio vectorial de \mathbb{R}^3 con dimensión 2 dado por:

$$T_p S = \{ \alpha'(0) \mid \exists \varepsilon > 0, \alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow S \\ \wedge \alpha(0) = p \\ \wedge \alpha \text{ diferenciable} \}$$

- Si q es la preimagen de p por \mathbf{x} (es decir, $\mathbf{x}(q) = p$) entonces $T_p S = (d\mathbf{x})_q(\mathbb{R}^2)$
- El **plano tangente (afín)** a S en $p = \mathbf{x}(u, v) \in S$

$$T_p S = p + \underbrace{\text{span}\{\mathbf{x}_u(u, v), \mathbf{x}_v(u, v)\}}_{\text{plano tangente vectorial}}$$

- La **recta normal** a S en $p \in S$ es el complemento ortogonal del plano tangente $T_p S^\perp$.

- Para cada $p \in S$ existen dos vectores normales unitarios (opuestos) en la recta normal.

- Una **función definida en la superficie regular** S es $f : S \rightarrow \mathbb{R}^m$.

- f es **diferenciable** si para toda parametrización \mathbf{x} de S , la función $f \circ \mathbf{x} : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^m$ es diferenciable. Se cumplen las propiedades habituales sobre diferenciable: suma producto y cociente (siempre que tenga sentido) de funciones diferenciables es diferenciable.
- Si f es una función definida entre dos superficies ($f : S_1 \rightarrow S_2$) entonces f es **diferenciable** $\iff \forall p \in S_1$ hay una parametrización $\mathbf{x}_1 : U_1 \rightarrow S_1$ con $p \in \mathbf{x}_1(U_1)$ y una parametrización $\mathbf{x}_2 : U_2 \rightarrow S_2$ con $f(p) \in \mathbf{x}_2(U_2)$ tales que $\tilde{f} := \mathbf{x}_2^{-1} \circ f \circ \mathbf{x}_1$ es diferenciable. \tilde{f} es la expresión en coordenadas de f .

- La **diferencial de una función definida en una superficie regular** es

$$(df)_p : T_p S \rightarrow \mathbb{R}, \quad (df)_p(x) := (f \circ \alpha)'(0)$$

donde $\alpha : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow S$ es una curva diferenciable en S tal que $\alpha(0) = p \wedge \alpha'(0) = x$. $(df)_p$ está bien definida y es independiente de la elección de α .

- Más comodamente, si \mathbf{x} es una parametrización de S tal que para ciertos u_0, v_0 se tiene que $\mathbf{x}(u_0, v_0) = p$, entonces la matrix asociada a la diferencial en la base $\{\mathbf{x}_u(u_0, v_0), \mathbf{x}_v(u_0, v_0)\}$ es

$$(df)_p = \begin{pmatrix} (f \circ \mathbf{x})_u(u_0, v_0) \\ (f \circ \mathbf{x})_v(u_0, v_0) \end{pmatrix}$$

- f constante $\implies (df)_p = 0 \forall p \in S$. Recíprocamente, $(df)_p = 0 \forall p \in S \wedge S$ conexa $\implies f$ constante.
- f tiene un extremo relativo en $p \implies (df)_p = 0$.

- La **primera forma fundamental** de S en p es

$$I_p : T_p S \times T_p S \rightarrow \mathbb{R}, \quad I_p(x, y) := \langle x, y \rangle$$

- Es bilineal, simétrica y definida positiva (es el producto escalar restringido a cada plano tangente de S en p).
- Dada una parametrización \mathbf{x} de S tal que $\mathbf{x}(u_0, v_0) = p \in S$ la matriz de I_p respecto de la base $\mathcal{B} = \{\mathbf{x}_u(u_0, v_0), \mathbf{x}_v(u_0, v_0)\}$ es

$$(I_p)_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle x_u, x_u \rangle & \langle x_u, x_v \rangle \\ \langle x_v, x_u \rangle & \langle x_v, x_v \rangle \end{pmatrix}$$

donde cada derivada parcial de \mathbf{x} está evaluada en (u_0, v_0) .

- Al escribir

$$I_p(x, y) = \langle x, y \rangle = (x_1, x_2)(I_p)_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

estamos obteniendo el producto escalar de $\mathbf{x}(x_1, x_2)$ y $\mathbf{x}(y_1, y_2)$ que son vectores de \mathbb{R}^3 .

Dadas las coordenadas de dos vectores de la superficie S respecto de una parametrización \mathbf{x} , la primera forma fundamental permite obtener el producto escalar de sus respectivos vectores tangentes a partir de las coordenadas de los primeros.

- La **forma diferencial de la primera forma fundamental** es

$$I = Edu^2 + 2Fdudv + Fdv^2$$

donde E, F y G son funciones diferenciables que evaluamos para cada $p \in S$.

- Del criterio de Sylvester para que I_p siempre sea definida positiva se tiene que $E, G > 0$ y que $EG - F^2 > 0$.

- La **longitud de un segmento** de una curva diferenciable $\alpha : I \rightarrow S$, $\alpha(t) = \mathbf{x}(u(t), v(t))$ es

$$L(\alpha|_{[a,b]}) = \int_a^b \sqrt{I_{\alpha(t)}(\alpha'(t), \alpha'(t))} dt = \int_a^b \sqrt{Eu'(t)^2 + 2Fv'(t)u'(t) + Gv'(t)^2} dt$$

- El **área de una región** $R \subset S$ contenida en $\mathbf{x}(U)$ (bien parametrizada) es:

$$A(R) = \int_{\mathbf{x}^{-1}(R)} \|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v\| dudv = \int_{\mathbf{x}^{-1}(R)} \sqrt{EG - F^2} dudv$$

Sea $f : S_1 \rightarrow S_2$ una aplicación diferenciable entre superficies regulares.

- f es una **aplicación conforme** si existe una aplicación diferenciable positiva $\lambda : S_1 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$\langle (df)_p(x), (df)_p(y) \rangle = \lambda(p) \langle x, y \rangle, \quad \forall x, y \in T_p S_1, \forall p \in S_1$$

- Una **parametrización** $\mathbf{x} : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S_1$ se dice **conforme** si cumple la definición anterior para $S_2 = \mathbb{R}^2$. Es decir, $\forall x, y \in \mathbb{R}^2$ y $\forall p \in U$. Equivalentemente, \mathbf{x} se dice conforme si

$$I_p^{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix} = \lambda(p) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

es decir, si $E = G$ y $F = 0$ para todo $p = (u, v) \in U$.

- f es conforme \iff **preserva ángulos**
- f es **equiárea** \iff preserva la función $EG - F^2$ entre las formas fundamentales de S_1 y S_2
- f es una isometría local \iff preserva la primera forma fundamenteal, es decir,

$$\langle (df)_p(x), (df)_p(y) \rangle = \langle x, y \rangle$$

- f es una isometría local $\iff f$ es conforme con $\lambda(p) = 1$ constantemente
- Toda isometría local de superficies es un difeomorfismo local
- f isometría local $\iff f$ preserva longitudes, ángulos y áreas
 - Es decir f conforme y f equiárea $\iff f$ isometría local
- Dos superficies son **localmente isométricas** si existe una isometría local f entre ellas y además f es sobre entre S_1 y S_2 . *No es suficiente que f sea una isometría local.*
- Una **isometría global** entre superficies es un difeomorfismo global que además es isometría local.
 - Dos superficies son **globalmente isométricas** si existe una isometría global entre ellas.
 - isometría global \implies isometría local
- La **aplicación de Gauss**
- El **operador de Weingarten** se define para cada $p \in T_p S$ como la aplicación

$$W : T_p S \rightarrow T_p S \text{ con } Wp(x) := -(dN)_p x$$

- Es una aplicación autoajunta: $\langle W_p x, y \rangle = \langle x, W_p y \rangle$