قسم التخدير



تعليمات استعدادًا

- للعمليّة الجراحيّة



إذا ساءت حالة ابنكم الصحّيّة، أو تمّ اكتشاف مشكلة جديدة قبل موعد العمليّة الجراحيّة، يجب إبلاغ القسم الذي سيجرى العمليّة.

إذا ارتفعت درجة حرارته خلال الأسبوعين السابقين للجراحة (أكثر من

38.5 درجة) / يعاني من السعال مع البلغم/ يشكو من الشعور بتوعّك

/ يمرض بالكورونا ، يجب عليكما إبلاغ القسم وانتظار قرار بشأن إجراء

العمليّة الجراحيّة أو الغائها.

ستّ ساعات قبل العمليّة الجراحيّة- يجب على ابنكما الصوم عن الطعام الصلب.

أربع ساعات قبل العمليّة الجراحيّة - يجب التوقّف عن شرب السوائل غير الشفّافة، مثل: الحليب وبدائل الحليب، مثل: الحليب الاصطناعيّ.

ثلاث ساعات قبل العمليّة الجراحيّة - يجب التوقّف عن رضاعة حليب الأمّ إذا كان ابنكم يرضع أو يشرب حليب الأم من الزجاجة.

حتّى ساعة قبل العمليّة الجراحيّة - يُسمح بل يُنصح، بشرب سوائل صافية مثل العصير المحلّى بدون مكوّنات الفاكهة والماء والشاي.

رسائل تلخيصيّة حديثة من طبيب الأطفال أو الأخصّائيّ المعالج.

ساعة قبل العمليّة الجراحيّة - يجب الصوم بالكامل بدون شرب.



يُرجى تذكُّر إحضار ما يلى إِلَى اللقاء قُبل العُمليّة الجراحيّة



- قائمة الأدوية أو رزم الأدوية الخاصّة بابنكم.
 - فحص دم حديث (فقط إذا لزم الأمر).
 - نتائج موجزة للفحوصات ذات الصلة.
 - استمارة 17 (التزام ماليّ).

