قسم التخدير



تعليمات استعدادًا للعمليّة الجراحيّة

- إذا ساءت حالة ابنتكما الصحّيّة، أو تمّ اكتشاف مشكلة جديدة قبل **€** موعد العمليّة الجراحيّة، يجب إبلاغ القسم الذي سيجرى العمليّة.

بشأن إجراء العمليّة الجراحيّة أو الغائها.

ستّ ساعات قبل العمليّة الجراحيّة- يجب على ابنتكما الصوم عن الطعام الصلب.

إذا ارتفعت درجة حرارتها خلال الأسبوعين السابقين للجراحة (أكثر

من 38.5 درجة) / تعانى من السعال مع البلغم/ تشكو من الشعور

بتوعّك / تمرض بالكورونا، يجب عليكما إبلاغ القسم وانتظار قرار

أربع ساعات قبل العمليّة الجراحيّة - يجب التوقّف عن شرب السوائل غير الشفّافة، مثل: الحليب وبدائل الحليب، مثل: الحليب الاصطناعيّ.

ثلاث ساعات قبل العمليّة الجراحيّة - يجب التوقّف عن رضاعة حليب الأمّ إذا كانت ابنتكم ترضع أو تشرب حليب الأم من الزجاجة.

حتّى ساعة قبل العمليّة الجراحيّة - يُسمح بل يُنصح، بشرب سوائل صافية مثل العصير المحلّى بدون مكوّنات الفاكهة والماء

ساعة قبل العمليّة الجراحيّة - يجب الصوم بالكامل بدون شرب.



يُرجى تذكَّر إحضار ما يلي إُلَى اللقاء قُبل العُمليّة الجراحية



- رسائل تلخيصيّة حديثة من طبيب الأطفال أو الأخصّائيّ المعالج.
 - قائمة الأدوية أو رزم الأدوية الخاصّة بابنتكم.
 - فحص دم حديث (فقط إذا لزم الأمر).
 - نتائج موجزة للفحوصات ذات الصلة.
 - استمارة 17 (التزام ماليّ).

