

Указания по предстоящей операции



Если в течение двух недель до операции у Вашего ребенка поднялась температура (более 38,5 градусов) / появился кашель с мокротой / ребенок плохо себя чувствовал / ребенок заболел короной - сообщите об этом в отделение и подождите решения о проведении операции или об ее отмене.



Если состояние здоровья ребенка ухудшилось или если до операции у него выявили новую проблему медицинского характера, сообщите об этом в отделение.



Шесть часов до операции: ваш ребенок должен воздержаться от твердой пищи.

Четыре часа до операции: нужно прекратить пить непрозрачные жидкости, такие как молоко или заменители молока.

Три часа до операции: следует прекратить кормить ребенка, находящегося на грудном вскармливании, в том числе, если он пьет грудное молоко из бутылочки.

За час до операции: разрешено и даже рекомендуется пить прозрачные жидкости, такие как подслащенный сок без мякоти, вода и чай.

Час до операции: ребенок должен полностью отказаться от употребления пищи и напитков.

Не забудьте взять с собой на предоперационную встречу



- ✓ Заключение педиатра или врача-специалиста, лечащего Вашего ребенка
- ✓ Список лекарственных препаратов или упаковки лекарственных препаратов Вашего ребенка
- ✓ Последний анализ крови
- ✓ Результаты релевантных исследований
- ✓ Обязательство больничной кассы («Форма 17»)