רפואה מובילה ואנושית

MEDICAL EXCELLENCE AND COMPASSIONATE CARE

מדינת ישראל | משרד הבריאות המרכז הרפואי תל-אביב ע״ש סוראסקי

מסונף לפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר באוניברסיטת תל-אביב

Affiliated to Tel Aviv University Sackler School of Medicine

## טופס הסכמה להרדמה- ANESTHESIA ושנחות הספונה של החדמה אופס הסכמה להרדמה ושנחות הספונה של החדמה של החדמה של החדמה הספונה של החדמה של החדמה החדמה של החדמה של החדמה החדמה של החדמה החדמה של החדמה של החדמה החדמה של החדמה החדמה של החדמה החדמה של החדמה החדמה החדמה של החדמה החדמה של החדמה החדמה החדמה החדמה של החדמה החד

## أنواع التخدير المتعارف عليها هي:

- التخدير الكلّي يتم من خلال حقن الأدوية إلى الدورة الدموية و/أو إعطاء المواد عن طريق الجهاز التنفسي بواسطة أنبوب في القصبة الهوائية (طوبوس) و/أو قناع. تؤدي هذه المستحضرات إلى تراجع في مستوى الوعي، إلى ارتخاء العضلات وإلى لتخفيف من الشعور بالألم. ترتبط وتيرة الاستفاقة من التخدير بعدة عوامل تتعلق بالتخدير نفسه وبحالة المريض العامة وبنوع الجراحة. الأعراض الجانبية والمخاطر: ألم في الحلق وحالة من الإزعاج عند البلع، آلام في العضلات، غثيان وتقيؤ وحالة عامة من الانزعاج. ضرر للأسنان وللقصبة الهوائية جراء إدخال الجهاز اللازم للتنفس. في بعض الحالات النادرة من الممكن حصول مضاعفات خطيرة مثل: ردّة فعل حساسية حادّة، متلازمة الحرارة الخبيثة، اضطرابات في أداء الأجهزة الحيوية في الجسم، وفي بعض الحالات النادرة جدا من الممكن حصول وفاة جراء هذه المضاعفات.
- O التخدير النصفي (تخدير المنطقة) يتم من خلال حقن أدوية حول الأعصاب تؤدي إلى فقدان الشعور في منطقة معينة من الجسم. مثال على التخدير النصفي هو التخدير فوق الجافية (أبيدورال) والتخدير النخاعي، واللذين يتم خلالهما حقن المادة المخدرة في التجويف المحيط بالنخاع الشوكي (في الظهر). من الممكن الشعور بالإزعاج والضغط في منطقة الحقن. بعد انتهاء التخدير النصفي، من الممكن استمرار عدم الشعور ومحدودية حركة، وهما من الأمور العابرة.

الأعراض الجانبية والمخاطر: آلام الظهر، هنالك إمكانية لتسرب السائل الشوكي و/أو دخول الإبرة إلى داخل غلاف النخاع الشوكي مما قد يؤدي إلى آلام حادة و/أو متواصلة في الرأس. تستدعي هذه الظواهر العلاج. في بعض الحالات النادرة جدا، من الممكن حصول تلوث موضعي و/أو نشوء خراج، دم موضعي (احتباس) وضرر دائم (شلل) في أعصاب الأطراف وفي كيس البول. في حالات الجرعة الزائدة من المواد المخدرة الموضعية، هنالك مخاطر لحصول تسمم يتمثل باضطرابات في نبض القاب من الممكن أن تصل إلى السكتة القابية، وفي الجهاز العصبي المركزي.

- التخدير الموضعي يتم من خلال حقن مواد التخدير على مقربة من المنطقة المراد جراحتها. عادة، يتم إجراء الأمر من طرف الطبيب الجراح نفسه. يخلق التخدير الموضعي حالة من فقدان الشعور في منطقة الحقن فحسب. تمس مواد التخدير الموضعي بالنقل العصبي للمحفزات المسببة للألم من المنطقة الخاضعة للجراحة، الأمر الذي يؤدي إلى منع الشعور بالألم وإدراكه.
- الأعراض الجانبية والمخاطر: انتفاخ موضعي، احمرار، حكّة، تخدير غير كامل، حُرقة موضعية، شعور بالضغط. في بعض الأحيان النادرة من الممكن حصول ردة فعل حساسية، ألم متواصل أو مس عصبي طويل الأمد. في حالات الجرعة الزائدة من المواد المخدرة الموضعية، هنالك مخاطر لحصول تسمم يتمثّل باضطرابات في نبض القلب من الممكن أن تصل إلى السكتة القلبية، وفي الجهاز العصبي المركزي، لذلك فإن هذه الطريقة غير مناسبة للمناطق الكبيرة.
- سد العصب الطرفي يتم من خلال حقن الأدوية على مقربة من الأعصاب الناقلة للشعور بالألم من مناطق محددة في الجسم.

  الأعراض الجانبية والمخاطر: شعور بالإزعاج والضغط في مكان الحقن. بعد إجراء التخدير، من الممكن أن يستمر فقدان الشعور ومحدودية الحركة (ضعف، شلل) لفترة متواصلة. تشمل المخاطر الوارد حصولها فشل السدّ العصبي، التلوث الموضعي، حصول نزيف دموي (احتباس)، انتشار المادة المخدرة إلى أبنية عصبية لم يتم التخطيط لها (سد العصب الواصل إلى الحجاب الحاجز على سبيل المثال). مضاعفات نادرة: سمّية المواد المخدرة الموضعية (من الممكن أن تسبب اضطرابات عصبية واضطرابات في نبض القلب قد تصل إلى حد السكتة القلبية)، ضرر عصبي طويل الأمد.
- التخدير الجزئي هو تشويش من خلال إعطاء أدوية قبل، خلال وبعد الإجراء بهدف الحد من الخوف والتسبب بتغيير مؤقت وعابر في
   حالة وعي متلقي العلاج خلال الإجراء، بالإضافة إلى تسكين الآلام في الإجراءات المؤلمة.
   الأعراض الجانبية والمخاطر: التقيؤ والغثيان، ردة فعل حساسية. تثبيط التنفس، انخفاض ضغط الدم ونبض القلب أو تغيير

في وتيرة نبض القلب، والتي من شأنها في بعض الأحيان النادرة جدا التسبب بالوفاة.

مخاطر التخدير، على اختلاف أنواعها، ليست مرتبطة بالضرورة بنوع الجراحة ومدى تعقيدها. لدى المرأة الحامل، في كافة أنواع التخدير، من الممكن انتقال جزء من المواد المخدرة إلى الجنين، ومن الممكن، في بعض الحالات الفردية، حصول أعراض جانبية ومضاعفات نادرة لدى الجنين أو حتى التأثير على استمرار الحمل.

يجب على المريض إبلاغ طبيب التخدير بكامل المعلومات حول أمراضه، الأدوية التي يتناولها، الحساسية للأدوية، ردود فعله لحالات التخدير السابقة، بما في ذلك المضاعفات إذا كانت قد حصلت.

طرق التخدير الملائمة للجراحة التي سأخضع لها هي (المشار إليها)

- تخدیر کلي
- تخدیر نصفی
- تخدیر موضعي
- سد عصبي طرفی
  - تخدیر جزئي

لكن من الممكن إجراء دمج بين عدّة أنواع من التخدير، مثلا: تخدير كلي وتخدير نصفي، تخدير كلي وسدّ عصبي طرفي.

سم المريض (שם החולה):				
	اسم العائلة	الاسم الشخصي	اسم الأب	رقم الهوية
	(שם משפחה)	(שם פרטי)	(שם האב)	(ת.ז.)
ُصرح وأُقرّ بهذا أنن <i>ي</i> تلقيت شرح	ا مفصلا وشفويا من الدكتو	ַ (מד"ר)		
		اسم العائلة (س	ם משפחה) וلاسم الشخص	ىي (שם פרטי)
بشأن الحاجة لإجراء التخدير بهدف	ب إجراء العملية الجراحة ا	لمخطط لها. كذلك تلقيت شرح	ا بشأن الهدف من التخدير و	طرق إجرائه الممكنة.
أقرّ وأصرح وأؤكد بهذا أنني تلقين				
التخدير المختلفة و/أو الانتقال من				
نلقيت شرحا بشأن الأعراض الجان	بية، المخاطر والمضاعفان	ن الوارد حصولها نتيجة لمختا	ف طرق التخدير الممكنة للـ	جراحة/ الإجراء، وفقا لما
هو مفصل أعلاه.				
أعطي موافقتي، بهذا، على إجراء	ולדבנת , ما عدا (למעט)			
نلقيت شرحا بأنه من الممكن فشل	إجراء التخدير، جراء محد	وديات البنية التشريحية لديّ،	والتي ليس بالإمكان توقع بع	ضها سلفا. من الممكن أن
لقيت شرحا بأنه من الممكن فشل بستدعي فشل إجراء التخدير، أحيا	نا، إعطاء علاجات من أج	ل ضمان عمل الأجهزة الحيوب	بة، وحتى القيام بإجر اءات م	ن أجل إنقاذ الحياة. وضح
لي أنه في مثل هذه الحالات من الد				and the second
أنا على علم، وأوافق على أن بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	تم القيام بالتخدير على الم أن تا التا على الم	فتلاف اشكاله، من فبل من	يتم إلقاء الامر على عاتقه، 	بموجب انظمه وتعليمات
المؤسسة، وأُنني لم أتلقّ أي وع المسؤم الفي المتعادة عليما في الم		او جرء منها، من قبل سح	ص محدد، وسریطه آل ید	م القيام بها بحسب سروط

الساعة (שעה)

توقيع الوصي (התימת האפוטרופוס) - في حال كان غير مكلف قانونيا، قاصرا أو مريضا نفسيا

توقيع المريض (חתימת החולה)

ושה ולפשים - ולפרוף (שם האפוטרופוס - קירבה)

ולדור בל (תאריך)

طلوب، وبأنه/ ـا قام/ت بالتوقيع على	, على المريض*، كل ما هو مذكور أعلاه بالتفصيل المه شرح بالكامل.	اصرّح بأنني شرحت شفهيا للمريض/ للوصي الموافقة أمامي، بعد أن اقتنعتُ بأنه/ L فهم/ت ال
رقم الرخصة (מס' רשיון)	توقيع الطبيب/ة (חתימת הרופא/ה)	וועה ול ושביי (שם הרופא (שם הרופא ווייה)
		* اشطب/ <u>ي</u> الزائد