

הנחיות לקראת הניתוח

אם במהלך השבועיים הקודמים לניתוח ילדתכם תעלה חום (מעל 38.5 מעלות) / תסבול משיעול עם ליחה / תתנהג כחולה / תחלה בקורונה - עליכם ליידע את המחלקה ולהמתין להחלטה בדבר קיום הניתוח או דחייתו למועד אחר.



אם מצבה הבריאותי של הילדה החמיר או התגלתה בעיה חדשה טרם מועד הניתוח, יש ליידע את המחלקה.



שש שעות לפני הניתוח - על ילדתכם להיות בצום ממזון מוצק.



ארבע שעות לפני הניתוח - יש להפסיק לשתות נוזלים לא צלולים כמו מיצים עם רכיבי פרי, חלב ותחליפי חלב כמו פורמולה.

עד שעה לפני הניתוח - מותר ואף מומלץ לשתות נוזלים צלולים כמו מיץ ממותק ללא רכיבי פרי, מים וטה.

שעה לפני הניתוח - יש להיות בצום מלא, ללא שתייה.



לא לשכוח להביא לפגישת טרום ניתוח

✓ מכתבי סיכום עדכניים מרופא ילדים או מרופא מומחה מטפל בילדתכם

✓ רשימת תרופות או את מארזי התרופות של ילדתכם

✓ בדיקות דם עדכנית (רק אם נדרשתם)

✓ תוצאות סיכומי בדיקות רלוונטיות

✓ טופס 17

