

הנחיות לקראת הניתוח

אם במהלך השבועיים הקודמים לניתוח ילדכם יעלה חום (מעל 38.5 מעלות) / יסבול משיעול עם ליחה / יתנהג כחולה / יחלה בקורונה - עליכם ליידע את המחלקה ולהמתין להחלטה בדבר קיום הניתוח או דחייתו למועד אחר.



אם מצבו הבריאותי של הילד החמיר או התגלתה בעיה חדשה טרם מועד הניתוח, יש ליידע את המחלקה.



שש שעות לפני הניתוח - על ילדכם להיות בצום ממזון מוצק.



ארבע שעות לפני הניתוח - יש להפסיק לשתות נוזלים לא צלולים כמו מיצים עם רכיבי פרי, חלב ותחליפי חלב כמו פורמולה.

שלוש שעות לפני הניתוח - יש לחדול מחלב אם, במידה וילדכם יונק או שותה חלב אם מבקבוק.

עד שעה לפני הניתוח - מותר ואף מומלץ לשתות נוזלים צלולים כמו מיץ ממותק ללא רכיבי פרי, מים וטה.

שעה לפני הניתוח - יש להיות בצום מלא, ללא שתייה.



לא לשכוח להביא לפגישת טרום ניתוח

✓ מכתבי סיכום עדכניים מרופא ילדים או מרופא מומחה מטפל בילדכם

✓ רשימת תרופות או את מארזי התרופות של ילדכם

✓ בדיקת דם עדכנית (רק אם נדרשתם)

✓ תוצאות סיכומי בדיקות רלוונטיות

✓ טופס 17

