
DIVISIÓN DE ANESTESIA



Antes de la cirugía de su hijo, por favor siga estas importantes instrucciones con precisión.





Si durante las dos semanas previas a la cirugía su hijo sufre de fiebre (más de 38.5 grados) / Tos con flema / quejas de malestar/se enferma de coronavirus - deben informar al departamento de cirugía y esperar una decisión con respecto a la operación o postergar para otra fecha.



Si se descubriera algún problema o empeoramiento de la condición médica del niño antes de la fecha de la cirugía, se debe informar al departamento quirúrgico.




Seis horas antes de la cirugía - su hijo debe empezar un ayuno de alimentos sólidos.

Cuatro horas antes de la cirugía - su hijo debe dejar de beber líquidos que no sean claros como jugo de fruta - con pulpa de fruta, leche y la fórmula.

Hasta una hora antes de la cirugía - está permitido e incluso recomendado beber líquidos claros como jugos endulzados claros (sin pulpa de fruta) agua y té



Una hora antes de la cirugía - el niño debe ayunar por completo, sin beber.





- Cartas con resúmenes actualizados de cada médico especialista que atiende a su hijo.
- Lista o cajas de los medicamentos que toma su hijo.
- Análisis de sangre actualizado.
- Resumen de análisis de pruebas relevantes.
- Formulario 17.

