



איכות הבדיקה בידיים שלך! נא לקרוא היטב את ההוראות ולהקפיד על כל השלבים.



3 ימים לפני הבדיקה

ארוחות קלות ושתייה מרובה



אסור לאכול / לשתות 🗙

כל סוגי הירקות והפירות (טריים, מבושלים או יבשים), מיני גרעינים, אגוזים ושקדים, סיבים תזונתיים וקטניות (שעועית, חומוס, אפונה, עדשים, פול, פולי סויה), דגנים מלאים, שיבולת שועל, תירס/פופקורן, בשר בקר.

מותר לאכול / לשתות

לחם לבן/פיתה/באגט (ללא דגנים, שומשום או פרג), פסטה, אורז לבן, קוסקוס, מוצרי חלב, ביצה, דגים, עוף ופסטרמה. יש להקפיד על כמויות קטנות.

<u>במקרה שיש ספק - אין ספק! אל תאכלו מה שאתם מתלבטים לגביו.</u>



במהלך היום יש לשתות לפחות 10-8 כוסות מים.



יש ליטול כדור לקסדין (LAXADIN) לפני השינה בכל ערב -3 ימים לפני ויומיים לפני הבדיקה.

יום לפני הבדיקה



בשעה 12:00 | ארוחת צהריים מותאמת לפי תפריט היום הקודם.

מותר לאכול / לשתות

לאחר ארוחת הצהריים - ניתן לאכול/לשתות נוזלים בלבד: מים, מיצי פירות מסוננים (ללא חתיכות פרי כמו מיץ תפוחים, מיץ ענבים וכו') , מרק צח, סודה ומשקאות מוגזים, ג'לי (ללא חתיכות פרי), קרטיבים (ללא חתיכות פרי), קפה ללא גרגירים/תה ללא חלב.



(LAXADIN) נטילת 2 כדורי לקסדין | 18:00



19:00 | שתיית התמיסה המרוקנת

יש לרוקן תכולת שקית אחת של פיקולקס לתוך כוס גדולה מים קרים, לערבב היטב במשך 2-3 דקות עד להמסה מלאה של האבקה במים ולשתות.

במידה והתמיסה התחממה ניתן לקרר אותה שוב ואז לשתות.

<u>לאחר מכן יש לשתות כוס שתייה צלולה כל שעה לפחות.</u> (בסה"כ כ 7-8 כוסות שתייה נוספות, לא רק מים אלא נוזל המכיל מלחים כגון מיץ צלול או מרק צח).

ביום הבדיקה



| שעות לפני מועד הבדיקה 5

שתיית המנה השניה של פיקולקס לפי אותם כללים.

<u>לדוגמא:</u>

<u>אם שעת הבדיקה היא 15:00 אחה"צ, יש לשתות את החומר ב 10:00 בבוקר.</u>

לאחר מכן יש לשתות עוד 8-7 כוסות של שתייה צלולה עד השעה 13:00 בבוקר.

שעתיים לפני הבדיקה |

תחילת צום מלא (גם לא לשתות).