מטה תרגיל מסכם: מבוא ללמ"ע - תרגיל #5

שאלה #1

(d) precent agreement (טעם לפי יאושב יו"מ בכ:

$$\frac{\Sigma a}{N} = \frac{\Sigma \text{ agreements}}{\#\text{tags}} = \frac{100 + 130 + 160}{250 + 200 + 450} = \frac{490}{900} \approx$$

$$\approx 0.54$$

(b)

(1) $\Sigma \text{ agreements} = 490 \quad (\Sigma a), \qquad N = 900$

(2)
- expected liberal agreement: $\frac{250 \times 300}{900} \approx 83.3$
- expected cons. agreement: $\frac{200 \times 200}{900} \approx 44.4$
- expected neutral agreement: $\frac{450 \times 400}{900} \approx 200$

$\Rightarrow \Sigma e \approx 83.3 + 44.4 + 200 = 327.7$

$\Rightarrow$ Kappa $= \frac{\Sigma a - \Sigma e}{N - \Sigma e} \approx \frac{490 - 327.7}{900 - 327.7} = \frac{162.3}{572.3} \approx 0.28$

החלטה פיזית

fair agreement!

(c) נניח שהמבקר אינו [מתוחכם] או

מתוחכם בשביל מטבעות:

(נניח שכל "מתוחכם" בכל אופן

מתפלגות בצורה אחידה שווה.

(תוחלת ואבדואר.)

		A			
תיוג מבקר		l	c	n	
	l	a_{11}	a_{12}	a_{13}	300
B	c	a_{21}	a_{22}	a_{23}	300
	n	a_{31}	a_{32}	a_{33}	300
		300	300	300	900

1) $\Sigma a = 490, \quad N = 900 \quad (\text{בכל או נניח.})$

2) $el = ec = en = \frac{300 \times 300}{900} = 100 \Rightarrow \Sigma e = 300$

$\Rightarrow$ Kappa $= (490 - 300)/(900 - 300) \approx 0.317$

(a) ה-p_value הוא הסיכוי לקבל את הנתונים שקיבלנו, בהנחה שהשערת האפס נכונה.

⊛ אם p < 0.05, הנתונים הם את האפס לטובה נפח שהערכים הגבוהים של X הם תוצאה פחות סבירה, ובה יש לדחות את השערת האפס, כלומר שהמטבע X הוא מוטה לטובת ערכים גבוהים אלא ...

⊛ אם p > 0.05, והנתונים לא יצאו לטובת הערכים הגבוהים של Y אז שקיבלנו היה תוצאה סבירה, ולא נדחה את השערת האפס. כלומר ש"המטבע Y הוא מוטה לטובת ערכים גבוהים אלא" נדחה.

← לכן נטען Y כי יצאן ותוצאת X הן מוטה, לכן נפסיל את (2)(3)

ונדחה ① שקיבלנו את שהציעו, בצורה זו.

(b) אם p < 0.05 ולא נדחה האפס, לכן נקבל תוצאה מובהקת:

⊛ חזור ונקח K חזרות, ואת הנתונים כדי ביניהם פולחים באחת ...

⊛ בזמן, לקחת הנתונים ונחזה את כאשר הנתונים הגבוהים יוצאים ...

⊛ לכן השאלה האם יצאו בצורה זו, אז הערכים של X הם K חזרות את יחס ... , לכן ... בין ... היא ... ,

מכיוון שהבדיקה אחת ... שונים, ואז ... אחרת

ליכן נוכל לחשב ... לכן אלא מטרה. לפי הבדיקה (4):

(a) ① השערת האפס: הנתונים מתוך ... ...
והערכים: ... יש ... ...

② נחשב את שגיאת האפס ... , כלומר: mean = 5,
standard error = $\frac{2.2}{\sqrt{100}} = 0.22$ ← standard deviation = 2.2

③ כיוון N = 100 לפי ... ,
הממוצע הוא 4.25

$$z = \frac{|(\text{sample - mean}) - (\text{hyp. mean})|}{\text{standard error}} = \frac{|4.25-5|}{0.22} \cong 3.41 \quad \text{④}$$

$p = 0.000325$ נקודת, $\alpha = 0.05$ ונאיר לפי p,

⑤ ואנקודת: $p < 0.05$, ונדחה את השערת האפס (בטעות).

(b) נחשב את ה-Confidence "חיזון" ב $\%$: (חישוב conf. level $= 95\% = 1.96$)

$$(\text{point estimate}) \pm (\text{conf. level} \times \text{standard error})$$

$$\Rightarrow \quad [4.25 - \underbrace{(1.96 \times 0.22)}_{0.4312}, \, 4.25 + (1.96 \times 0.22)] = [3.8188, 4.6812]$$

(c) מסתכלים על 95% כאשר נמצא ה Confidence, ונחזיר ט-5 כל
נאשר נוכל לדי פנ, עם 4.25 כאן נמצא ב חתוך ה conf. ל 5!
(אם שאין החזון את האפס בכל טעות, אלא שיש תוקף, הס כן נמצא בכהה (>5%)
ולכן שיש את האפס נחזיר (כיוון ק חיזוג אלא .) כאן כי נמצא שמאלה לכל ולתוצאה
(חיזוג - N בכהה.