

Laboratorium 9

Równania różniczkowe zwyczajne

Mateusz Król

22/05/2024 r.

Zadanie 1.

Przedstaw każde z poniższych równań różniczkowych zwyczajnych jako równoważny układ równań pierwszego rzędu (ang. *first-order system of ODEs*):

(a) równanie *Van der Pol'a*:

$$y'' = y'(1 - y^2) - y$$

(b) równanie *Blasius'a*:

$$y''' = -yy''$$

(c) II zasada dynamiki *Newton'a* dla problemu dwóch ciał:

$$y_1'' = -GM \cdot \frac{y_1}{(y_1^2 + y_2^2)^{3/2}}$$

$$y_2'' = -GM \cdot \frac{y_2}{(y_1^2 + y_2^2)^{3/2}}$$

Układy równań różniczkowych:

(a) równanie *Van der Pol'a*:

Podstawienia:

$$y_1 = y$$

$$y_2 = y'$$

Układ równań:

$$y_1' = y_2$$

$$y_2' = y_2(1 - y_2^2)$$

(b) równanie *Blasius'a*:

Podstawienia:

$$y_1 = y$$

$$y_2 = y'$$

$$y_3 = y''$$

Układ równań:

$$y_1' = y_2$$

$$y_2' = y_3$$

$$y_3' = -y_1 y_3$$

(c) II zasada dynamiki *Newton'a* dla problemu dwóch ciał:

Podstawienie:

$$y_3 = y_1'$$

$$y_4 = y_2'$$

Układ równań:

$$y_1' = y_3$$

$$y_2' = y_4$$

$$y_3' = -GM \cdot \frac{y_1}{(y_1^2 + y_2^2)^{3/2}}$$

$$y_4' = -GM \cdot \frac{y_2}{(y_1^2 + y_2^2)^{3/2}}$$

Zadanie 2.

Dane jest równanie różniczkowe zwyczajne

$$y' = -5y$$

z warunkiem początkowym $y(0) = 1$. Równanie rozwiązujemy numerycznie z krokiem $h = 0.5$.

Poniższa tabela przedstawia wartości czynników amplifikacji dla zadanego równania różniczkowego, dla każdej z omówionych metod. Wartości te świadczą o numerycznej stabilności tych metod.

Method	Amplification factor
Explicit Euler	-1.5
Implicit Euler	≈ 0.286
Trapezoidal	≈ -0.111
Modified Euler	1.625
RK4	≈ 0.648

Metody stabilne numerycznie dla zadanego równania to te, dla których wartość bezwzględna z czynnika amplifikacji jest mniejsza od 1. Są to metody: Implicit Euler, Trapezoidal, RK4.


Jawna metoda *Euler*'a jest niestabilna numerycznie dla zadanego parametru $h = 0.5$.

Wzór iteracyjny:

$$y_{n+1} = y_n + h_n \lambda y_n$$

Wartość przybliżonego rozwiązania tą metodą dla $t = 0.5$ wynosi $y = -1.5$.

Wykres wartości rozwiązania wykorzystując jawną metodę *Euler*'a:




Niejawna metoda *Euler*'a jest stabilna numerycznie dla zadanego parametru $h = 0.5$.

Wzór iteracyjny:

$$y_{n+1} = \frac{y_n}{1 - h_n \lambda}$$

Wartość przybliżonego rozwiązania tą metodą dla $t = 0.5$ wynosi $y \approx 0.286$.

Wykres wartości rozwiązania wykorzystując niejawną metodę *Euler'a*:



Zadanie 3.

Model *Kermack'a-McKendrick'a* przebiegu epidemii w populacji opisany jest układem równań różniczkowych:

$$S' = -\beta IS$$

$$I' = -\beta IS - \gamma I$$

$$R' = \gamma I$$

, gdzie:

S reprezentuje liczbę osób zdrowych, podatnych na zainfekowanie,

I reprezentuje liczbę osób zainfekowanych i roznoszących infekcję,

R reprezentuje liczbę osób ozdowiających.

Parametr β reprezentuje współczynnik zakaźności (ang. *transmission rate*).

Parametr γ reprezentuje współczynnik wyzdrowień (ang. *recovery rate*).

Wartość $\frac{1}{\gamma}$ reprezentuje średni czas choroby.

Założenia modelu:

- Przyrost liczby osób zakażonych jest proporcjonalny do liczby osób zakażonych oraz do liczby osób podatnych.
- Przyrost liczby osób odpornych lub zmarłych jest wprost proporcjonalny do liczby aktualnie chorych.
- Okres inkubacji choroby jest zanedbywalnie krótki.
- Populacja jest wymieszana.