

Relatório de Triagem Médica

Gerado a: 18/05/2026 22:39

Ficha do Doente

Identificação: Maria, 35 anos

Género: Feminino

Nível de Risco: Avaliação

Queixa Principal:

Estou com uma dor de ouvidos muito intensa há 3 dias e hoje reparei que começou a sair um líquido amarelado do ouvido. A dor não passa com o paracetamol.

Histórico Clínico (Registo de Conversa)

Assistente de Triagem:

Boa noite! Bem-vindo(a) ao serviço de triagem virtual.

Sou a assistente da Linha Saúde 24 e estou aqui para o/a ajudar a perceber melhor os seus sintomas e orientá-lo(a) nos próximos passos.

Para começarmos, podia dizer-me o seu nome, idade e com que género se identifica, por favor?

Doente:

Sou a Maria, tenho 35 anos, feminino.

Assistente de Triagem:

Muito obrigada, Maria! Fico contente por poder ajudá-la.

Agora preciso de perceber o que se passa consigo. Descreva-me o que está a sentir, incluindo há quanto tempo começou e se tem alguma doença crónica ou alergia.

Pode dizer tudo com calma, numa só mensagem ou aos poucos.

Doente:

Estou com uma dor de ouvidos muito intensa há 3 dias e hoje reparei que começou a sair um líquido amarelado do ouvido. A dor não passa com o paracetamol.

Assistente de Triagem:

Muito obrigada pela informação, Maria. A sua descrição é importante.

Para me ajudar a entender melhor a situação, gostaria de fazer algumas perguntas adicionais, com base nos protocolos

que temos:

1. Sobre o líquido amarelado que saiu do seu ouvido: Consegue descrever a consistência desse líquido? É mais aguado, espesso, ou tem alguma cor diferente do amarelo?
2. Sobre a dor: A dor é constante ou surge em momentos específicos? A dor irradia para outras áreas, como o pescoço ou a testa?
3. Sobre o paracetamol: Tomou o paracetamol conforme a dose indicada na embalagem?

Doente:

O líquido é um pouco espesso e amarelo. A dor é chata e constante, mas fica só focada dentro do ouvido, não espalha para mais lado nenhum. Tomei o paracetamol de 8 em 8 horas, alivia um bocadinho, mas a dor acaba sempre por voltar. Não tenho febre nenhuma nem tonturas.

Assistente de Triagem:

Muito obrigada pela informação detalhada, Maria. Com base no que me descreveu, e considerando que a secreção do ouvido é amarelada e espessa, e a dor é localizada, o protocolo mais provável é o de Conjuntivite Infecciosa (Viral ou Bacteriana).

No entanto, é importante descartar outras possibilidades.

Recomendações:

Não introduza nada no ouvido: Evite colocar cotonetes ou qualquer outro objeto no canal auditivo, pois pode piorar a situação.

Higiene: Lave as mãos frequentemente com água e sabão, especialmente após tocar no ouvido.

Compressas: Aplique compressas mornas na região do ouvido com um pano limpo e seco.

Consulta Médica: É fundamental que marque uma consulta com o seu médico de família o mais breve possível para uma avaliação completa.

Importante: Se a sua visão ficar turva gravemente, se sentir dor profunda no ouvido ou se a dor piorar rapidamente, procure imediatamente atendimento urgente.
