

## UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS

## Cálculo Diferencial e Integral — Lista 9 Prof. Adriano Barbosa

(1) Calcule os limites abaixo. Use a regra de L'Hospital quando possível. Se existir uma solução

(a) 
$$\lim_{x \to 1} \frac{x^2 - 1}{x^2 - x}$$

(b) 
$$\lim_{x \to 1} \frac{x^3 - 2x^2 + 1}{x^3 - 1}$$

(c) 
$$\lim_{x \to \frac{\pi}{2}^+} \frac{\cos x}{1 - \sin x}$$

(d) 
$$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{1+2x} - \sqrt{1-4x}}{x}$$

(e) 
$$\lim_{x \to 1} \frac{x^8 - 1}{x^5 - 1}$$

(f) 
$$\lim_{x \to 0} \frac{x3^x}{3^x - 1}$$

(g) 
$$\lim_{x \to \infty} x \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{x}\right)$$

(h) 
$$\lim_{x \to 0} (1 - 2x)^{\frac{1}{x}}$$

(i) 
$$\lim_{x \to 1^+} x^{\frac{1}{1-x}}$$

(j) 
$$\lim_{x\to 0^+} x^{\sqrt{3}}$$

- (2) Cada lado de um quadrado está aumentando a uma taxa de 6 cm/s. A que taxa a área do quadrado está aumentando quando sua área for 16 cm<sup>2</sup>?
- (3) Um tanque cilíndrico com raio de 5 m está sendo enchido com água a uma taxa de 3 m<sup>3</sup>/min. Quão rápido a altura da água está aumentando?
- (4) Uma luz de rua é colocada no topo de um poste de 6 metros de altura. Um homem com 2 m de altura anda, afastando-se do poste com velocidade de 1,5 m/s ao longo de uma trajetória reta. Com que velocidade se move a ponta de sua sombra quando ele está a 10 m do poste?
- (5) Está vazando água de um tanque cônico invertido a uma taxa de 10000cm<sup>3</sup>/min. Ao mesmo tempo, água está sendo bombeada para dentro do tanque a uma taxa constante. O tanque tem 6 m de altura e o diâmetro no topo é de 4 m. Se o nível da água estiver subindo a uma taxa de 20 cm/min quando a altura da água for 2 m, encontre a taxa segundo a qual a água está sendo bombeada dentro do tanque.
- (6) Suponha  $y = \sqrt{2x+1}$ , onde x e y são funções de t. Se  $\frac{dx}{dt} = 3$ , encontre  $\frac{dy}{dt}$  quando x = 4.
- (7) Dado que  $4x^2 + 9y^2 = 36$ , onde x e y são funções de t. Calcule  $\frac{dx}{dt}$  quando x = 2,  $y = \frac{2}{3}\sqrt{5}$  e
- (8) Uma partícula se move ao longo da curva  $y=2\,\mathrm{sen}\left(\frac{\pi x}{2}\right)$ . Quando a partícula passa pelo ponto  $\left(\frac{1}{3},1\right)$ , sua coordenada x cresce a uma taxa de  $\sqrt{10}$  cm/s. Quão rápido a distância da partícula à origem do sistema de coordenadas está variando nesse momento?
- (9) Um homem começa a andar para o norte a 1,2 m/s a partir de um ponto P. Cinco minutos depois uma mulher começa a andar para o sul a 1.6m/s de um ponto 200 m a leste de P. A que taxa as pessoas estão de distanciando 15 minutos após a mulher começar a andar?