

(a)
$f = 0$
$\hat{I}_{\mathrm{KSG}}(\eta_t; X_m)$
m_{lin}=-0.01
m_{quad}=0.05
$m^{\mathrm{G}}_{\mathrm{th}}$=0.00
$f = 10$
m_{lin}=0.49
m_{quad}=0.53
$m^{\mathrm{G}}_{\mathrm{th}}$=0.53
$f = 30$
m_{lin}=4.62
m_{quad}=4.71
$m^{\mathrm{G}}_{\mathrm{th}}$=4.77
$f = 60$
m_{lin}=17.32
m_{quad}=18.98
$m^{\mathrm{G}}_{\mathrm{th}}$=19.09
nats
(b)
$f = 0$
$\hat{I}_{\mathrm{KSG}}(\eta_t; X_t)$
m_{lin}=0.16
m_{quad}=0.18
$m^{\mathrm{G}}_{\mathrm{th}}$=0.07
$f = 10$
m_{lin}=0.70
m_{quad}=0.74
$m^{\mathrm{G}}_{\mathrm{th}}$=0.60
$f = 30$
m_{lin}=4.85
m_{quad}=5.06
$m^{\mathrm{G}}_{\mathrm{th}}$=4.84
$f = 60$
m_{lin}=17.60
m_{quad}=19.21
$m^{\mathrm{G}}_{\mathrm{th}}$=19.15
nats
Δt
$\times 10^{-3}$