
strict success per instance and solver, no classical fallback
augmented, $\varepsilon = 10^{-10}$, ideal
augmented, $\varepsilon = 0.3$, ideal + IR
augmented, $\varepsilon = 0.3$, 250 samples
augmented CKS, 10^4 samples
null space, $\varepsilon = 0.3$, ideal + IR
null space, $\varepsilon = 0.3$, 250 samples
HHL $n_c = 10$, ideal + IR
HHL $n_c = 10$, 250 samples
HHL $n_c = 8$, ideal + IR
yes
yes*
cap
readout
1
20
30
14
not run
tiny_A
$N = 4$
$\kappa_{\max} = 2 \cdot 10^3$
tiny_B
$N = 8$
$\kappa_{\max} = 1 \cdot 10^4$
tiny_C
$N = 8$
$\kappa_{\max} = 1 \cdot 10^3$
dense_noeq_
n10_k0_s0
$N = 30$
$\kappa_{\max} = 5 \cdot 10^3$
dense_kappa_
n10_k0_s0
$N = 32$
$\kappa_{\max} = 4 \cdot 10^4$
dense_kappa_
n10_k0_s1
$N = 32$
$\kappa_{\max} = 2 \cdot 10^4$
dense_kappa_
n10_k3_s0
$N = 32$
$\kappa_{\max} = 5 \cdot 10^5$
dense_kappa_
n10_k3_s1
$N = 32$
$\kappa_{\max} = 6 \cdot 10^5$