

2강 확률분포(1)

학습내용

1. 확률분포함수를 이해한다.
2. 기댓값과 분산을 이해한다.
3. 마코프 부등식을 이해한다.
4. 적률생성함수를 이해한다.

01 확률분포함수

1. 확률변수

- 이산형 확률변수
 - 확률변수의 가능한 값이 유한 개이거나 셀 수 있는 경우
 - 확률질량함수: $f(x) = P(X=x)$
 - 확률질량함수의 성질
 - $0 \leq f(x) \leq 1$
 - $\sum_{x=1}^n f(x) = 1$
 - $P(a \leq X \leq b) = \sum_a^b f(x)$
- 예) 불량품 3개, 양품 2개인 상자에서 2개의 제품을 꺼낼 때 불량품 수의 확률질량함수는?
 - $f(x) = \frac{{}_3C_x \cdot {}_2C_{2-x}}{{}_5C_2}, \quad x = 0, 1, 2$
- 연속형 확률변수
 - 확률변수의 가능한 값이 무한 개이며 셀 수 없는 경우
 - 연속형 확률변수의 분포를 결정하는 함수: 누적분포함수
 - $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt, \quad f(x) = \frac{d}{dx}F(x)$
 - 누적분포함수를 미분하면 확률밀도함수가 된다.
- 예) 10분 간격으로 출발하는 버스를 기다리는 시간의 확률밀도함수는?
 - $F(x) = P(X \leq x) = \frac{x-0}{10} = \frac{x}{10} = \int_0^x \frac{1}{10}dt$
 - 그런데,
 - $f(x) = \frac{d}{dx}F(x)$
 - 이므로

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{10} & \text{if } 0 \leq x \leq 10 \\ 0 & \text{if } x < 0 \text{ or } x > 10 \end{cases}$$

이다.

◦ 확률밀도함수의 성질

▪ $0 \leq f(x)$

▪ $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$

▪ $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$

• 예) 다음 확률밀도함수에서 C와 $P(1 < x < 2)$ 를 구하시오.

◦ $f(x) = \begin{cases} Ce^{-x} & \text{if } x \geq 0 \\ 0 & \text{if } x < 0 \end{cases}$

$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$

◦ 인데, $x < 0$ 인 경우 $f(x)=0$ 이므로

$\int_0^{\infty} f(x)dx = \int_0^{\infty} Ce^{-x}dx = 1$

이다.

◦ $\int_0^{\infty} Ce^{-x}dx = C \int_0^{\infty} e^{-x}dx = C [-e^{-x}]_0^{\infty} = C [0 - (-1)] = C = 1$

◦ C가 1이므로

◦ $P(1 < x < 2) = \int_1^2 e^{-x}dx = [-e^{-x}]_1^2 = -e^{-2} - (-e^{-1}) = e^{-1} - e^{-2}$

2. 기댓값

• 확률분포

◦ 확률변수 모든 값에 대응하는 확률을 나타내는 분포

▪ 이산형 확률변수: 확률질량함수

▪ 연속형 확률변수: 확률밀도함수

• 기댓값

◦ 분포의 무게중심(균형점)

▪ 이산형 확률변수:

$$E(X) = \sum_{x=0}^{\infty} xf(x)$$

▪ 연속형 확률변수:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

• 예) 동전을 2번 던져서 나온 앞면의 수의 기댓값은?

X	0	1	2
E(X)	1/4	1/2	1/4

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1$$

- 예) 다음 확률밀도함수를 가지는 X의 기댓값은?

$$f(x) = \begin{cases} 2(1-x) & \text{if } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{if } x < 0, x > 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^1 x \cdot 2(1-x) dx = \int_0^1 (2x - 2x^2) dx \\ &= \left[2 \cdot \frac{1}{2} x^2 - 2 \cdot \frac{1}{3} x^3 \right]_0^1 = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

3. 기댓값의 성질

- 기댓값의 성질
 - $E(aX+b) = aE(X) + b$
 - $E(g(X)+h(X)) = E(g(X)) + E(h(X))$

03 분산과 표준편차

1. 분산

- 분산(variance): 확률변수의 흩어져 있는 정도
 - $Var(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2) - (E(X))^2$
- 분산의 성질
 - $Var(aX + b) = a^2 Var(X)$

2. 표준편차

- 표준편차(standard deviation)
 - $Sd(X) = \sqrt{Var(X)}$
- 예) 동전을 2번 던져서 나온 앞면의 수의 분산과 표준편차는?

x	0	1	2
f(x)	1/4	1/2	1/4

$$E(X^2) = 0^2 \times \frac{1}{4} + 1^2 \times \frac{1}{2} + 2^2 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{2}$$

$$Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2}$$

$$Sd(X) = \sqrt{Var(X)} = \sqrt{\frac{1}{2}}$$

- 예) 다음 확률밀도함수를 가지는 X의 분산과 표준편차는?

$$f(x) = \begin{cases} 2(1-x) & \text{if } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{if } x < 0, x > 1 \end{cases}$$

$$E(X) = \int_0^1 x \cdot 2(1-x)dx = \int_0^1 (2x - 2x^2)dx$$

$$= \left[2 \cdot \frac{1}{2}x^2 - 2 \cdot \frac{1}{3}x^3 \right]_0^1 = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \int_0^1 x^2 \cdot 2(1-x)dx - \frac{1}{3}^2$$

$$= \int_0^1 (2x^2 - 2x^3)dx - \frac{1}{9}$$

$$= \int_0^1 (2x^2 - 2x^3)dx - \frac{1}{9} = \left[2 \cdot \frac{1}{3}x^3 - 2 \cdot \frac{1}{4}x^4 \right]_0^1 - \frac{1}{9}$$

$$= \frac{2}{3} - \frac{2}{4} - \frac{1}{9} = \frac{12 - 9 - 2}{18} = \frac{1}{18}$$

04 마코프 부등식

1. 체비셰프 부등식

- 체비셰프(Chebyshev) 부등식

- 확률변수

$$X \sim (\mu, \sigma^2), \quad \sigma^2 < \infty$$

, k : 양의 상수

$$\Rightarrow P(|X - \mu| \geq k) \leq \frac{\sigma^2}{k^2}$$

- 증명

$$\begin{aligned} P(|X - \mu| \geq k) &= \int_{|X - \mu| \geq k} f(x) dx = \int I_{|X - \mu| \geq k} f(x) dx \\ &= E(I_{|X - \mu| \geq k}) \leq E(I_{|X - \mu| \geq k} \cdot \frac{(X - \mu)^2}{k^2}) \leq E(\frac{(X - \mu)^2}{k^2}) = \frac{\sigma^2}{k^2} \end{aligned}$$

2. 마코프 부등식

- 마코프(Markov) 부등식

- 체비셰프 부등식을 일반화 한 것

- 확률변수

$$X, \quad E(|X|^r) < \infty, \quad r, k > 0$$

$$\Rightarrow P(|X| \geq k) \leq \frac{E(|X|^r)}{k^r}$$

- $r=1$ 일 때 증명

$$P(|X| \geq k) \leq \frac{E(X)}{k}$$

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^\infty x f(x) dx = \int_0^k x f(x) dx + \int_k^\infty x f(x) dx \\ &\geq \int_0^k x f(x) dx + k \int_0^k f(x) dx \geq k \int_0^k f(x) dx = kP(X \geq k) \end{aligned}$$

3. 분산의 계산

- 예) X 가 다음 확률밀도함수를 가질 때

$$P(|X - \mu_X|) \geq \frac{3}{2} \sigma_X$$

의 상한값은?

$$f(x) = \frac{1}{2\sqrt{3}}, \quad -\sqrt{3} < x < \sqrt{3}$$

- 체비셰프 부등식을 활용하려면

$$\sigma_X^2$$

을 계산해야 한다.(그래야 k 를 알 수 있으니까)

$$\sigma_X^2$$

- 을 계산하려면

$$\mu_X$$

를 계산해야 한다.

$$\mu_X = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} x \cdot \frac{1}{2\sqrt{3}} dx = \left[\frac{1}{2} x^2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{3}} \right]_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} = 0$$

$$\mu_X$$

- =0 이므로,

$$\begin{aligned} \sigma_X^2 &= Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = E(X^2) \\ &= \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} x^2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{3}} dx = \left[\frac{1}{3} x^3 \cdot \frac{1}{2\sqrt{3}} \right]_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \\ &= \left[\frac{3\sqrt{3}}{3} - \left(-\frac{3\sqrt{3}}{3} \right) \cdot \frac{1}{2\sqrt{3}} \right] = 1 \end{aligned}$$

- 주어진 식

$$P(|X - \mu_x| \geq \frac{3}{2} \sigma_X)$$

에서 $\mu=0, \sigma=1$ 이라고 하면,

$$k = \frac{3}{2}$$

- 이다.

- 체비셰프 부등식:

$$P(|X - \mu| \geq k) \leq \frac{\sigma^2}{k^2}$$

과

$$\sigma_X = 1, k = \frac{3}{2}$$

이라는 사실을 적용하면,

$$P(|X - \mu_X| \geq \frac{3}{2}) \leq \frac{1^2}{(\frac{3}{2})^2} = \frac{4}{9}$$

- 임을 알 수 있다.

- 따라서, 상한값은 4/9 이다.

05 적률생성함수

1. 적률생성함수의 정의

- k차 적률(moment)
 - $E(X^k) = \begin{cases} \sum_x x^k f(x), & \text{discrete} \\ \int_{-\infty}^{\infty} x^k f(x) dx, & \text{continuous} \end{cases}$
 - 1차 적률: 기대값
 - 2차 적률: 분산(흩어짐)
 - 3차 적률: 왜도(치우침)
 - 4차 적률: 첨도(뾰족한 정도)
- 적률생성함수(moment generating function, mgf)
 - 0을 포함한 열린 구간의 t에 대해서
 $E(e^{tk}) < \infty$
일 때,
$$M(t) = E(e^{tk}) = \begin{cases} \sum_x e^{tk} f(x), & \text{discrete} \\ \int_{-\infty}^{\infty} e^{tk} f(x) dx, & \text{continuous} \end{cases}$$

2. 적률생성함수의 성질

- 적률생성함수가 존재하면 모든 적률이 존재
 - $M(0) = 1$
 - $M'(0) = E(X)$
 - $M^{(k)}(0) = E(X^k)$
- 두 확률변수 X, Y의 적률생성함수가 존재하고, 0을 포함한 열린 구간에서 일치하며 두 확률변수 X, Y의 분포가 일치
 - $M_x(t) = M_y(t), \quad \forall t : -h < t < h (h > 0)$
 $\Leftrightarrow f_x(x) = f_y(y)$

3. 적률생성함수의 예

- 예) 확률변수 X의 확률분포가 다음과 같을 때 X의 적률생성함수와 기댓값은?

	0	1	2	3
f(x)	1/6	1/3	1/3	1/6

- 풀이)
 - 적률생성함수는

$$M(t) = E(e^{tx}) = e^{t \cdot 0} \cdot \frac{1}{6} + e^t \cdot \frac{1}{3} + e^{2t} \cdot \frac{1}{3} + e^{3t} \cdot \frac{1}{6}$$

$$= \frac{1}{6} + \frac{1}{3}e^t + \frac{1}{3}e^{2t} + \frac{1}{6}e^{3t}$$

- 적률생성함수의 1차미분식에 t=0을 대입하여 기대값을 구한다

$$M'(0) = \left[\frac{1}{3}e^t + \frac{1}{3}2e^{2t} + \frac{1}{6}3e^{3t} \right]_{t=0}$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{2}{3} + \frac{3}{6} = \frac{3}{2}$$

- 이것은

$$E(X) = \sum_{x=0}^3 xf(x)$$

식을 활용하여 구한 기대값과 동일하다.

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{6} + 1 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{3} + 3 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

- 예) 확률변수 X의 확률분포가 다음과 같을 때 X의 적률생성함수와 기대값은?

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

- 풀이)

- 적률생성함수는 다음과 같이 구한다.

$$M(t) = E(e^{tx}) = \int_0^{\infty} e^{tx} \cdot e^{-x} dx$$

$$= \int_0^{\infty} e^{x(t-1)} dx = \left[\frac{1}{t-1} e^{x(t-1)} \right]_{t=0}^{t=\infty}$$

$$= 0 - \frac{1}{t-1} = \frac{1}{1-t}$$

- 참고로 x에 곱해지는 t-1이 0보다 작아야만 x가 무한대일 때 전체 식의 값이 0이 되기 때문에 t-1<0 을 충족해야 한다.
- 기대값을 구해보자

$$E(X) = [M'(t)]_{t=0} = \left[-\frac{-1}{(1-t)^2} \right]_{t=0} = 1$$

06 정리하기

- 확률분포는 이산형 확률변수의 경우 확률질량함수로, 연속형 확률변수의 경우 확률밀도함수로 결정된다.
- 기댓값은 확률분포의 무게중심(균형점)이다.
- 분산으로 확률분포가 흩어져 있는 정도를 측정한다.
- 마코프 부등식은 확률분포의 상한을 제시한다.
- 적률생성함수가 존재하면 확률변수의 적률을 구할 수 있고, 확률분포와 대응한다.