

Chimie organique — corpus de fixtures de Fouine

Chapitre premier. La chromatographie en phase gazeuse sert ici de premier terme témoin, choisi assez long pour qu'un préfixe de quatre lettres ait un sens. L'enthalpie de réaction ouvre le chapitre et ne sera reprise que bien plus loin ; entre les deux viennent la pression, la température, le volume molaire, la constante des gaz parfaits, le coefficient de compressibilité, le facteur d'excentricité et la fugacité, soit largement plus de dix mots. Gibbs n'arrive qu'ici, en fin de page, et c'est voulu. Le polymère linéaire clot le chapitre.

Chapitre deux. Additions electrophiles

La règle de Markovnikov gouverne l'addition électrophile des hydracides sur un alcène dissymétrique : le proton se fixe sur le carbone le plus hydrogéné. L'énoncé date de 1870 et reste exact tant qu'aucun peroxyde n'entre en jeu.

Cette page porte l'expression exacte que la recette recherche.

Chapitre trois. Grandeurs thermodynamiques

L'enthalpie libre de Gibbs decide du sens spontane d'une reaction :

les deux mots sont ici a trois mots l'un de l'autre, et c'est ce que

la recherche de proximite doit savoir distinguer de la page un.

La separation chromatographique des enantiomeres en decoule.

La sublimation du diiode illustre le meme raisonnement applique a un

changement d'etat : c'est le mot rare de ce corpus, celui sur lequel

la recherche floue est mise a l'epreuve.

Chapitre quatre. Effet des peroxydes

Markovnikov avait énoncé sa loi avant qu'on ne sache la contourner : une règle, disait-il, souffre toujours son exception. En présence de peroxydes l'addition s'inverse et le proton se fixe sur le carbone le moins hydrogéné.

Le polymère obtenu par réticulation radicalaire en est l'application industrielle la plus courante.