

SH.GSR.29.IMT.04			رقم السياسة
التحكم في استخدام الاختصارات والرموز الطبية			عنوان السياسة
١	رقم الإصدار	٢٠٢٦/٠٣/٠١	تاريخ إعداد
٢٠٢٦/٠٤/٠١	تاريخ اعتماد	٢٠٢٦/٠٤/٠١	تاريخ تفعيل
١٤	عدد الصفحات	٢٠٢٩/٠٤/٠١	تاريخ المراجعة
جميع الاقسام بالمستشفى			نطاق التفعيل
اعتماد	مراجعة	إعداد	
مدير المستشفى د/ وسام وهيبه	لجنة الجودة د/ ايمان سامي	رئيس الهيئة الطبية د/ محمد عبد الفتاح مدير التموين الطبي د/ انجي الكاشف فريق الجودة د/ باسل محمد - م/ ولاء سيد	



د/ ايمان سامي السيد
 مديرة الجودة
 مستشفى صيدناوى

السياسة

- يُسمح فقط باستخدام الاختصارات والرموز المدرجة في قائمة "الاختصارات المعتمدة" الخاصة بالمستشفى.
- يُمنع منعاً باتاً استخدام أي اختصار مدرج في قائمة "الاختصارات المحظورة" في أي مكان داخل الملف الطبي.
- يُمنع منعاً باتاً استخدام أي نوع من الاختصارات (سواء معتمدة أو غير معتمدة) في إقرارات الموافقة المستنيرة **Informed Consents**؛ أو في أي تقارير أو مخلصات الخروج أو كروت المتابعة التي يتم تسليمها للمريض وذويه. يجب كتابة التشخيص والإجراء الطبي كاملاً بلغة واضحة يفهمها المريض.
- يُمنع منعاً باتاً استخدام أي نوع من الاختصارات (سواء معتمدة أو غير معتمدة) في أي مخاطبات تخص المريض للجهات الخارجية الرسمية على سبيل المثال لا الحصر "الجهات القضائية وجهات التحقيق" أو الجهات الغير رسمية على سبيل المثال لا الحصر "مستشفى أخرى أو عند تحويل المريض لتلقي خدمة غير متوفرة بالمستشفى أو في حالة المطالبات المالية للطرف الثالث"
- يتم تطوير قوائم الاختصارات ومراجعتها كلما دعت الحاجة
- يحذر استخدام أي لغة اجنبية غير اللغة الإنجليزية

الغرض

- توحيد لغة التواصل الطبي بين جميع مقدمي الرعاية الصحية داخل المستشفى.
- الحد من الأخطاء الطبية، وخاصة الأخطاء الدوائية الناتجة عن سوء الفهم أو القراءة الخاطئة للاختصارات.
- حماية سلامة المرضى من خلال التخلص التام من الاختصارات والرموز والجرعات الكسرية الخطرة.

التعريفات

الاختصارات المعتمدة (Approved Abbreviations): هي قائمة بالاختصارات والرموز المتفق عليها علمياً وإدارياً والمسموح باستخدامها في التوثيق الطبي داخل المستشفى.

الاختصارات المحظورة (Do-Not-Use Abbreviations): هي قائمة بالاختصارات والرموز التي يمنع منعاً باتاً استخدامها في أي توثيق طبي نظراً لخطورتها العالية واحتمالية تسببها في أضرار للمرضى

إجراءات العمل

- يتم تحديد قائمة الاختصارات المسموحة والممنوع استخدامها في المستشفى بواسطة رؤساء الاقسام الطبية والصيدلى الاول ثم يتم عرضها على لجنة إدارة الدواء ولجنة الهيئة الطبية كلا فيما يخصه لاعتمادها
- يتم عرض القوائم بعد اعتمادها على لجنة الجودة لآخذ الموافقة النهائية عليها
- تعتمد القوائم بعد الموافقة النهائية من قبل مدير عام المستشفى
- يتم توزيع قائمة الاختصارات المسموحة والممنوع استخدامها على جميع الاقسام الطبية بالمستشفى للعمل بها

عند كتابة الأوامر الطبية:

يلتزم الطبيب بقائمة الاختصارات المتاحة في كل قسم من اقسام المستشفى

يمكن للطبيب الاستعانة بأداة البحث للتعرف على طريقة كتابة الاختصارات ب شكل مماثل للسياسة من خلال البحث داخل الأداة والتأكد من القائمة الموجودة داخل القسم



- يجب على الطبيب استخدام الكلمات الكاملة بدلاً من الاختصارات المحظورة (مثل كتابة Unit بدلاً من U.)
- يجب الالتزام بقواعد الأرقام العشرية:

○ ممنوع استخدام الصفر الزائد (Trailing Zero)

▪ 5.0 mg ممنوع

▪ 5 mg مسموح

○ إلزامي استخدام صفر البداية (Leading Zero) للكسور

▪ 5. mg ممنوع

▪ 0.5 mg مسموح

عند اكتشاف اختصار محظور أو غير مفهوم (من قبل الصيدلي أو الممرض):

- إيقاف التنفيذ: التوقف فوراً عن صرف أو إعطاء الدواء/العلاج.
- الاستيضاح: التواصل المباشر أو الهاتفي مع الطبيب الكاتب للأمر أو الطبيب المسؤول لتوضيح الأمر.

○ التدوين والقراءة العكسية Read Back : في حال التوضيح الهاتفي، يقوم المتلقي بكتابة الأمر الصحيح (بدون اختصار) وقراءته على الطبيب للتأكيد.

- يتم تعديل التوثيق في نموذج الأوامر الشفهية والهاتفية ويتم امضاه من قبل الطبيب في خلال الشيفت
- يتم عمل نموذج OVR و تسليمه لإدارة الجودة

المسؤول عن التنفيذ

- الأطباء
- الصيادلة
- التمريض

المراقبة والتقييم

- KPI: يتم عمل كارت لمؤشر له علاقة بعملية مرتبطة بالسياسة مع متابعة تحقيق الهدف المراد و نسبته الناتجة من قيمة المؤشر عند القياس لضمان التحسين المستمر
- المرور الدوري من قبل فريق الجودة
- التدريب والحرص على معرفة جميع المسؤولين عن التنفيذ بالسياسة ومعاييرها وكيفية التطبيق

النماذج / المرفقات

- قائمة الاختصارات المسموحة والممنوعة

معايير ذات صلة

IMT.08 Patient's Medical record Management, OGM.12 Billing System , IMT.09 Medical Record Review, PCC.08 Informed consent , MMS.11 Ordering, prescribing, transcribing

المراجع

- دليل معايير اعتماد المستشفيات - الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) ، إصدار ٢٠٢٥ . معيار IMT.04

قائمة بالاختصارات المسموحة

حسب سياسة المستشفى

Abbreviation	Mean
AAA	Abdominal Aortic Aneurysm
ABG	Arterial blood gases
ACLS	Advanced cardiac life support
ACPC	Assisted control pressure control
ACS	Acute coronary syndrome
Active assiss Exs	Active assisted exercises
Active Resis Exs	Active resisted exercises
ACVC	Assisted control volume control
ADL	Activity of daily life
AF	Atrial Fibrillation
AIDS	Acquired immune deficiency syndrome
AKI	Acute kidney injury
ALB	Albumin
ALL	Acute Lymphocytic Leukemia
ALP	Alkaline phosphatase
ALS	Advanced life support
ALT	Alanine aminotransferase
Am/ amal	Amalgam
AMI	Acute myocardial infarction
ANA	Antinuclear Antibody
APTT	Activated Partial Thromboplastin Time
ARDS	Adult Respiratory Distress Syndrome
ASD	Atrial Septal Defect
ASOT	Anti-streptolysin o titer
AST	Aspartate aminotransferase
BA	Bronchial Asthma
BAL	Broncho alveolar lavage
BBB	Bundle Branch Block
Be	Base Excess
BEAE	Bilateral equal air entry
BiPAP	Bi-level positive airway pressure
BLS	Basic life support
BMI	Body mass index
BP	Blood Pressure
BPH	Benign Prostatic Hypertrophy
BUN	Blood urea Nitrogen
C & S	Culture & Sensitivity

C/O	Complaint Of
CA	Calcium
Ca I Ca 2+	Calcium ionized
Ca T	Calcium total
CABG	Coronary Artery Bypass Graft
CAD	Coronary Artery Disease
CAP	Community acquired pneumonia
Cap	Capsule
CAUTI	Catheter associated urinary tract infection
CBC	Complete blood count
CBD	Common Bile Duct
CBG	Capillary Blood glucose
CCC	Chronic calculous cholecystitis
CCU	Coronary care unit
CEA	Carcinoembryonic Antigen
CHD	Congenital heart disease
CHF	Congestive heart failure
Chol	Cholesterol
CKD	Chronic kidney disease
CLABSI	Central line associated bloodstream infection
CLD	Chronic liver disease
Cm	Centimeters
CML	Chronic Myelogenous Leukaemia
CMV	Cytomegalovirus
CMV	Cytomegalovirus
CNS	Central Nervous System
Comp	Composite
COP	Cardiac output
COPD	Chronic obstructive lung disease
CP	Cerebral Palsy
CPAP	Continuous positive airway pressure
CPAP	Continuous Positive Airway Pressure
CPK	Creatinine Phosphokinase
CRP	C – Reactive protein
CPR	Cardiopulmonary Resuscitation
CR	Crown
CRF	Chronic Renal Failure
CS	Cesarean section
CSF	Cerebrospinal Fluid
CT	Computed Tomography
CTPA	Computed Tomography of pulmonary artery
CTUT	Computed Tomography of urinary tract

CUA	Complete Urine Analysis
CVA	Cerebrovascular Accident
CVC	Central Venous Catheter
CVL	Central Venous Line
CVP	Central Venous Pressure
CVS	Cardiovascular System
CXR	Chest x ray
DCM	Dilated cardiomyopathy
DCL	Disturbed Conscious Level
DIC	Disseminated Intravascular Coagulation
DKA	Diabetic ketoacidosis
AKA	Alcoholic ketoacidosis
DM	Diabetes mellitus
DTP	Diphtheria, Tetanus, Pertussis
DTENS	Deep transcutaneous electrical nerve stimulation
DVT	Deep venous thrombosis
DX	Diagnosis
EBV	Epstein-bar virus
ECG	Electrocardiogram
ECHO	Echocardiography
EEG	Electroencephalogram
ETT	Endotracheal tube
EMG	Electromyogram
ENDO	Endodontic
ENT	Ear, Nose and Throat
ERCP	Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography
ESR	Erythrocyte sedimentation rate
ESRD	End stage renal disease
ET	Endotracheal Tube
ex	exercise
Ext	Extraction
FB	Foreign Body
FBS	Fasting blood sugar
FC	Fully conscious
FDP	Fibrinogen Degradation Products
FEV	Forced Expiratory Volume
FFP	Fresh Frozen Plasma
Fill	Filling
FiO2	Fraction of Inspired Oxygen
FIV	Forced Inspiratory Volume
FSH	Follicle stimulating hormone
FT₃	Free Triiodothyronine

FT₄	Free thyroxine
FUO	Fever of unknown origin
Fx	Fracture
G6PD	Glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency
GCS	Glasgow coma scale
GERD	Gastro-esophageal Reflux disease
GFR	Glomerular Filtration Rate
GGO	Ground glass opacity
GI	Gastro-intestinal
HAP	Hospital Acquired pneumonia
HAV	Hepatitis A virus
Hb	Hemoglobin
HbA_{1c}	Glycosylated Hemoglobin
HbsAg	Hepatitis B Surface Antigen
HBV	Hepatitis B Virus
HCC	Hepatocellular carcinoma
HCT	Hematocrit
HCV	Hepatitis C virus
HFNC	High flow nasal canula
HFNO	High flow nasal oxygen
He	Hemorrhage
HIV	Human immunodeficiency virus
HPV	Human papilloma virus
HR	Heart rate
Hr	Hour
HRS	Hepatorenal syndrome
HSV	Herpes Simplex Virus
HTN	Hypertension
HUS	Hemolytic uremic syndrome
Hx	History
IBW	Ideal body weight
ICH	Intracranial hemorrhage
ICM	Ischemic cardiomyopathy
ICU	Intensive care unit
IDDM	Insulin dependent diabetes millets
IHD	Ischemic heart disease
INR	International normalized ratio
IR	Infra-red radiation
IVH	Interventricular hemorrhage
IVIg	Intravenous immunoglobulin
JL	Jugular line
K	Potassium

KFTs	Kidney function tests
LFTs	Liver function tests
L	Lower
LA	Lower anterior
LL	Lower left
Loc	Local anesthesia
LP	Lumbar puncture
LR	Lower right
Mand	Mandibular
Max	Maxilla
MDR	Multidrug resistant
MENS	Microcurrent electrical nerve stimulation
MI	Myocardial infarction
MMR	Measels, Mumps, and rubella
MO	Mediocre occlusal
MOD	Mesio occluso distal
MP	Moist pack
MRI	Magnetic resonant imaging
MRSA	Methicillin resistant staph aureus
MV	Mechanical ventilation
Na	Sodium
NA	Not applicable
NAD	No abnormality detected
NC	Nasal cannula
NE	Norepinephrine
NGT	Nasogastric tube
NIDDM	Non-insulin dependent diabetes mellitus
NIV	Non-invasive ventilation
PD	Periodontal debridement
PPV	Positive pressure ventilation
NPO	Nothing per os
NSAID	Non-steroidal anti-inflammatory drus
PAUS	Pelviabdominal ultrasound
P_{AW}	Airway pressure
PC	Pressure control
PCI	Percutaneous coronary intervention
PE	Pulmonary embolism
PEEP	Positive end expiratory pressure
PEG	Poly ethylene glycol
PL	Peripheral line
PLT	Platelets
P_{PEAK}	Peak pressure

P_{PLAT}	Plateau pressure
PRN	As needed
PSGN	Post streptococcal glomeruli-nephritis
PT	Prothrombin time
PTH	Parathyroid hormone
PTT	Partial thromboplastin time
RA	Room air
RBCs	Red blood cells
RBS	Random blood sugar
RCT	Root canal treatment
RHD	Rheumatic heart disease
ROM	Range of motion
RR	Respiratory rate
RTA	Road Traffic Accident
Rx	Recipe
SBP	Spontaneous bacterial peritonitis
SDH	Subdural hemorrhage
SGPT	Serum Glutamic Pyruvic Transaminase
SGOT	Serum Glutamic-Oxaloacetic Transaminase
STD	Sexually transmitted disease
Surg	Surgery
SVT	Supraventricular tachycardia
SW	Short wave
S1	Heart sound one
S2	Heart sound two
tab	Tablet
TB	Tuberculosis
TD	Transdermal
TEMP	Temperature
TSH	Thyroid stimulating hormone
TTP	Thrombotic thrombocytopenic purpura
U	Upper
UA	Upper anterior
UL	Upper left
UR	Upper right
UOP	Urine output
URI	Upper respiratory infection
US	Ultrasound
UTI	Urinary tract infection
VBG	Venous blood gases
VRE	Vancomycin resistant enterococci
VRSA	Vancomycin resistant staph aureus

V _T	Tidal volume
VTE	Venous thromboembolism
WBCs	White blood cells
XDR	Extended spectrum resistant
م	مساء
ص	صباحا
ظ	ظهرا
ن	نبض
ح	حرارة
ض	ضغط
سم	سنتيمتر
مل	مليمتر
ق	قرص
أ	امبول
م.ملح	محلول ملح
ج5%	جلوكوز 5%

References:

- 1- FDA (Food and Drug administration)
- 2- Irwin and Rippe intensive care medicine text book
- 3- Oxford handbook of clinical medicine
- 4- AHA guideline for BLS 2020

قائمة بالاختصارات المسموحة

حسب مؤسسة

ISMP

الاختصار (ممنوع)	المعنى المقصود	ملاحظات / البديل الصحيح
cct	Cubic centimeters	يُساء فهمها كـ u (units)، البديل: استخدم mL
IU	International unit(s)	يُساء فهمها كـ IV (وريدي) أو الرقم ١٠، البديل: اكتب unit(s) كاملة
ML	Liter / Milliliter	حرف l الصغير يُساء فهمه كالرقم ١، البديل: استخدم L للتر و mL للمليتر
K أو M / M أو MM	Million / Thousand	يحدث خلط بين الآلاف والملايين، البديل: اكتب thousand أو million
ng أو Ng	Nanogram	يُساء فهمها كـ mg أو أنبوب معدي (nasogastric)، البديل: استخدم nanogram
U أو u	Unit(s)	يُساء فهمها كصفر أو ٤، مما يسبب جرعة زائدة (مثال U٤ تُقرأ ٤٠)، البديل: اكتب unit(s)
Mg	Microgram	يُساء فهمها كـ mg، البديل: استخدم mcg
AD, AS, AU	Right ear, left ear, each ear	يُساء فهمها كقطرات للعين (OD, OS, OU)، البديل: اكتب right ear, left ear, each ear
IN	Intranasal	يُساء فهمها كـ IM أو IV، البديل: استخدم intranasal
IT	Intrathecal	يُساء فهمها كاستنشاق أو intratumor، البديل: استخدم intrathecal
OD, OS, OU	Right eye, left eye, each eye	يُساء فهمها كقطرات للأذن، البديل: اكتب right eye, left eye, each eye
Per os	By mouth, orally	مقطع os يُساء فهمه كالعين اليسرى (OS)، البديل: استخدم PO أو orally
sub q أو SC, SQ, sq	Subcutaneous(ly)	يُساء فهمها كـ SL (تحت اللسان) أو every، البديل: استخدم SUBQ أو subcutaneous
OD أو .o.d	Once daily	يُساء فهمها كالعين اليمنى (OD)، البديل: استخدم daily
.Q.D., QD, q.d أو qd	Every day	يُساء فهمها كـ q.i.d. (أربع مرات)، البديل: استخدم daily
Qhst / Ont	Nightly at bedtime	يُساء فهمها كـ qhr (كل ساعة)، البديل: استخدم QHS أو qhs
Q.O.D., QOD, qod أو .q.o.d	Every other day	يُساء فهمها كـ qd أو qid، البديل: استخدم every other day
q1d	Daily	يُساء فهمها كـ qid، البديل: استخدم daily

يُساء فهمها كـ every 6 hours، البديل: استخدم daily at 6 PM	Every evening at 6 PM	q6PM
يُساء فهمها كمضادات الاكتئاب، البديل: استخدم sliding scale (insulin)	Sliding scale regular insulin	SSRI
يُساء فهمها كـ Strong Solution of Iodine، البديل: استخدم sliding scale (insulin)	Sliding scale insulin	SSI
يُساء فهمها كـ ٣ مرات باليوم / مرتين باليوم، البديل: استخدم ٣ times weekly / 2 times weekly	٣ times a week / 2 times a week	TIW / BIW
يُساء فهمها كـ unit dose، البديل: استخدم as directed	As directed	UD
خطأ في تحديد التوأم والجنس، البديل: استخدم اسم الام و جنس الطفل	Baby boy A / Baby girl B	BBA / BGB
قد تؤدي لإيقاف الأدوية مبكراً، البديل: استخدم discharge أو discontinue كاملة	Discharge or discontinue	D/C
يُساء فهمها كـ IV، البديل: استخدم injection	Injection	IJ
يُساء فهمها كقطرات عين (OD/OS)، البديل: استخدم orange juice	Orange juice	OJ
يُساء فهم النقطة كالرقم ١، البديل: استخدم mg, mL بدون نقطة بالنهاية	mg or mL	النقطة بعد الاختصار (مثال. mg)
حدوث خلط بين أدوية الفيروسات، البديل: اكتب اسم الدواء كاملاً	Antiretroviral medications	DOR, TAF, TDF
غير معروف كـ acetaminophen، البديل: اكتب اسم الدواء كاملاً	acetaminophen	APAP
يتم الخلط بينهما، البديل: اكتب اسم الدواء كاملاً	angiotensin II / antithrombin III	AT II / AT III
يُساء فهمها كـ azithromycin، البديل: اكتب اسم الدواء كاملاً	zidovudine	AZT
يُساء فهمها كـ chlorproMAZINE، البديل: اكتب اسم الدواء كاملاً	Compazine	CPZ
يُساء فهمها كـ tincture of opium، البديل: اكتب اسم الدواء كاملاً	diluted tincture of opium	DTO
يتم الخلط بينهما، البديل: اكتب اسم الدواء كاملاً	hydrocortisone / hydroCHLOROthiazide	HCT / HCTZ
يُساء فهمها كـ morphine sulfate، البديل: اكتب اسم الدواء كاملاً	magnesium sulfate	MgSO4
يُساء فهمها كـ magnesium sulfate، البديل: اكتب اسم الدواء كاملاً	morphine sulfate	MS, MSO4
يُساء فهمها كـ mitoXANTRONE، البديل: اكتب اسم الدواء كاملاً	methotrexate	MTX
يُساء فهمها كـ لا يوجد مضاد تخثر، البديل: اكتب اسم الدواء كاملاً	novel/new oral anticoagulant	NOAC

يُساء فهمها ك oxyCODONE، البديل: اكتب اسم الدواء كاملاً	oxytocin	OXY
يُساء فهمها كمسكنات، البديل: اكتب اسم الدواء كاملاً	procainamide	PCA
يُساء فهمها ك Pitressin، البديل: اكتب اسم الدواء كاملاً	Pitocin	PIT
يُساء فهمها ك penicillin VK، البديل: اكتب اسم الدواء كاملاً	prenatal vitamins	PNV
يُساء فهمها ك Purinethol، البديل: اكتب اسم الدواء كاملاً	propylthiouracil	PTU
يُساء فهمها ك liothyronine، البديل: اكتب اسم الدواء كاملاً	Tylenol with codeine No. 3	T3
يتم الخلط بينهما، البديل: اكتب اسم الدواء كاملاً	triamcinolone, tacrolimus	tac أو TAC
يُساء فهمها ك TPA، البديل: اكتب اسم الدواء كاملاً	TNKase	TNK
يُساء فهمها ك TNK أو TXA، البديل: اكتب اسم الدواء كاملاً	tissue plasminogen activator	PA أو TPA
يُساء فهمها ك TPA، البديل: اكتب اسم الدواء كاملاً	tranexamic acid	TXA
يُساء فهمها ك morphine sulfate، البديل: اكتب اسم الدواء كاملاً	zinc sulfate	ZnSO4
يُساء فهمها ك nitroprusside، البديل: اكتب اسم الدواء كاملاً	nitroglycerin infusion	Nitro drip
يُساء فهمها ك Invanz، البديل: اكتب اسم الدواء كاملاً	Intravenous vancomycin	IV vanc
يُساء فهمها ك Levophed، البديل: اكتب اسم الدواء كاملاً	levofloxacin	Levo
يُساء فهمها ك neostigmine، البديل: اكتب اسم الدواء كاملاً	Neo-Synephrine	Neo
خطأ في المكونات، البديل: اكتب أسماء الأدوية كاملة	Coined names for compounded products	الأسماء المجمعة (مثال Banana bag)
يُساء فهم الرقم كأنه الجرعة الموصوفة، البديل: اكتب الاسم دون الرقم	Number embedded in drug name	رقم مدمج (مثال ٥- fluorouracil)
يُساء فهمها ك ١ أو ٢ قرص، البديل: استخدم كلمة half tablet	Half tablet	tablet ٢/١
يُساء فهمها ك حرف V أو الرقم ١٠، البديل: استخدم الأرقام العربية	٥	الأرقام الرومانية (مثال V)
يُساء فهمها ك ٥ mg، البديل: ضع صفراً قبل العلامة العشرية (٠,٥)	mg ٠,٥	عدم وجود صفر أولي (مثال ٥.)
يُساء فهمها ك ١٠ mg، البديل: لا تستخدم أصفاراً زائدة (١ فقط)	mg ١	الصفير الزائد (مثال ١٠,٠)
خطأ في فهم الجرعة، البديل: استخدم الكمية لكل حجم	Ratio expression	النسب (مثال ١:١,٠٠٠)
يُساء فهم الجرعة، البديل: التزم بخانات النموذج	Drug name and dose run together	اسم الدواء متصل بالجرعة

يُساء فهمها بزيادة أصفار، البديل: التزم بخانات النموذج	Numerical dose and unit run together	الجرعة متصلة بالوحدة
يُساء فهمها، البديل: استخدم الفواصل ١٠٠,٠٠٠	Large doses without commas	جرعات كبيرة بدون فواصل (١٠٠٠٠٠)
يُساء فهم الرموز كأرقام، البديل: استخدم النظام المتري (mL)	Dram / Minim	٣ أو رمز minim
يُساء فهمها كـ 1 Administer، البديل: استخدم عبارة صريحة	Administer once	x1
يُساء فهمها كحرف T أو أرقام، البديل: استخدم كلمتي increase / decrease	Increase and decrease	↑ و ↓
يُساء فهمها كالرقم ١، البديل: استخدم كلمة and	Separates two doses	/
يُساء فهمها كالرقم ٢، البديل: استخدم كلمات at أو and	At / And	@ أو &
يُساء فهمها كالرقم ٤، البديل: استخدم plus	Plus or and	+
يُساء فهمها كصفر، البديل: استخدم hr أو hour	Hour	°
يُساء فهمها كأرقام أخرى، البديل: استخدم ٠ أو zero	Zero	Ø
البديل: استخدم النظام المتري (kg)	Pound(s)	#
غير آمنة طبيًا، البديل: استخدم النظام المتري حصراً	Apothecary or Household Abbreviations	gr, dr, min, oz, tsp, tbs

REFERENCE: Institute for Safe Medication Practices