

SH.GSR.22.IPC.04			رقم السياسة
سياسة غسيل الايدي			عنوان السياسة
2	رقم الإصدار	2026/03/01	تاريخ إعداد
2026/04/01	تاريخ اعتماد	2026/04/01	تاريخ تفعيل
11	عدد الصفحات	2029/04/01	تاريخ المراجعة
جميع الاقسام بالمستشفى			نطاق التفعيل
اعتماد		مراجعة	إعداد
مدير المستشفى د/ وسام وهيبه		لجنة الجودة د/ ايمان سامي	فريق مكافحة العدوى



د/ ايمان سامي السيد
 مديرة الجودة
 مستشفى سيدناوى

السياسة

يلتزم العاملون بجميع الأقسام بغسل الأيدي بطريقة صحيحة تبعاً للإجراء المتخذ مع المريض.

الغرض

التأكد من القيام بالإجراءات دون أي ملوثات تنقل عن طريق الأيدي أثناء التعامل مع المريض.

التعريفات

- غسل اليدين بالماء والصابون: غسل اليدين باستخدام الماء والصابون العادي مناسب لمعظم الأنشطة التقليدية، يقوم الصابون مع الفرك والشطف الجيد بإزالة الأوساخ والمواد العضوية والجراثيم المؤقتة بواسطة الحركة الميكانيكية
- الدلك بالكحول:
 - هو تطهير الأيدي بالدلك بالكحول أو المحلول الكحولي (الكلوروكسيدين في قاعدة كحولية)
 - لا بد أن تكون اليدين غير متسختين ظاهرياً وفي حال اتساخهما يجب غسل الأيدي بالماء والصابون أولاً
- الغسل الجراحي: هو غسل اليدين بالماء ومطهر رغوي مثل (الايودوفورات والكلوروكسيدين) للتخلص من الميكروبات المؤقتة وتقليل الفلورا الطبيعية
- التطهير الجراحي لليدين
 - هو استخدام محلول مركب من الكحول وأي مطهر آخر مثل الكلوروكسيدين استعداداً للتدخل الجراحي
 - يتم استخدام البيتادين 7.5% في حالة عدم توافر المحلول الكحولي
 - يجب غسل اليدين جيداً بالماء الجاري والصابون العادي قبل الدلك كما سبق شرحه

إجراءات العمل

دواعي الغسل بالماء والصابون:

- قبل بدء العمل.
- قبل وبعد أي تعامل مع المريض لا يخترق دفاعات الجسم (الإجراءات غير العميقة) .
- بعد القيام بالتدخلات العميقة.

- بعد التعامل العادي بين كل مريض وآخر.
- بعد الإجراءات التي تتزايد فيها احتمالات تلوث اليدين بالميكروبات مثل التعامل مع الأغشية المخاطية أو الدم وسوائل الجسم.
- عند لمس الأسطح المحتمل تلوثها بالميكروبات مثل حاويات قياس البول وأجهزة تجميع الإفرازات
- عند رعاية المرضى المصابين أو المشكوك بإصابتهم بالإسهال المعدي حيث لا يوجد تأثير فعال للكحول على الميكروب المسبب للمرض
- بعد استعمال الحمام أو المرحاض.
- بعد خلع القفازات
- قبل و بعد تقديم أو تناول الطعام أو الشراب.
- قبل مغادرة العمل.
- خطوات الغسل بالماء والصابون:-
- يقوم مقدم الخدمة الطبية بخلع جميع المجوهرات والحلى
- يقوم مقدم الخدمة الطبية بفتح صنوبر الماء الجاري بمنشفة أحادية الاستخدام.
- يقوم مقدم الخدمة الطبية بتعريض اليدين لتيار الماء وضع كمية مناسبة من المنظف السائل و يصل إلى اليدين بصورة جيدة،
- مدة الفرك بالصابون او المادة المنظفة من 40-60 ثانية مع الأخذ في الاعتبار زيادة هذه المدة إذا ما كانت اليدين متسختان بصورة واضحة، مع الاهتمام بالمناطق الموجودة تحت الأظافر مع مراعاة قص الأظافر
- ، حيث يزيد عدد الجراثيم في هذه المناطق.
- يقوم مقدم الخدمة الطبية بشطف اليدين باستخدام ماء الصنوبر الجاري حتى يتم إزالة الصابون بالكامل ويحظر وضع اليدين في الماء الراكد.
- يقوم مقدم الخدمة الطبية بإغلاق الصنوبر باستخدام الكوع أو فوطة التجفيف أحادية الاستخدام بعد الانتهاء من تجفيف اليدين.

• تجفيف الأيدي.:

- تعتبر المناديل الورقية هي أفضل طريقة لتجفيف اليدين
- يمكن استخدام الفوط القماشية بشرط أن تستخدم لمرة واحدة فقط ولا يعاد استخدامها إلا بعد إعادة معالجتها
- يحذر استخدام مجففات الهواء الساخن في أماكن الرعاية الصحية لأنها تساعد على نقل العدوى بنشر الرذاذ المتطاير
- توضع الوسيلة المستخدمة في تجفيف اليدين في مكان يكون في متناول الشخص القائم بغسل اليدين وبمناى عن التلوث الذي ينتج من الرذاذ المتطاير.
- توضع سلة تحت الحوض للتخلص من المناشف أحادية الاستخدام أو سلة لجمع الفوط القماشية أحادية الاستخدام لحين إعادة معالجتها.

• الحوض المخصص لغسل الأيدي:

- يتم تخصيص حوض لغسيل الأيدي.
- يحظر استخدامه لأي غرض آخر.

• حالة اليدين و الأظافر:

- ينبغي أن تكون الأظافر قصيرة ويتم تقليمها في شكل دائري وغير مطلية بأي طلاء، كما يحظر الاستخدام الروتيني لفرشاة الأظافر لتنظيفها
- الحفاظ على خلو اليدين والأظافر من أي التهابات.
- منع استخدام الأظافر الصناعية.

• الصابون:

- يفضل استخدام الصابون السائل الموضوع في حاوية مغلقة في مكان مناسب على الحوض، ويجب أن تكون الحاوية مغطاة،

- تقوم ممرضة القسم أو مساعدة التمريض بوضع كمية تكفي فقط نوبة العمل الواحدة ، وعند انتهاء نوبة العمل

- تقوم ممرضة القسم أو مساعدة التمريض بالتخلص من كمية الصابون المتبقية وغسل الحاوية وتجفيفها وإعادة ملئها من جديد.

- في حالة استخدام الصابون العادي، يفضل استخدام القطع الصغيرة والتي يمكن تغييرها بشكل مستمر، مع الأخذ في الاعتبار استخدام صابونة مفرغة غير مسمطة ويتم تنظيفها بشكل دوري

• دواعي ذلك بالكحول او المحلول الكحولي

• الأنشطة الاكلينيكية مثل

• قبل الشروع في التدخلات العميقة التي تخترق دفاعات الجسم أو إدخال أي جهاز يصل إلى منطقة معقمة بالجسم مثل (تركيب قسطرة بولية)

• قبل تضميد الجروح.

• قبل رعاية المرضى الأكثر عرضة للعدوى مثل (ضعيفي المناعة-حديثي الولادة – حالات زرع النخاع – زرع الكلى – أمراض الدم).

• قبل خلط المحاليل والأدوية الوريدية.

• طريقة ذلك اليدين بالكحول او المحلول الكحولي:

• يقوم مقدم الخدمة الطبية بخلع جميع المجوهرات والحلي وتشمير الأكمام وفتح الصنبور

• يقوم مقدم الخدمة الطبية بتعريض اليدين والرسغين والساعدين لتيار الماء حتى ما تحت الكوع.

ويشترط تجفيف اليدين جيدا قبل وضع المادة المطهرة

• يتم وضع 3-5 ملل من الكحول او المحلول الكحولي في باطن إحدى اليدين، على أن يتم ذلك الأيدي والأصابع بعضهما ببعض مع التأكد من الوصول إلى جميع أجزاء اليدين

- يقوم مقدم الخدمة الطبية بذلك لمدة 20-30 ثانية ثم يترك حني يجف تماما
- يجب اتباع تعليمات التصنيع فيما يتعلق بكمية المطهر وزمن التلامس اللازم لإتمام مفعوله
- دواعي غسل اليدين الجراحي:
- يلزم القيام بغسل اليدين الجراحي بالمطهرات قبل القيام بالعمليات الجراحية.
- كما يفضل غسل اليدين الجراحي عند الشروع في بعض الإجراءات الهامة مثل تركيب القسطرة الوريدية المركزية والقسطرة البولية إن أمكن.
- خطوات غسل اليدين الجراحي:
- يقوم مقدم الخدمة الطبية بخلع جميع المجوهرات والحلي وتشمير الأكمام حتى ما فوق الكوع بمسافة مناسبة،
- يقوم مقدم الخدمة الطبية بفتح صنبور الماء.
- يقوم مقدم الخدمة الطبية تعريض اليدين والساعدين إلى ما فوق الكوع للماء الجاري.
- يقوم مقدم الخدمة الطبية بوضع كمية مناسبة من المادة المطهرة مثل البيتادين الرغوي بتركيز 7.5% في باطن إحدى اليدين.
- يقوم مقدم الخدمة الطبية بالبدء بأطراف الأصابع في إحدى اليدين ثم غسل ما بين الأصابع والاستمرار من أطراف الأصابع إلى ما فوق الكوع. وتكرر هذه العملية باليد والذراع الآخرين.
- يقوم مقدم الخدمة الطبية بمواصلة الغسل لمدة 5 دقائق على الأقل قبل اول عملية في اليوم ولمدة 3:5 دقائق على الأقل قبل العمليات التالية أن يتم ذلك اليدين والمرفقين بحركة دائرية مع رفع اليدين إلى أعلى فوق مستوى الكوع.
- يقوم مقدم الخدمة الطبية بشطف كل ذراع على حدة بدءاً بأطراف الأصابع مع رفع اليدين أعلى مستوى الكوع

• يقوم مقدم الخدمة الطبية باستخدام منشفة معقمة للتجفيف، حيث يستخدم أحد جانبي المنشفة لتجفيف

إحدى اليدين والجانب الآخر لتجفيف اليد الأخرى (يجب مراعاة جعل اليدين فوق مستوى الخصر وعدم لمس أي شيء قبل لبس الرداء المعقم والقفازات المعقمة الخاصة بالجراحة).

• فرك الأيدي بالكحول ممتد التأثير استعداداً للتدخل الجراحي: كحول بتركيز من 60% إلى 95 %

• خطوات فرك الأيدي بالكحول:

• يقوم مقدم الخدمة الطبية بغسل الأيدي جيداً باستخدام الماء الجاري والصابون العادي قبل القيام

بغسل الأيدي بالمحلول الكحولي بنفس الطريقة والخطوات السابقة

• يقوم مقدم الخدمة الطبية بتجفيف الأيدي جيداً ثم صب حوالي 3:5 ملي من الكحول في احد الكفين.

• يقوم مقدم الخدمة الطبية فرك الأيدي بالكحول والتأكد من وصوله إلى المناطق الموجودة أسفل

الأظافر وأعلى الساعد.

• يقوم مقدم الخدمة الطبية فرك الأيدي بالكحول والتأكد من وصوله إلى المناطق الموجودة أسفل

الأظافر وأعلى الساعد.

المسؤول عن التنفيذ

- طبيب إداري القسم.

- الأطباء بجميع الفئات.

- مشرفة القسم.

- التمريض.

المراقبة والتقييم

• KPI : يتم عمل كارت لمؤشر له علاقة بعملية مرتبطة بالسياسة مع متابعة تحقيق الهدف المراد و نسبته

الناجمة من قيمة المؤشر عند القياس لضمان التحسين المستمر

• تقوم المستشفى بتتبع وجمع وتحليل والإبلاغ عن البيانات المتعلقة بعملية غسيل الأيدي بجميع انحاء المستشفى

• تعمل المستشفى على فرص التحسين المحددة في عملية غسيل الأيدي

• اللحظات الخمسة

معايير ذات صلة

IPC.02: IPC program, risk assessment, guidelines, IPC.06: Detergents, antiseptics, and disinfectants, WFM.08:

Continuous Education Program, QPI.06: Clinical Performance Measures, WFM.09: Staff Performance Evaluation.

المراجع

الدليل القومي لمكافحة العدوى 2020

دليل معايير اعتماد المستشفيات - الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) ، إصدار 2025 . معيار IPC.04

نموذج طريقة غسل الأيدي:-

- 1- يتم خلع الحلى والمجوهرات والساعة .
- 2- يتم فتح الصنبور بالكوع أو بالقدم أو باليد أيهما متاح مع تعريض اليدين لتيار الماء الدافئ .



- 3- يتم استخدام مادة منظفة مثل الصابون أو البيتادين 7.5% بحيث يصل إلى اليدين بصورة جيدة على أن يتم على جميع أجزاء اليد .



- 4- يتم وضع الأصابع بطريقة متشابكة مع ذلك ذهابا وإيابا لمدة 30 ثانية على الأقل مع إزالة الإلتصاخ من تحت الأظافر باستخدام أظافر اليد الأخرى
- 5- يتم ذلك مقدمة الأصابع اليد الواحدة في باطن اليد الأخرى والعكس .



- 6- يتم ذلك الدائري للإبهام الأيمن في قبضة راحة اليد اليسرى والعكس .



- 7- يتم الشطف الجيد للأيدي تحت ماء جارى وممنوع وضع اليد في الحوض أو الماء الراكد .
- 8- يتم تجفيف الأيدي بالفوطاة التى تستخدم مرة واحدة تلك التى تغسل بالمغسلة بماء ساخن وصابون أو بالفوطاة الورقية أحادية الإستخدام .





اللحظات الخمسة

