Ders 28 Çalışma Özeti

Ders 28 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Ders tarihi: 6 Ocak 2021 Çarşamba. Dönemin son dersi, final öncesi soru çözümü.
- Çözülen sorular "2020 Yaz - Final Mazeret MAT1071" sınavından. Hoca: Mazeret sınavlarında sorular biraz daha zor gelir.
- Konular:
  - Hacim (kabuk ve pul yöntemi), dönme ekseni parametreli soru.
  - Sınırsız bölgenin döndürülmesi (has olmayan integralle hacim).
  - Riemann toplamından belirli integrale geçiş.
  - Zincir kuralı, lineerleştirme ve temel teorem.
  - Parametreli has olmayan integral.
  - Yay uzunluğu, trigonometrik dönüşüm, ekstremum.
  - Yeni konu: $\tan(x/2) = t$ dönüşümü (Weierstrass dönüşümü).
- Finalde hangi konulardan kaç soru gelebileceğine dair hocanın tahmini.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- **Baştan sona sorumlusunuz:** Finalde en baştaki konulardan da soru gelebilir.
- **Temel eğrileri çizebilmek önemli:** Logaritmik, üstel, parabolik ve trigonometrik eğrileri çalışın.
- **Yarıçap pozitif olmalı:** y negatif olan bölgede de kabuk yarıçapı $b - y$ çıkar. Böylece integrali ikiye bölmeye gerek kalmaz.
- **Derse katılım:** "Başarı, birim zamanda yapılan sorumlulukların, fedakârlıkların miktarıdır. Kolay yolu tercih etmeyin."
- **Has olmayan integral:** Has olmayan integrallerle ilgili en az iki soru bekleniyor. Biri yorum tipi (öncüllü) soru olacak; hoca bunun ihtimaline %98 diyor.
- **Zincir kuralı sorusu:** Benzer bir sorunun gelme ihtimali "en az %75".
- **Weierstrass dönüşümü:** Gelme ihtimali düşük (%10-20). Ama test sınavında seçici soru olarak sorulabilir.
- **Çalışma sırası:** Önce aşağıdaki tahmin listesindeki konulara çalışın. Sonra geçmiş yılların diğer soru tiplerine bakın.
- **Dosya:** Hoca derste çözülen soru dosyasını Zoom sohbetinden paylaştı. Öğrencilerin dosyayı birbirleriyle paylaşabileceğini söyledi.

Kısa Tekrar Notları

- **Kabuk yöntemi,** $x = -b$ **etrafında:** yarıçap $b + x$ ($x \geq 0$, $b > 0$).
- **Yatay çubuk,** $y = b$ **etrafında:** yarıçap $b - y$. y negatif de olsa bu ifade doğrudur.
- **Riemann toplamı:** $\Delta x = \dfrac{b-a}{n}$, $x_k = a + k\,\Delta x$.

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} f(x_k)\,\Delta x = \int_a^b f(x)\,dx$$

- **Weierstrass dönüşümü:** $t = \tan\dfrac{x}{2}$ ise:

  - $\sin x = \dfrac{2t}{1+t^2}$
  - $\cos x = \dfrac{1-t^2}{1+t^2}$
  - $dx = \dfrac{2\,dt}{1+t^2}$
  - Bu dönüşüm, $\sin x$ ve $\cos x$ içeren rasyonel ifadeleri rasyonel fonksiyon integraline çevirir.
- **Hocanın final tahmini (en kötü ihtimalle):**

Konu	Beklenen soru sayısı
Alan	En az 1
Hacim	2-3
Yay uzunluğu	En az 1
Yüzey alanı	1
Rasyonel fonksiyonların integrali	1
Trigonometrik dönüşüm	En az 1
Has olmayan integral	1 kesin, 2. için %50-60
Temel teorem (fundamental theorem)	1 (%95 üstü)
Ortalama değer teoremleri (türev ve integral)	%80 üstü
L'Hôpital ve temel teorem birlikte	1

- Hocaya göre en az 10 soru 2. vizeden sonraki konulardan gelecek. Bu sayı 12-13'e çıkabilir.
- Soruların yaklaşık %70'i integrallerle ilgili olacak.
- Bir öğrenci indirgeme formüllerini (reduction formulas) sordu. Hoca: "Vizede gelmediyse gelme ihtimali var."

Detaylı Açıklamalar

Soru 3: Dönme ekseni bilinmeyen hacim sorusu

- **Soru:** R bölgesi $y = 2 - x^2$, $y = x$ ve $x = 0$ ile sınırlı. R, $x = -b$ ($b > 0$) doğrusu etrafında döndürülünce hacim $\dfrac{11\pi}{2}$. b kaçtır?
- **Kesişim:** $2 - x^2 = x \Rightarrow x = 1$ (bölgede). Bölge $0 \le x \le 1$.
- **Kabuk yöntemi:** Dikey çubuk dönme eksenine paraleldir.
  - Yarıçap $b + x$, yükseklik $(2 - x^2) - x$, kalınlık dx.

$$\frac{11\pi}{2} = 2\pi \int_0^1 (b + x)(2 - x - x^2)\,dx$$

- $\displaystyle\int_0^1 (2 - x - x^2)\,dx = \frac{7}{6}$, $\displaystyle\int_0^1 x(2 - x - x^2)\,dx = \frac{5}{12}$.
- $2\pi\left(\dfrac{7b}{6} + \dfrac{5}{12}\right) = \dfrac{11\pi}{2} \Rightarrow b = 2$.
- Hoca hesabı ödev bıraktı ve cevabın 2 olduğunu söyledi.

Sınırsız bölge: $y = \ln x$**,** $x = 0$**,** $y = b$

- **Soru:** Bölge $y = b$ doğrusunun altında, $y = \ln x$ ile $x = 0$ (y ekseni) arasında. $y = b$ doğrusu etrafında döndürülünce hacmi veren integral hangisidir?
- Bölge aşağı doğru sınırsız. Bu yüzden integral has olmayan bir integral olacak.
- **Kabuk yöntemi (yatay çubuk):**
  - Sağ uç hep $y = \ln x$, yani $x = e^y$ üzerinde. Sol uç hep $x = 0$ üzerinde. Tek integral yeter.

- Yarıçap: $b-y$. Bölgenin $y>0$ kısmında da, $y<0$ kısmında da aynı ifade çıkar. $y<0$ iken uzaklık $b+(-y)=b-y$ olur.
- Yükseklik: $e^y-0=e^y$. Kalınlık dy.

$$V=2\pi\int_{-\infty}^{b}(b-y)\,e^y\,dy$$

- Bu integral hesaplanırsa $V=2\pi e^b$ çıkar (kısmi integrasyon ve limit).
- Doğru şık B.

Soru 9: Lineerleştirme ve temel teorem (tahtadan)

- **Soru:** $h(x)=1+x+(x-2)\displaystyle\int_{-2}^{x}\left[(\sin t)^{2019}(\cos t)^{2020}-1\right]dt$ fonksiyonunun $x=2$'deki lineerleştirmesi hangisidir?
- $h(2)=3$.
- Temel teorem 1. kısım ve çarpım kuralıyla: $h'(x)=1+\displaystyle\int_{-2}^{x}g(t)\,dt+(x-2)\,g(x)$.
- $h'(2)=1+\displaystyle\int_{-2}^{2}\left[(\sin t)^{2019}(\cos t)^{2020}-1\right]dt$.
  - $(\sin t)^{2019}(\cos t)^{2020}$ tek fonksiyondur, simetrik aralıkta integrali 0.
  - $\displaystyle\int_{-2}^{2}(-1)\,dt=-4$.
- $h'(2)=-3$, $L(x)=3-3(x-2)=-3x+9$. Cevap A.
- Hoca bu tür sorular için "Temel teorem 1 ve 2'yi çalışın" dedi.

Soru 10: $y=x^2$ ve $y=3x$ arasındaki bölge, $x=-5$ etrafında

- **Soru:** Kabuk yöntemiyle hacmi veren integral hangisidir?
- Bölgede x ve y pozitif. Kesişim $x=0$ ve $x=3$.
- Yarıçap $x+5$, yükseklik $3x-x^2$ (üst uç eksi alt uç), kalınlık dx.

$$V=2\pi\int_{0}^{3}(x+5)(3x-x^2)\,dx$$

- Cevap E.

Soru 11: Riemann toplamı

- **Soru:** $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2}$ kaçtır?
- n^2 ortak paranteze alınır:

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2}=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2}\cdot\frac{1}{n}$$

- $\Delta x=\dfrac{1}{n}=\dfrac{1-0}{n}$ seçilir. O zaman $a=0$, $b=1$, $x_k=\dfrac{k}{n}$, $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$.

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}f(x_k)\Delta x=\int_{0}^{1}\frac{dx}{1+x^2}=\frac{\pi}{4}$$

- **Bir öğrencinin sorusu: "Neden 0'dan 1'e?"**

- Sigma'da değişken k'dır; n'ye bağlı her şey sabittir.
- $\frac{1}{n}$ ifadesi $\frac{b-a}{n}$ olarak okunur.
- $a=1$, $b=2$ de seçilebilir ama o zaman fonksiyonu kurmak zorlaşır. $a=0$, $b=1$ seçimi x_k'yi en kolay verir.

Zincir kuralı sorusu (tahtadan)

- **Soru:** f türevlenebilir, $f(1)=-3$, $f'(1)=4$. $y=f(xy^2+f(x^2))+5$ ise $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(1,2)}$ kaçtır?
- İki tarafın türevi alınır. y'nin x'e bağlı olduğu unutulmaz:

$$y' = f'(xy^2+f(x^2))\cdot(y^2+2xy\,y'+f'(x^2)\cdot 2x)$$

- $(1,2)$ noktasında iç ifade: $1\cdot 4+f(1)=4-3=1$.
- $y'=4\,(4+4y'+4\cdot 2)=48+16y' \Rightarrow y'=-\frac{16}{5}$.
- Cevap B. Hoca hesabı öğrencilere bıraktı.

Soru 15: Parametreli has olmayan integral (tahtadan)

- **Soru:** $t>0$ için $\int_0^t \frac{dx}{(2-x)^2}$ hakkında hangi ifadeler doğrudur?
  - I. $t<2$ için yakınsar.
  - II. $t>2$ için $+\infty$'a ıraksar.
  - III. $t>2$ için $-\infty$'a ıraksar.
  - IV. $t=2$ için yakınsar.
- **I:** $t<2$ ise $[0,t]$ aralığında integrandı tanımsız yapan nokta yok. Olağan integraldir, yakınsar. Doğru.
- **II:** $t>2$ ise $x=2$ iç süreksizlik noktasıdır. İntegral iki limite ayrılır:

$$\lim_{t_1\to 2^-}\int_0^{t_1}\frac{dx}{(2-x)^2}+\lim_{t_2\to 2^+}\int_{t_2}^{t}\frac{dx}{(2-x)^2}$$

- Belirsiz integral: $\int \frac{dx}{(2-x)^2}=\frac{1}{2-x}+C$.
- Integrand pozitif, limitler $+\infty$ verir. II doğru, III yanlış.
- **IV:** $t=2$'de de süreksizlik var, integral ıraksar. Yanlış.
- Cevap C (yalnız I ve II).

Soru 17: Yay uzunluğu (tahtadan)

- **Soru:** $y=\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{4}\ln x$, $1\le x\le 2$ eğrisinin uzunluğu nedir?
- $f'(x)=x-\frac{1}{4x}$.
- $1+[f'(x)]^2=1+x^2-\frac{1}{2}+\frac{1}{16x^2}=x^2+\frac{1}{2}+\frac{1}{16x^2}=\left(x+\frac{1}{4x}\right)^2$.
- Tam kare olduğunu görmek sorunun anahtarı.

$$L=\int_1^2\left(x+\frac{1}{4x}\right)dx=\left[\frac{x^2}{2}+\frac{1}{4}\ln x\right]_1^2=\frac{3}{2}+\frac{1}{4}\ln 2$$

- Cevap A.

Soru 18: Trigonometrik dönüşüm

- **Soru:** $\displaystyle\int \frac{x^2}{\sqrt{4+x^2}}\,dx$ integraline uygun trigonometrik dönüşüm uygulanınca hangi integral elde edilir?
- a^2+x^2 biçimi arctan'ın türeviyle ilişkilidir. Uygun dönüşüm $x = 2\tan\theta$.
  - Bir öğrenci sec dönüşümünü önerdi. Hoca: sec dönüşümü $x^2 - a^2$ biçimi içindir.
- $dx = 2\sec^2\theta\,d\theta$, $\sqrt{4+4\tan^2\theta} = 2\sec\theta$.

$$\int \frac{4\tan^2\theta \cdot 2\sec^2\theta}{2\sec\theta}\,d\theta = \int 4\tan^2\theta\sec\theta\,d\theta$$

- Cevap A.

Hacim: $y = 2x - x^2$ ve x ekseni arasındaki bölge

- Parabolün kökleri $x = 0$ ve $x = 2$.
- y **ekseni etrafında (kabuk):**

$$V = 2\pi\int_0^2 x\,(2x - x^2)\,dx = \frac{8\pi}{3}$$

- Cevap C.
- **Hocanın ek varyasyonları:**
  - $x = -2$ etrafında: $V = 2\pi\displaystyle\int_0^2 (x+2)(2x-x^2)\,dx$.
  - $x = 3$ etrafında: $V = 2\pi\displaystyle\int_0^2 (3-x)(2x-x^2)\,dx$.
  - $y = -2$ etrafında döndürülseydi pul yöntemi uygun olurdu, çünkü dikey çubuk dönme eksenine dik olur.

Ekstremum: parçacığın en büyük hızı

- **Soru:** Bir parçacığın hız fonksiyonu $v(t)$ verilmiş. $[0,2]$ aralığında en büyük hız nedir?
- Hoca türevi $v'(t) = \dfrac{(t-1)^2}{t^2+1}$ biçiminde buldu. Bu ifade hiçbir yerde negatif değil.
- v artan bir fonksiyon. En büyük hız aralığın sağ ucunda: $v(2) = 2 - \ln 5$.
- Altyazıya göre fonksiyon büyük olasılıkla $v(t) = t - \ln(t^2+1)$. Sorunun tam metni altyazıda net değil.

Yeni dönüşüm: $\tan\dfrac{x}{2} = t$

- Olağan yöntemlerle basit bir integrale dönüşmeyen, $\sin x$ ve $\cos x$ içeren kesirler için kullanılır.
- **Formüllerin çıkarılışı:** Dik üçgende açı $x/2$, karşı kenar t, komşu kenar 1, hipotenüs $\sqrt{t^2+1}$.
  - $\sin x = 2\sin\dfrac{x}{2}\cos\dfrac{x}{2} = 2\cdot\dfrac{t}{\sqrt{t^2+1}}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{t^2+1}} = \dfrac{2t}{1+t^2}$.
  - $\cos x = \cos^2\dfrac{x}{2} - \sin^2\dfrac{x}{2} = \dfrac{1-t^2}{1+t^2}$.
  - $\tan\dfrac{x}{2} = t$ türevlenir: $\left(1+\tan^2\dfrac{x}{2}\right)\cdot\dfrac{1}{2}\,dx = dt \Rightarrow dx = \dfrac{2\,dt}{1+t^2}$.
- Hoca: "Çok aşina olmadığımız bir problemi, çok iyi bilinen bir probleme, rasyonel fonksiyonların integraline dönüştürüyoruz. Yaptığımız her şey zaten bu."

Örnek A: $\displaystyle\int \frac{dx}{2+\sin x+\cos x}$

- Dönüşüm uygulanınca payda: $\dfrac{2(1+t^2)+2t+1-t^2}{1+t^2}=\dfrac{t^2+2t+3}{1+t^2}$.

$$\int \frac{2\,dt}{t^2+2t+3}=\int \frac{2\,dt}{(t+1)^2+2}=\sqrt{2}\arctan\frac{t+1}{\sqrt{2}}+C$$

- Eski değişkene dönüş:

$$\int \frac{dx}{2+\sin x+\cos x}=\sqrt{2}\arctan\left(\frac{1+\tan\frac{x}{2}}{\sqrt{2}}\right)+C$$

Örnek B: $\displaystyle\int \frac{dx}{5+3\cos x}$

- Payda: $\dfrac{5(1+t^2)+3(1-t^2)}{1+t^2}=\dfrac{2t^2+8}{1+t^2}$.

$$\int \frac{2\,dt}{2t^2+8}=\int \frac{dt}{t^2+4}=\frac{1}{2}\arctan\frac{t}{2}+C=\frac{1}{2}\arctan\left(\frac{\tan\frac{x}{2}}{2}\right)+C$$

- Hoca önce 2'ye bölmeyi unuttu, sonra düzeltti: "Yoksa $x/2$ gelir, yanlış olur."

Ders sonrası notlar

- **Soru 3:** Hoca "Bazen burada değişiklikler olabiliyor, hata olabilir, dikkat edin" dedi. Hesap yapıldığında cevap gerçekten $b=2$ çıkıyor.
- **Soru 8 (L'Hôpital):** Hoca soruyu "daha önce çözdük" diyerek geçti. Soru metni bu özete alınmadı.
- **Soru 10 olasılığı:** Hoca önce "finalde gelme ihtimali %80" dedi. Bir öğrenci bu tipin 2. vizede geldiğini söyleyince tahminini %40-50'ye indirdi.
- **Örnek A:** Altyazıda sonuç "$\frac{2}{\sqrt{2}}\arctan\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\tan\frac{x}{2}\right)$" gibi geçiyor. Bu ifadede $+1$ eksik. Doğrusu yukarıdaki gibi $\dfrac{1+\tan\frac{x}{2}}{\sqrt{2}}$'dir ($\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$).
- **Hız sorusu:** Hoca türevi "her zaman pozitif" diyor. Doğrusu "negatif değil": $t=1$'de türev 0 olur. Fonksiyon yine de artandır.
- **Soru 15, IV:** Hoca "$t=2$ yazınca yakınsak olmaz" diyor. Gerekçe: $\displaystyle\lim_{t_1\to 2^-}\frac{1}{2-t_1}=+\infty$.
- **Hesaplanan sonuçlar:** $b=2$, $2\pi e^b$, $-\frac{16}{5}$, $\frac{8\pi}{3}$ ve Örnek A'nın sonucu bu özette hesaplandı ya da doğrulandı.
- **Altyazı:** Yaklaşık 00:14:35'te ("ikinci olarak" döngüsü) ve 01:44:36-01:44:55 arasında altyazı anlaşılmıyor. Soru metinleri ekrandaki PDF'ten alındı.

Not: İsterseniz bu kayıtları NotebookLM gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.