Ders 21 Çalışma Özeti

Ders 21 Çalışma Özeti

Genel Konular

- İkinci vize duyurusu: tarih, saat, soru sayısı ve konuların ağırlığı.
- İndirgeme formülleri (reduction formulas):
  - $\int x^n e^x \, dx$
  - $\int \sin^n x \, dx$ ve $\int \cos^n x \, dx$; $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ üzerindeki belirli integraller (Wallis formülleri)
  - $\int \tan^n x \, dx$ ve $\int \sec^n x \, dx$
  - $\int \sin^m x \cos^n x \, dx$ ve $\int e^{ax} \sin^n x \, dx$ (yalnız anılıyor)
- Geçmiş yıl uygulama soruları:
  - Ortalama değer teoremiyle $f(5)$'in alabileceği değerler ve eşitsizlik ispatı.
  - Yerel ekstremum, büküm noktası, Rolle ve ortalama değer teoremi.
  - Zincir kuralı.
  - Asimptotlar, mutlak ekstremum, grafik yorumlama.
  - Temel teorem 1. kısım, ortalama değer, logaritmik türev.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- **İkinci vize: 25 Aralık 2020 Cuma, saat 16.00.**
  - 20 soru, test (çoktan seçmeli). Süre belli değil; hoca en az 80 dakika olacağını tahmin ediyor.
  - Soruların çoğu birinci vizeden sonraki konulardan gelecek.
- Hocanın tableti/kalemi bozuldu, internet de kesik kesik. Ders yaklaşık 55. dakikada başlıyor. Hoca bu yüzden başka hocaların ders notları üzerinden anlatıyor ve fareyle işaretliyor. Bunu tercih etmediğini söylüyor.
- **Tahminler (hocanın öngörüsü; soruları kendisi hazırlamıyor):**
  - **Temel teorem 1. kısım:** Gelme ihtimali %99,9. En az 3-4 soru bununla ilgili olabilir.
  - **Asimptotlar:** Birinci vizede asimptot sorusu yoktu. %90 ihtimalle en az 1-2 soru gelir. Asimptotlara iyi çalışın.
  - **İntegraller için ortalama değer teoremi:** Önümüzdeki vizede %60, finalde %40. İkisinden birinde neredeyse kesin.
  - **İndirgeme formülleri:** En az bir soru (vize veya final), en fazla 2. "İndirgeme formülü nedir?" diye sorulmaz. Formülün elde edilişini ve uygulamasını öğrenin; yoruma dayalı soru gelir.
  - **Ortalama değer teoremiyle eşitsizlik:** En fazla %10, belki daha az.
  - **Riemann toplamı formülünü bulma** tarzı sorular gelebilir; şıklar sadeleştirilmeden bırakılır.
- Sınav soruları hesap makinesi/araçlarla çözülebilecek tarzda gelmeyecek. Bunun yerine **yorum soruları** gelecek. Ders notlarındaki kuralları ve yorumları çok iyi bilin.
- Hoca ikinci vizenin zor olacağını, işin mantığını anlamayanların kötü performans göstereceğini söylüyor. Derse katılım düşük olduğu için endişeli.
- Videoyu tekrar izlerken önünüze kâğıt kalem alıp soruları kendiniz çözün. Çözebiliyorsanız konuyu öğrenmişsinizdir.
- 5 yıldızlı ve 3 yıldızlı sorulara ayrıca önem verin. 5 yıldızlı sorular birinci vize konularıyla harmanlanmış.
- İndirgeme formüllerinin dosyası ders sonrasında paylaşılacak. Benzer sorular hocanın AVESİS sayfasında da var.

- Ders 12.00'de bitiyor; bugün ve yarın 10 dakika uzatılabilir. Gelecek hafta soru çözümüne devam edilecek, belki final konularından biraz konu işlenecek.

Kısa Tekrar Notları

- $I_n = \int x^n e^x \, dx = x^n e^x - n\, I_{n-1}$.
- $I_n = \int \sin^n x \, dx = -\dfrac{\sin^{n-1} x \cos x}{n} + \dfrac{n-1}{n} I_{n-2}$ $(n \geq 2)$.
- $I_n = \int \cos^n x \, dx = \dfrac{\cos^{n-1} x \sin x}{n} + \dfrac{n-1}{n} I_{n-2}$ $(n \geq 2)$.
- Wallis formülleri (sin ve cos için aynı):
  - n tek, $n \geq 3$: $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdots \frac{n-1}{n}$.
  - n çift, $n \geq 2$: $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{n-1}{n} \cdot \frac{\pi}{2}$.
- $I_n = \int \tan^n x \, dx = \dfrac{\tan^{n-1} x}{n-1} - I_{n-2}$ $(n \geq 2)$.
- $I_n = \int \sec^n x \, dx = \dfrac{\sec^{n-2} x \tan x}{n-1} + \dfrac{n-2}{n-1} I_{n-2}$ $(n \geq 2)$.
- Ortalama değer teoremi: $f'(c) = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$ (ortalama değişim oranı).
- Rolle teoremi: $[a, b]$'de sürekli, (a, b)'de türevlenebilir ve $f(a) = f(b)$ ise $f'(c) = 0$ olan bir $c \in (a, b)$ vardır.
- Ortalama değer (integral): $f_{ort} = \dfrac{1}{b-a} \displaystyle\int_a^b f(x) \, dx$. Ortalama değişim oranıyla karıştırmayın.
- Kritik nokta: Tanım kümesinde olup türevi sıfır veya tanımsız yapan nokta.
- Düşey asimptot: Fonksiyonu tanımsız yapan noktaya sağdan veya soldan yaklaşırken $f(x) \to \pm\infty$ olmalı.
- Yatay asimptot: $x \to +\infty$ ve $x \to -\infty$ ayrı ayrı incelenir; birinde olup diğerinde olmayabilir.

Detaylı Açıklamalar

İndirgeme formüllerinin mantığı

- Neredeyse bütün indirgeme formülleri kısmi integrasyonla elde edilir.
- I_n, bir önceki (I_{n-1} veya I_{n-2}) integrale bağlıdır. Bu bir ardışıklık (recursive) ilişkisidir.
- Formül tekrar tekrar uygulanarak I_0 veya I_1'e kadar inilir.
- Hoca: "İntegraller için indirgeme formülleri listesi" diye ararsanız hepsini bulursunuz. İşinize yarayanı seçersiniz.

$\int x^n e^x \, dx$

- $u = x^n$, $dv = e^x \, dx$. $du = nx^{n-1} \, dx$, $v = e^x$.
- $I_n = x^n e^x - n \displaystyle\int x^{n-1} e^x \, dx = x^n e^x - n\, I_{n-1}$.
- Örnek: $\displaystyle\int x^4 e^x \, dx = I_4 = x^4 e^x - 4I_3$. I_3 yerine tekrar formül yazılır; $I_0 = \displaystyle\int e^x \, dx = e^x$'e kadar inilir.

$\int \sin^n x\,dx$ **(tahtadan doğrulandı)**

- $\sin^n x = \sin^{n-1} x \cdot \sin x$. $u = \sin^{n-1} x$, $dv = \sin x\,dx$.
- $du = (n-1)\sin^{n-2} x \cos x\,dx$, $v = -\cos x$.
- $I_n = -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1)\displaystyle\int \sin^{n-2} x \cos^2 x\,dx$.
- $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ yazılır: $I_n = -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1)\,[I_{n-2} - I_n]$.
- I_n'ler bir tarafa toplanır: $nI_n = -\sin^{n-1} x \cos x + (n-1)I_{n-2}$.
- $n \geq 2$ olmalı; I_{-1} diye bir şey yok, I_0 olabilir.

Örnek 1: $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^5 x\,dx$

- Sınırlar yerine yazılınca $-\dfrac{\sin^{n-1} x \cos x}{n}$ terimi sıfır olur.
- $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^5 x\,dx = \frac{4}{5}\int_0^{\pi/2} \sin^3 x\,dx = \frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}\int_0^{\pi/2} \sin x\,dx = \frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3}\cdot 1 = \frac{8}{15}$.
- Genel kural: Çarpanlar belli bir düzenle gelir. Pay ve paydayı birer artırarak yazarsınız; n çiftse en sonda $\dfrac{\pi}{2}$ ile çarparsınız (tahtadan doğrulandı).

$\int \cos^n x\,dx$

- $\cos^n x = \cos^{n-1} x \cdot \cos x$. $u = \cos^{n-1} x$, $dv = \cos x\,dx$.
- $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ yazılır ve aynı yolla: $I_n = \dfrac{\cos^{n-1} x \sin x}{n} + \dfrac{n-1}{n} I_{n-2}$.
- $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ üzerinde $\sin^n$ ile aynı değeri verir.

$\int \tan^n x\,dx$

- $\tan^n x = \tan^{n-2} x \cdot \tan^2 x$. $\tan x$'in türevinde $\sec^2 x$ olduğu için bu ayrıştırma seçilir.
- $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$: $I_n = \displaystyle\int \tan^{n-2} x \sec^2 x\,dx - I_{n-2}$.
- İlk integralde $u = \tan x$, $du = \sec^2 x\,dx$: $\dfrac{\tan^{n-1} x}{n-1}$.
- $I_n = \dfrac{\tan^{n-1} x}{n-1} - I_{n-2}$.

Örnek 2: $\displaystyle\int_0^{\pi/4} \tan^5 x\,dx$ **(tahtadan doğrulandı)**

- $= \left[\dfrac{\tan^4 x}{4}\right]_0^{\pi/4} - \displaystyle\int_0^{\pi/4} \tan^3 x\,dx = \frac{1}{4} - \left(\left[\frac{\tan^2 x}{2}\right]_0^{\pi/4} - \int_0^{\pi/4} \tan x\,dx\right)$.
- $= \dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{2} + \displaystyle\int_0^{\pi/4} \frac{\sin x}{\cos x}\,dx = -\frac{1}{4} + [-\ln(\cos x)]_0^{\pi/4}$.
- $= -\dfrac{1}{4} - \ln\dfrac{1}{\sqrt{2}} + \ln 1 = -\dfrac{1}{4} + \ln\sqrt{2} = -\dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{2}\ln 2$.

$\int \sec^n x\,dx$ **ve Örnek 3:** $\displaystyle\int_0^{\pi/4} \sec^6 x\,dx$

- $I_n = \dfrac{\sec^{n-2} x \tan x}{n-1} + \dfrac{n-2}{n-1} I_{n-2}$.
- Örnek (tahtadan doğrulandı):
  - $\displaystyle\int_0^{\pi/4} \sec^6 x\,dx = \left[\frac{\sec^4 x \tan x}{5}\right]_0^{\pi/4} + \frac{4}{5}\int_0^{\pi/4} \sec^4 x\,dx.$
  - $\displaystyle = \frac{4}{5} + \frac{4}{5}\left(\left[\frac{\sec^2 x \tan x}{3}\right]_0^{\pi/4} + \frac{2}{3}\int_0^{\pi/4} \sec^2 x\,dx\right) = \tfrac{4}{5} + \tfrac{8}{15} + \tfrac{8}{15}\left[\tan x\right]_0^{\pi/4}.$
  - $\displaystyle = \frac{4}{5} + \frac{8}{15} + \frac{8}{15} = \frac{28}{15}.$
- Hoca $\sec^n$ için formülün ispatını kalemi olmadığı için yapamıyor, ödev olarak bırakıyor.

Diğer indirgeme formülleri

- $\displaystyle\int \sin^m x \cos^n x\,dx$ için iki tamsayıya bağlı $I_{m,n}$ formülü var. $m \neq -1$ için yerine koyma yöntemiyle bir özel durum elde edilir. Hoca bunu ayrıntıya girmeden geçiyor; örnek olarak $m = 4$, $n = 6$ için $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$'de belirli integral gösteriliyor.
- $\displaystyle\int e^{ax} \sin^n x\,dx$ (a reel sabit) için de indirgeme formülü var. Anlatılmadı.

Geçmiş yıl sorusu 1: $f(5)$'in alabileceği değerler

- f, $[0,5]$'te sürekli, $(0,5)$'te türevlenebilir. $f(0) = 2$ ve $1 \leq f'(x) \leq 3$.
- Ortalama değer teoremi: $f'(c) = \dfrac{f(5) - f(0)}{5 - 0}$.
- $1 \leq \dfrac{f(5) - 2}{5} \leq 3$, yani $7 \leq f(5) \leq 17$.
- Ortalama değer teoremi: Grafiğin uç noktalarını birleştiren kirişe (secant line) paralel bir teğet bulunabilir.

Geçmiş yıl sorusu 2: Eşitsizlik ispatı

- Amaç: $\sin 2x$ ile ilgili bir eşitsizliğin her a, b için doğru olduğunu göstermek.
- $f(x) = \sin 2x$ her kapalı aralıkta sürekli, her açık aralıkta türevlenebilir.
- Ortalama değer teoremi: $2\cos 2c = \dfrac{\sin 2b - \sin 2a}{b - a}$.
- $|\cos 2c| \leq 1$ olduğu için $|\sin 2b - \sin 2a| \leq 2|b - a|$.
- Matematikteki birçok eşitsizlik ortalama değer teoremiyle gösterilebilir.
- Bir öğrenci sınavda böyle bir sorunun nasıl sorulacağını soruyor. Hoca: Test sınavının ruhuna uygun hazırlanır. Bir eşitsizliğin doğru olup olmadığı sorulursa ortalama değer teoremiyle hemen gösterebilirsiniz.

Geçmiş yıl sorusu 3: Yerel ekstremum ve büküm noktaları

- Birinci türevin işaret tablosu yerel ekstremumları, ikinci türevin işaret tablosu konkavlığı verir.
- Bu soruda: $(-\infty, -\sqrt{3})$'te artan ve aşağı konkav, $(-\sqrt{3}, -1)$'de azalan ve aşağı konkav, $(-1, 0)$'da azalan ve yukarı konkav, $(0, 1)$'de artan ve yukarı konkav, $(1, \sqrt{3})$'te artan ve aşağı konkav.
- $x = -1$ ve $x = 1$ büküm noktaları: ikinci türev burada işaret değiştiriyor.
- $x = 0$'da yerel minimum var. Fonksiyonun kendisi altyazıda geçmiyor.

Geçmiş yıl sorusu 4: Rolle teoremi (tahtadan doğrulandı)

- Rolle için üç koşul: $[a, b]$'de süreklilik, (a, b)'de türevlenebilirlik, $f(a) = f(b)$.
- Fonksiyon $x = -2$ dışında türevlenebilir; bu nokta $[0, 1]$'in dışında.
- $f'(c) = \dfrac{c^2 + 4c - 2}{(c+2)^2} = 0$, yani $c^2 + 4c - 2 = 0$.
- $c_{1,2} = -2 \mp \sqrt{6}$. Yalnız $c = -2 + \sqrt{6} \in (0, 1)$ kabul edilir.
- Sorunun fonksiyonu altyazıda okunmuyor.

Geçmiş yıl sorusu 5: Zincir kuralı (tahtadan doğrulandı)

- f ve g türevlenebilir, $f'(2) = 3$, $g(1) = 2$, $g'(1) = 1$. $h(x) = f(g(x^2))$ ise $h'(1)$ nedir?
- $h'(x) = f'(g(x^2)) \cdot g'(x^2) \cdot 2x$.
- $h'(1) = f'(g(1)) \cdot g'(1) \cdot 2 = f'(2) \cdot 1 \cdot 2 = 6$.
- Ardından ortalama değer teoremiyle bir eşitsizliğin doğruluğunu gösterme sorusu ödev olarak bırakıldı.

Geçmiş yıl sorusu 6: $f(x) = x\sqrt{1-x}$, $[0, 1]$, ortalama değer teoremi

- f, $[0, 1]$'de sürekli, $(0, 1)$'de türevlenebilir.
- $f(1) - f(0) = 0$, yani $f'(c) = 0$ aranıyor.
- $f'(x) = \sqrt{1-x} - \dfrac{x}{2\sqrt{1-x}} = \dfrac{2 - 3x}{2\sqrt{1-x}}$.
- $c = \dfrac{2}{3} \in (0, 1)$.

Asimptot soruları

- **Düşey asimptot:** Fonksiyonun kuralını tanımsız yapan noktalarda aranır. Her tanımsız nokta düşey asimptot değildir.
  - Bir soruda $x \to 0$ iken eşlenik yöntemiyle limit sonlu çıkıyor. Bu yüzden $x = 0$ düşey asimptot değil.
  - Örnek: $y = \dfrac{1}{x}$'te $x \to 0$ iken sağdan $+\infty$, soldan $-\infty$; $x = 0$ düşey asimptottur.
  - Limit sonlu bir değere gidiyorsa grafikte yalnız bir "delik" vardır, asimptot yoktur.
- **Yatay asimptot:** $x \to +\infty$ ve $x \to -\infty$ ayrı ayrı incelenir.
  - Aynı soruda $x \to +\infty$ iken $f(x) \to \infty$: yatay asimptot yok.
  - $x \to -\infty$ iken $\sqrt{x^2} = |x| = -x$ alınır ve limit $\dfrac{1}{2}$ çıkar: $y = \dfrac{1}{2}$ yatay asimptot.
- Başka bir soruda $x \to 0$ iken limit 1 (sonlu), düşey asimptot yok. $x \to \pm\infty$ iken sınırlı bir terim sıkıştırma teoremiyle sıfıra gider; $y = 1$ yatay asimptottur.
- Bir öğrenci $x = 1$'in düşey asimptot olup olmadığını soruyor. Hoca: $x = 1$'de bir tanımsızlık yok. Düşey asimptot yalnız fonksiyonu tanımsız yapan noktalarda aranır.

Geçmiş yıl sorusu 7: Mutlak ekstremum

- Kökün içi $4 - x^2 \geq 0$ olmalı, tanım kümesi $[-2, 2]$. ± 2 uç noktalardır.
- Türevin kökleri $\pm\sqrt{2}$, tanım kümesinde oldukları için kritik noktalardır.
- $x = \pm 2$'de türev tanımsız, ama bu noktalar tanım kümesinde. Bu yüzden onlar da kritik noktadır.
- Değerler: $f(\pm 2) = 0$, $f(\sqrt{2}) = 2$ (mutlak maksimum), $f(-\sqrt{2}) = -2$ (mutlak minimum).
- Bu değerler $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$ ile uyumlu; fonksiyonun kendisi altyazıda geçmiyor.
- Benzer bir soruda türevin kökleri $x = 0$ ve $x = 4$; $x = 5$ uç nokta. $x = 0$'da yerel minimum, $x = 4$'te yerel maksimum, $x = 5$'te minimum değer.

Grafik yorumlama (eğri çizimi)

- Test sınavında grafik çizdirilmez, ama grafiği yorumlamanız istenebilir. Eğri çizimi klasik sınavın ruhuna uygundur.
- Örnek: $x = 2$ düşey asimptot. Asimptotun solunda grafik aşağı konkav olmalı. Yukarı konkav olsaydı $x = 2$ doğrusunu keserdi; bu, asimptot olmasıyla çelişirdi. Sağında yukarı konkav olmalı.
- Örnek: $x = -1$ düşey asimptot; solunda grafik yukarı konkav.
- Eğik asimptot $y = x - 1$ ise x'ler yeterince büyükken grafik aşağı konkav olur.
- $y = 1$ yatay asimptotsa, $x \to -\infty$ tarafında grafik yukarı konkav olmak zorunda (soruya göre).
- Eğik asimptot polinom bölmesiyle bulunur. Genel yöntem önceki derslerde anlatıldı.

Geçmiş yıl sorusu 8: $f(x) = \displaystyle\int_0^x \frac{t - t^2}{1 + t^4}\, dt$**, max/min (tahtadan doğrulandı)**

- Temel teorem 1. kısım: $f'(x) = \dfrac{x - x^2}{1 + x^4}$.
- $f'(x) = 0$: $x = 0$ ve $x = 1$.
- İşaret tablosu: $x < 0$'da $-$, $0 < x < 1$'de $+$, $x > 1$'de $-$.
- $x = 0$ yerel minimum, $x = 1$ yerel maksimum. $f(0) = \displaystyle\int_0^0 = 0$.

Geçmiş yıl sorusu 9: $f(x) = \cos x$**,** $[0, \pi]$**, ortalama değer**

- $f_{ort} = \dfrac{1}{\pi} \displaystyle\int_0^\pi \cos x\, dx = 0$.
- Ortalama değer teoremi: $f(c) = \cos c = 0$, $c \in [0, \pi]$ için $c = \dfrac{\pi}{2}$.
- $\cos c = 0$'ı sağlayan çok c var, ama aralıkta olanı seçilir.
- Bu soruyu anlamak için ortalama değer ve integraller için ortalama değer teoreminin tanımlarını bilmek gerekir.

Geçmiş yıl sorusu 10: $F'(1)$

- Sınırları x'e bağlı bir integralle verilen F'nin $x = 1$'deki türevi isteniyor.
- Genelleştirilmiş temel teorem: Üst sınır integranda yerine yazılır, türeviyle çarpılır; alt sınır için aynısı yapılıp çıkarılır. Alt sınır sabitse türevi sıfırdır.
- Sonuç: $F'(1) = 2$. Hoca bu soruyu herkesin en fazla 2 dakikada çözmesi gerektiğini söylüyor.

Geçmiş yıl sorusu 11: $f(x) = \displaystyle\int_0^{x^2 - 2x} \frac{dt}{1 + t^2}$**, yerel max/min (tahtadan doğrulandı)**

- $f'(x) = \dfrac{1}{1 + (x^2 - 2x)^2} \cdot (2x - 2)$.
- $f'(x) = 0$: $x = 1$.
- $x < 1$'de $f' < 0$, $x > 1$'de $f' > 0$: $x = 1$ yerel minimum noktası. Yerel maksimum yok.
- Minimum değer: $f(1) = \displaystyle\int_0^{-1} \frac{dt}{1 + t^2} = \arctan(-1) = -\frac{\pi}{4}$.
- Bir öğrenci üst sınırın $1 - 2 = -1$ olduğunu hatırlatıyor. Hoca düzeltiyor.
- Hoca bu soruya 5 yıldız veriyor.

Geçmiş yıl sorusu 12: Logaritmik türev ve temel teorem

- $f(x) = (1 + \ln x)^x$. $g(x)$, alt sınırı x, üst sınırı $f(x)$ olan bir belirli integral.

- f aşkın bir fonksiyondur: hem taban hem üs x'e bağlı. İki tarafın logaritması alınır:
  - $\ln f(x) = x \ln(1 + \ln x)$.
  - Türev: $\dfrac{f'(x)}{f(x)} = \ln(1 + \ln x) + x \cdot \dfrac{1/x}{1 + \ln x}$.
- $x = 1$: $f(1) = 1^0 = 1$ ve $f'(1) = 1 \cdot (0 + 1) = 1$.
- $g'(x) = h(f(x))\, f'(x) - h(x) \cdot 1$ (h, integrand).
- $g'(1) = h(1) \cdot 1 - h(1) = 0$.
- Hoca bu tarz soruların hesap araçlarıyla çözülebildiği için büyük ihtimalle gelmeyeceğini, yerine yorum sorusu geleceğini söylüyor. Yine de 3 yıldız veriyor.

Riemann toplamı

- Bir fonksiyon için x_0'dan x_1'e Riemann toplamı formülünü bulma sorusu gelebilir.
- Şıklar uzun uzun sadeleştirilmez, toplam formülü olarak bırakılır.
- Bir sonraki derste Riemann toplamlarıyla ilgili başka tip sorular çözülecek.

Ders sonrası notlar

- **Örnek 2'de ders notunda hata var.** Notta son satır "$-\frac{1}{4} \ln \sqrt{2}$" gibi okunuyor, ikinci satırda da "$\frac{\tan^2 x}{x}$" yazıyor (tahtadan doğrulandı). Doğrusu $\frac{\tan^2 x}{2}$ ve sonuç $-\dfrac{1}{4} + \ln \sqrt{2} = -\dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{2} \ln 2 \approx 0{,}097$.
- **Soru 11'de ders notunda yazım hatası var.** Notta türevin paydası $1+(x^2-2x)$ yazılmış. Doğrusu $1 + (x^2 - 2x)^2$. Sonuç değişmez.
- **Soru 2'nin tam eşitsizliği** altyazıda okunmuyor. Burada $|\sin 2b - \sin 2a| \leq 2|b - a|$ olarak verildi; ispat yolu aynı.
- **Soru 1'in sonucu** altyazıda söylenmiyor. $7 \leq f(5) \leq 17$ verilen bilgilerden hesaplandı.
- Asimptot sorularının ve soru 3, 10'un fonksiyonları altyazıda geçmiyor; ekranda ders notu üzerinden gösterildi.
- 00:17:41 ile 00:55:21 arası ders yapılamadı (kalem ve internet sorunu). 01:58:11 ile 02:10:45 arası ara verilmiş.
- 01:46:44 civarında hoca yoklama alıyor. Bu kısım derse ait bilgi içermiyor.

Not: İsterseniz bu kayıtları NotebookLM gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.