

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information Patient's Copy Breast Abscess / Haematoma

معلومات للمريض- الخراج الورم الدموي

1. What is a breast abscess/haematoma?

The procedure consists either of opening up the fistula and leaving it open to drain or cleaning it and closing the wound.

The development of a mammary fistula in breast feeding women may also occur. This causes abnormal discharge of milk from the cut. This may stop breast feeding.

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic.

See **About Your Anaesthetic information sheet** OR **Local Anaesthetic and Sedation for Your Procedure information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor. If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room.
- Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.

1- ما هو الخراج/ الورم الدموي في الصدر؟

يتضمن هذا الإجراء فتح الناسور وسحب السائل، أو تنظيفه وإغلاق

الجرح. قد يتكون الناسور في الصدر في النساء المرضعات، مما يسبب

تسرب الحليب من الجرح، وبالتالي إيقاف الرضاعة.

٢- التخدير

هذا الإجراء سيتطلب استخدام مخدر للألام. رجاء الإطلاع على ورقة

المعلومات الخاصة بالتخدير والمخاطر المحتملة. إذا كان عندك أي

تساؤل رجاء مراجعة الطبيب

إذا لم تحصل على ورقة المعلومات الخاصة بالمخدر، قم بطلبها من

القسم/المستشفى

٣- ما هي المخاطر المحتملة لهذا الإجراء؟

هناك مخاطر ومضاعفات محتملة في هذا الإجراء. هذه المخاطر تشمل -

ولا تقتصر على:

مخاطر عامة:

- الإصابة بالتهابات، مما يتطلب استخدام مضادات حيوية وعلاجات إضافية

- النزيف، مما قد يتطلب العودة لغرفة العمليات.

- قد تزيد احتمالية النزيف إذا كنت تستخدم مسيل للدم مثل الوارفارين،

الأسبرين، بلافيكس أو البيروسانتين

- الإصابة بفشل/انغلاق في بعض أجزاء الرئة. قد يزيد ذلك نسبة

الإصابة بالتهاب في الرئة، مما قد يتطلب استخدام مضاد حيوي وعلاج

طبيعي للرئة

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risk:

- The wound may continue to drain for some time and require wound dressings.
- The incision may not drain away all the fluid and further surgery may be necessary.
- The final healed scar may be thickened and red coloured and may be painful.
- Alteration of the shape of the breast tissue may occur. This may be disfiguring.
- Increased risk in smokers of wound and chest infections, heart and lung complications and thrombosis.

Notes to talk to my doctor about:

- تزيد احتمالية إصابة الأشخاص المصابين بالسمنة بالتهاب الجروح، التهابات الرئة، مضاعفات في القلب والرئتين والجلطات.
- الإصابة بالسكتة القلبية أو السكتة الدماغية بسبب الإجهاد على القلب والدماغ
- الإصابة بجلطات في الساق مما يسبب الألم والانتفاخ. في حالات نادرة قد ينتقل جزء من هذه الجلطات للرئتين
- الوفاة بسبب هذا الإجراء الطبي محتمل

مخاطر خاصة:

- قد تتسرب السوائل من الجرح، مما يتطلب العناية المستمرة للجرح بتغيير الضماد
 - قد لا يكفي الإجراء لسحب السوائل كلها. يحتاج المريض في هذه الحالة للجراحة
 - الندب الناتج عن إلتئام الجرح قد يصبح سميكاً، مؤلماً و قد يتغير لونه للون الأحمر
 - قد يتغير شكل الصدر نتيجة هذا الإجراء
 - تزيد احتمالية إصابة المدخنين بالتهابات في الرئتين والجروح، مضاعفات في القلب والرئتين والجلطات
- ملاحظات أو أسئلة للنقاش مع الطبيب
