

Patient's Name : \_\_\_\_\_

MRN : \_\_\_\_\_

DoB: \_\_\_\_\_

## Consent Information - Patient's Copy Breast Biopsy/Aspiration Under Imaging Guidance

## معلومات الإقرار - نسخة المريض خزعة من نسيج الثدي/الشفط بالتصوير الطبي

### 1. What is a breast biopsy?

The procedure will involve the removal of part of the breast tissue which will then be sent for pathology tests.

### 2. What is a Breast Aspiration?

A breast aspiration is a procedure that removes liquid from a pool of fluid (collection) in the breast. A collection may contain clear fluid, pus or blood.

A breast aspiration is where a needle is put into the breast and the collected fluid is removed. If needed, a sample may be taken and sent to pathology for testing.

These procedures may be performed by ultrasound or x-ray guidance.

### 3. Will there be any discomfort, is any anaesthetic needed?

This procedure will require the injection of a local anaesthetic. It is used to prevent or relieve pain, but will not put you to sleep.

### 4. Preparation for the procedure

The medical imaging department will give you instructions on how to prepare for your procedure.

- Please tell the staff if you are or suspect you might be pregnant.
- If you take Aspirin, Warfarin, Clopidogrel (Plavix and Iscover) or Dipyridamole (Persantin and Asasantin) or any other drug that is used to thin your blood ask your doctor/health practitioner if you should stop taking it before the procedure as it may affect your blood clotting.
- List or bring all your prescribed drugs, those drugs you buy over the counter, herbal remedies and supplements.
- Do not drink any alcohol and stop recreational drugs 24 hours before the procedure as these may alter the affects of the sedation anaesthetic. If you have a drug habit please inform your doctor. (These activities are against Shariah Law.)

### 5. During the procedure

Pictures will be taken of the procedure site.

The doctor will inject local anaesthetic.

Using imaging as a guide the doctor will insert a biopsy needle. Once the needle is in the correct area, a sample of the tissue will be removed.

You must remain as still as possible. At times, you may be asked to hold your breath.

At the end of the procedure, the needle will be removed and a dressing applied.

### 6. After the procedure

The recovery time varies between 15 minutes to 2 hours.

Staff will discuss with you what level of activity is suitable after your procedure.

### ١- ماهي خزعة نسيج الثدي؟

هو إجراء طبي نقوم فيه بإزالة جزء من نسيج الثدي وإرسالها لمعمل علم الأمراض وإجراء الفحوصات اللازمة عليها

### ٢- ما هو الشفط من الثدي؟

الشفط من الثدي هو إجراء يتم خلاله سحب سوائل من موضع تتجمع فيه هذه السوائل في الثدي. ما يتم سحبه قد يكون سائل صاف خال من الشوائب ، صديد أو دم .

الشفط من الثدي هو الإجراء الذي يتم فيه إدخال إبرة في الثدي لإزالة تجمع السوائل. قد تؤخذ عينة من السائل لفحصها في مختبر علم الأمراض. يتم القيام بهذا الإجراء في قسم التصوير الطبي تحت توجيه من أجهزة تصوير مثل جهاز الموجات فوق الصوتية أو التصوير الإشعاعي للثدي .

### 3- هل سيكون هناك شعور بعدم الراحة ؟ هل هناك حاجة لأي دواء تخدير؟

قد يتطلب الإجراء حقنة مخدر موضعي . غرض الحقنة هو منع الشعور بالألم أو علاجه ، ولكنها لن تتسبب في نومك . من النادر إعطاء دواء مسكن .

### 4- التحضير للإجراء

يقوم قسم التصوير الطبي بإعطائك التعليمات المتعلقة بكيفية التحضير لهذا الإجراء.

- نرجو إبلاغ الموظفين إن كنت حاملاً أو تشكين في كونك حاملاً .
- إن كنت تتناول أيّاً من الأدوية التي تزيد من سيولة الدم كالأسبرين ، وارفارين ، كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفير) أو دايابيردامول (بيرسانتن أو اساسانتن) أو أي عقار آخر لنفس الغرض ، فاسأل طبيبك إن كان عليك التوقف عن تناولها قبل الإجراء لأنها قد تؤثر على تخثر دمك.
- احضر معك كل الأدوية الموصوفة لك ، والأدوية التي تبتاعها دون وصفة ، والعلاجات العشبية والعلاجات التكميلية أو احضر قائمة بها.
- لا تحتسي الكحوليات وأوقف تعاطي كل الأدوية والعقاقير المخدرة (المخالفة للشريعة الإسلامية) التي تتناولها ، وذلك قبل 24 ساعة من الإجراء ، لأنها قد تتداخل مع عمل الدواء المسكن. إذا كنت معتاداً على عقار معين ، نرجو إبلاغ الطبيب.

### 5. أثناء الإجراء

تؤخذ صور لموقع الإجراء . يحقن الطبيب المخدر الموضعي.

باستخدام التصوير كأداة للتوجيه ، يقوم الطبيب بإدخال إبرة . ما أن تصل الإبرة لموقع النسيج أوتجمع السوائل حتى يزال التجمع.

حاول أن لا تتحرك وأن تحافظ على سكونك قدر الإمكان. قد يطلب منك في بعض مراحل الفحص أن تحبس أنفاسك. في نهاية الإجراء ، تزال الإبرة ويضع الضماد.

### 6. بعد الانتهاء من الإجراء

فترة النقاهة بعد الإجراء تتراوح ما بين 15 دقيقة – ساعتين .

سيناقش معك الموظفين الذين أجروا الفحص لك مقدار الأنشطة التي يمكنك ممارستها بعد الإجراء.

Patient's Name : \_\_\_\_\_

MRN : \_\_\_\_\_

DoB: \_\_\_\_\_

## 7. What are the risks of this specific procedure?

The risks and complications with this procedure can include but are not limited to the following.

### Common risks and complications include:

- Pain or discomfort at the puncture site. This may require medication.
- Bleeding or bruising may occur. This is more common if you take Aspirin, Warfarin, Clopidogrel (Plavix and Iscover) or Dipyridamole (Persantin and Asasantin).
- Failure of local anaesthetic which may require a further injection of anaesthetic or a different method of anaesthesia may be used.
- Nerve damage, is usually temporary, and should get better over a period of time. Permanent nerve damage is rare.

### Less common risks and complications include:

- Infection, requiring antibiotics and further treatment.
- Damage to surrounding structures such as blood vessels, organs and muscles, requiring further treatment.
- Excessive bleeding from the puncture site. This may require other treatment and/or corrective surgery.
- An allergy to injected drugs, requiring further treatment.
- The procedure may not be possible due to medical and/or technical reasons.

### Rare risks and complications include:

- Pneumothorax, collection of air around the lining of the lungs. This usually stops by itself but sometimes may require the insertion of a tube into the chest.
- (Mammography only) An increased lifetime cancer risk due to the exposure to x-rays.
- Seizures and/or cardiac arrest due to local anaesthetic toxicity.
- Death as a result of this procedure is very rare.

## 8. What are the safety issues when you leave the hospital?

Take care not to injure or bump area that has been numbed with the local anaesthetic as you will not be able to feel it. Go to your nearest Emergency Department or GP if you become unwell or have;

- pain, unrelieved by simple pain killers
- continuous bleeding or swelling at the puncture site
- redness or inflammation at the puncture site
- fever

### Notes to talk to my doctor/health practitioner about:

---

---

---

---

---

---

---

---

## 7- ما هي المخاطر المحتملة لهذا الإجراء؟

هناك مخاطر ومضاعفات محتملة في هذا الإجراء. هذه المخاطر تشمل - ولا تقتصر على:

### مخاطر ومضاعفات شائعة وتشمل :

- ألم وشعور بعدم الراحة في موضع دخول إبرة العينة. قد يتطلب ذلك أدوية.
- حدوث نزيف أو كدمة. وهو أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفير) أو عقار دابايير دامول (بيرسانتين أو اساسانتين).
- فشل في عمل المخدر الموضعي مما قد يتطلب إعطاء حقنة أخرى أو استخدام طريقة تخدير أخرى.
- ضرر العصب. غالباً ما يكون مؤقتاً ومن المفترض تحسنه مع الوقت. من النادر حدوث ضرر دائم للعصب.

### مخاطر ومضاعفات غير شائعة وتشمل :

- عدوى يتطلب علاجها المضادات الحيوية وعلاجات أخرى.
- ضرر الأنسجة المجاورة كالأوعية الدموية، الأعضاء الأخرى والعضلات. يتطلب معالجات أخرى.
- نزيف مفرط من موضع دخول الإبرة. قد يتطلب ذلك علاج آخر وأو جراحة تصحيحية.
- تفاعل تحسسي للأدوية التي أعطيت أثناء القيام بالإجراء تتطلب علاجات أخرى.
- قد لا يمكن القيام بالإجراء لأسباب طبية وأو فنية (تقنية).

### مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث وتشمل:

- وجود تجمع للهواء حول بطانة الرئة وهو ما يسمى بـ (استرواح الصدر). عادةً ما يتوقف ذلك من تلقاء نفسه، إلا أنه أحياناً تكون هناك حاجة لإدخال أنبوب في الصدر.
- فقط عند إجراء الفحص الشعاعي للثدي، فإن معدلات خطر الإصابة بالسرطان تزداد خلال حياة المريض بسبب التعرض للشععة السينية.
- تشنجات و \ أو سكتة قلبية بسبب سمية المخدر الموضعي.
- الوفاة بسبب هذا الإجراء نادرة جداً.

## 8. ما هي الأمور المتعلقة بالسلامة بعد مغادرة المستشفى؟

احذر من أن تصاب المنطقة التي تم تخديرها بالمخدر الموضعي بأي إصابة أو ارتطام لأنه لن تكون لديك القدرة على الشعور بذلك. توجه لأقرب قسم طوارئ أو لطبيبك العام إذا شعرت بأنك لست على ما يرام أو عانيت أيًا مما يلي:

- ألم لا يتعافى باستخدام مضادات الألم المعتادة.
- نزيف مستمر أو تورم في منطقة إدخال الإبرة.
- احمرار أو التهاب في موضع إدخال الإبرة.
- ارتفاع في درجة الحرارة.

### أمور أتناقش حولها مع طبيبي:

---

---

---

---

---

---

---

---