

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient Copy Capsule Endoscopy

معلومات الإقرار – نسخة المريض
النتظير بالكبسولة

1. What is a Capsule Endoscopy?

A capsule endoscopy is where a pill sized video capsule is swallowed. The capsule slowly travels through your digestive system, the same as food would normally travel. This capsule is disposable and usually passed within 24 to 48 hours.

The capsule has its own built-in light and camera to take pictures of the inside of your small bowel. 2 - 4 images are taken per second for up to 8 hours. The images are transmitted to a radio recorder (a walkman like device) that is worn around your waist. You should not remove the belt at any time during the procedure.

This procedure is safe, easy to do, non-invasive and permits examination of the entire small bowel that is not easily reached by other imaging methods.

It does not require sedation as the procedure is painless.

The capsule procedure does have some limitations in that it can only view what the problems may be. It does not allow any treatment such as removing a polyp. A further endoscopy procedure or surgery will be required for this.

2. Will there be any discomfort? Is any anaesthetic needed?

No. The capsule is approximately the size of a large antibiotic capsule, so this is similar to swallowing a mouthful of food.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

Common risks and complications include:

- About 1 person in every 100 will have difficulty passing the capsule. This can be due to a narrowing (stricture) due to a tumour, inflammation or scarring from previous surgery. This is not usually serious in the short term, but surgery may be needed to remove it.

Uncommon risks and complications include:

- Missed polyps, growths or bowel disease
- Incomplete study of the small bowel due to slow bowel function

Rare risks and complications include:

- Death as a result of this procedure is extremely rare

4. Preparation for the procedure

Iron tablets need to be stopped at least 7 days before your

1. ما هو " منظار الكبسولة " ؟

منظار الكبسولة هو الكشف عن الجهاز الهضمي للمريض باستخدام كاميرا فيديو صغيرة بحجم كبسولة (حبة) الدواء يقوم المريض ببلعها. تنتقل هذه الكبسولة ببطء في أرجاء الجهاز الهضمي كما يفعل الطعام تماماً. هذه الكبسولة تستخدم لمرة واحدة فقط وتخرج مع البراز خلال 24 - 48 ساعة.

هذه الكبسولة مزودة بكاميرا ومصدر للضوء للتمكن من التقاط صور من داخل أمعائك الدقيقة. يتم التقاط 2-4 صور كل ثانية ، ويستمر ذلك لثمان ساعات. تنقل هذه الصور إلى مسجل لاسلكي (مشابه لجهاز التسجيل الصغير الذي يوضع على الأذنين) . هذا الجهاز يتم تثبيته على خصر المريض ، ويجب على المريض عدم نزع الحزام بتاتا من خصره أثناء فترة الفحص .

هذا الإجراء آمن وسهل التنفيذ ، وليس فيه أي تدخل اقتحامي لجسم المريض ، كما أنه يتيح الفحص الكامل للأمعاء الدقيقة والذي قد لا يمكن تحقيقه في أي إجراء تصويري آخر .

هذا الإجراء لا يسبب أي ألم ، لذا فلا حاجة معه لاستخدام أي دواء مسكن.

لمنظار الكبسولة بعض القيود ، فهو يستطيع فقط إيضاح المشكلة الموجودة ، ولكنه لا يتيح أي إجراء علاجي كإزالة ورم حميد مثلاً ، مما قد يتطلب الخضوع لإجراء آخر عن طريق المنظار التقليدي أو الجراحة.

2. هل سيكون هناك شعور بعدم الراحة ؟ هل هناك حاجة لأي دواء تخدير؟

لا ، فالكبسولة تقريباً بحجم كبسولة (حبة) مضاد حيوي كبيرة ، وتناولها مشابه لتناول الطعام الذي يملأ فمك.

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد؟

هناك مخاطر ومضاعفات لهذا الإجراء وهي تشمل ، وليست مقتصرة على:

مخاطر ومضاعفات شائعة وتشمل :

- تقريباً 1 من كل 100 مريض سيواجه صعوبة في إخراج الكبسولة . قد يكون ذلك لضيق في الأمعاء بسبب وجود ورم ، التهاب أو ندوب بسبب عملية سابقة. لا يشكل ذلك أي قلق على المدى القصير ولكن قد تكون هناك حاجة لجراحة لإخراج الكبسولة.

مخاطر ومضاعفات غير شائعة وتشمل :

- عدم ملاحظة ورم حميد ، نمو غير طبيعي أو مرض في الأمعاء.
- عدم اكتمال فحص الأمعاء بسبب تباطؤ وظائف الأمعاء.

مخاطر ومضاعفات نادرة وتشمل :

- الوفاة نادرة جداً بسبب هذا الإجراء.

4. التحضير للإجراء

إذا كنت تتناول حبوب الحديد ، فيجب إيقافها قبل الإجراء بسبعة أيام. من المهم والحيوي جداً أن تكون معدتك فارغة أثناء الفحص لضمان رؤية

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

procedure.

It is vital that your stomach is empty during the procedure to ensure a clear view.

No food for 10 hours and no fluids are to be taken at least 4 hours before you swallow the capsule.

No food for a further 4 hours after swallowing the capsule.

5. What if the doctor finds something wrong?

Your doctor will discuss with you any findings after the images from the capsule are downloaded and looked at on a computer.

6. What if I don't have the procedure?

Your symptoms may become worse and the doctor will not be able to give you the correct treatment without knowing the cause of your problems.

7. Are there other tests I can have instead?

There are other tests that can be done, such as x-rays, scans or small bowel endoscopy. Capsule endoscopy generally provides an accurate view of the entire small bowel not always possible with these other tests. Your doctor will discuss options with you.

8. What can I expect after a capsule endoscopy?

The capsule passes naturally with your bowel movement. You should not feel any pain or discomfort.

9. What are the safety issues?

You should not have an MRI scan whilst the capsule is inside you. Normally the capsule passes in 24 – 48hours.

Notify the hospital Emergency Department straight away if you have;

- Any abdominal pain.
- Nausea and vomiting.
- Black tarry motions or bleeding from the back passage (more than ½ cup of blood).
- A fever.

Notes to talk to my doctor about:

واضحة.

لا يجب أن تتناول أي طعام لعشر ساعات، ولا يجب أن تتناول أي سوائل لأربع ساعات قبل قيامك ببلع الكبسولة، ولا يجب أن تتناول أي طعام خلال الأربع ساعات التي تعقب ابتلاع الكبسولة.

5. ماذا لو اكتشف الطبيب وجود أمر مخالف للمألوف؟

بعد تنزيل الصور من الكبسولة ودراستها بالحاسب الآلي، سيقوم طبيبك بالنقاش معك حول نتائج الفحص.

6. ماذا لو لم أخضع للإجراء؟

قد تزداد الأعراض لديك سوءاً ولا يتمكن الطبيب من وصف العلاج الصحيح لك دون أن يكون على علم تام بسبب ما تعانيه من مشاكل.

7. هل هناك فحوصات بديلة عن هذا الفحص يمكنني الخضوع لها؟

توجد فحوص أخرى يمكن القيام بها مثل الأشعة السينية، فحوص إشعاعية أخرى، أو منظار الأمعاء الدقيقة. بشكل عام، يعطي منظار الكبسولة رؤية دقيقة لكامل الأمعاء الدقيقة قد لا يمكن الحصول عليها مع الفحوص الأخرى المذكورة. سيتناقش الطبيب معك حول الخيارات المتاحة.

8. ما الذي يمكنني توقعه بعد هذا الإجراء؟

الكبسولة تتحرك بشكل طبيعي مع حركة أمعائك. من المفترض أن لا تشعر بألم أو عدم الراحة.

9. ما هي الأمور المتعلقة بالسلامة؟

لا يجب أن تجري تصويراً بالرنين المغناطيسي خلال فترة وجود الكبسولة داخل جسدك. عادةً، تخرج الكبسولة مع البراز بشكل طبيعي بعد 24-48 ساعة.

قم فوراً بإبلاغ قسم الطوارئ في المستشفى إذا شعرت بـ:

- أي ألم في البطن.
- غثيان واستفراغ.
- براز أسود اللون (مثل القطران) أو نزيف من الدبر (أكثر من نصف كوب).
- ارتفاع في درجة الحرارة.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي:
