

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Patient Information Dacrocystogram

معلومات المريض تصوير الكيس الدمعي والقنوات الدمعية

1. What is a Dacrocystogram?

A Dacrocystogram is an x-ray procedure to look at your tear ducts.

A small tube is inserted into your tear duct and Contrast (once known as x-ray dye) is injected.

Contrast allows your tear ducts to be seen on the x-ray images.

2. Will there be any discomfort, is any anesthetic needed?

Mild discomfort may be felt when the tiny tube is inserted into the tear duct.

Anesthetic eye drops may be used to numb the eye. If the eye drops are used it may sting for a few seconds, then you will not feel any discomfort.

3. Preparation for the procedure

- The Medical Imaging Department will give you instructions on how to prepare for your procedure.
- Please tell the staff if you are or suspect you might be pregnant.
- Contact lenses must not be worn on the day of the procedure. Please wear your normal glasses.
- Please tell staff if you have an infection in either eye or in your tear ducts. The infection could become worse if the procedure is done.

4. During the procedure

- Plain x-ray images are taken of your tear ducts. If required, the anesthetic eye drops are put in.
- A tiny tube is inserted into the opening of the tear duct.
- You will be asked to close your eyes while the tube is taped into place.
- Contrast is injected through the tube into your tear duct and x-ray images are taken.
- At the end of the procedure the tube is removed. Sitting upright allows the contrast to drain from your eye. You may taste some of the contrast when it falls to the back of your throat.

5. After the procedure

Any tears or contrast can be wiped away with a tissue. If anesthetic eye drops were used, you should wear glasses or sunglasses to protect the eye. The eye drops take about 4 hours for the anesthetic effects to wear off.

6. What are the risks of this specific Procedure?

The risks and complications with this procedure can include but are not limited to the following.

Common risks and complications include:

- Failure of local anesthetic eye drops (if used). This may require a larger dose of anesthetic eye drops.

1. ما هو تصوير الكيس الدمعي والقنوات الدمعية ؟
تصوير الكيس الدمعي والقنوات الدمعية هو إجراء بالأشعة السينية لرؤية القنوات الدمعية.

يتم إدخال أنبوب صغير في القناة الدمعية وحقن مادة الوسط المتباين (تسمى سابقاً صبغة الأشعة السينية).
مادة الوسط المتباين تسمح للقنوات الدمعية بالظهور في الأشعة السينية.

2. هل سيكون هناك شعور بعدم الراحة ؟ هل هناك حاجة لأي دواء تخدير؟
قد تشعر بشيء من عدم الراحة عندما يتم إدخال الأنبوب الصغير في القناة الدمعية.
قد يتم تخدير العين بمخدر على شكل قطرات للعين. إذا استخدمت القطرات ، فقد تشعر بما يشبه اللسعة أو الدغة لبضع ثوان ، وبعدها سيختفي الشعور بعدم الراحة.

3. التحضير للإجراء
• يقوم قسم التصوير الطبي بإعطائك التعليمات المتعلقة بكيفية التحضير لهذا الإجراء.
• نرجو إبلاغ العاملين إن كنت حاملاً أو تشكين في كونك حاملاً.
• لا يجب وضع العدسات اللاصقة في اليوم المحدد لهذا الإجراء. نرجو استخدام النظارات المعتادة.
• نرجو إبلاغ العاملين إن كنت تعاني من عدوى في أي من العينين أو في القنوات الدمعية. قد تتفاقم العدوى مع هذا الإجراء.

4. أثناء الإجراء
• تؤخذ صور بالأشعة السينية العادية للقنوات الدمعية. توضع قطرات العين المخدرة عند الحاجة لها.
• يتم إدخال أنبوب صغير في فتحة القناة الدمعية.
• سيطلب منك إغلاق عينيك عند تثبيت الأنبوب في مكانه.
• تحقن مادة الوسط المتباين في القناة الدمعية عبر الأنبوب ويتم التقاط صور الأشعة السينية.
• في نهاية الإجراء ، يزال الأنبوب. البقاء جالساً في وضع مستقيم يسمح بتصريف مادة الوسط المتباين من العين. قد تشعر بطعم مادة الوسط المتباين عند سقوط بعض منها في الجهة الخلفية من الحلق.

5. بعد الإجراء
يمكنك مسح أي دموع تحتوي على مادة الوسط المتباين باستخدام منديل.
إذا كان قد استخدم قطرات العين المخدرة ، فعليك لبس النظارات أو النظارات الشمسية لحماية العين. عادة ما يستغرق انتهاء مفعول المخدر في القطرات حوالي الأربع ساعات.

6. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟

مخاطر ومضاعفات هذا الإجراء تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر ومضاعفات شائعة وتشمل :

- فشل مفعول قطرات العين المخدرة (في حالة استخدامها) مما قد يتطلب إعطاء جرعة أكبر منها.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Pain or discomfort with the tube insertion.

Less common risks and complications include:

- Unable to insert the tube into the tear duct.
- Infection, requiring antibiotics and further treatment.
- Allergic reaction to the contrast. This could result in a rash, hives, itching, nausea, fainting or shortness of breath. Medication may be given to relieve this.
- The procedure may not be possible due to medical and/or technical reasons.

Rare risks and complications include:

- Perforation of tear duct. This may require surgery and/or antibiotics.
- An increased lifetime cancer risk due to the exposure to x-rays.
- Death as a result of this procedure is very rare.

7. What are the safety issues when you leave the hospital?

Go to your nearest Emergency Department or GP if you become unwell.

Notes to talk to my doctor/health practitioner about:

- ألم أو شعور بعد الراحة عند إدخال الأنبوب.

مخاطر ومضاعفات غير شائعة وتشمل :

- عدم التمكن من إدخال الأنبوب في القناة الدمعية.
- عدوى يتطلب علاجها مضادات حيوية وعلاج آخر.
- تفاعل تحسسي لمادة الوسط المتباين . قد يسبب ذلك طفح جلدي ، احمرار وازدياد سماكة الجلد (ارتيكاريا) ، حكة ، غثيان ، إغماء أو ضيق في التنفس . قد تكون هناك حاجة لإعطاء أدوية لعلاج ذلك.
- قد لا يمكن القيام بالإجراء لأسباب طبية و \ أو فنية (تقنية).

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث وتشمل:

- انتقاب القناة الدمعية . قد يتطلب ذلك جراحة وأو مضادات حيوية
- زيادة معدل الخطر للإصابة بالسرطان خلال الحياة بسبب التعرض للأشعة السينية.
- الوفاة بسبب هذا الإجراء نادرة جداً .

7. ما هي الأمور المتعلقة بالسلامة بعد مغادرة المستشفى؟

توجه لأقرب قسم طوارئ أو لطبيبك العام إذا شعرت بأنك لست على ما يرام.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي/الممارس الصحي:
