

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information – Patient Copy
Drug Challenge Test (Intradermal Skin Test)

معلومات الإقرار – نسخة المريض
 اختبار تحمل الدواء (اختبار الجلد – الحقن داخل الأدمة)

1. What is a drug challenge test (intradermal skin test)?

Diluted drugs will be injected into the skin (intradermally) on the back or the forearm. The skin response is observed and recorded. The results are recorded twenty minutes after the injections. A positive result is when a wheal (lump) and flare (red colour of the skin) develop. These are often itchy and can last 24hr, rarely longer.

Skin Testing is not absolutely specific and false negative and false positive results can occur. Further tests may be recommended to help confirm the cause of the reaction. The doctor will discuss these if they are indicated.

2. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this investigation. They include but are not limited to the following.

Specific risks:

- This investigation has very few risks because the drugs that are injected are diluted to levels that are believed to be safe. However, there is always a very small risk that a drug could cause a reaction.
- As with any drug reaction, rarely death can occur. However, when diluted drugs are used this is even less likely.
- The skin around the injection site can remain red and itchy until the next day, infrequently requiring topical soothing creams.
- Rarely false negative and false positive results can occur.
- Death as a result of this procedure is possible.

3. How should I prepare for this investigation?

It is important that patients understand that they do not need to starve before skin testing. In fact it is recommended that they do not miss their breakfast/ lunch beforehand.

4. Can I carry out on taking my medication?

Some medications can interfere with the skin test results. These include antihistamines and steroids (such as prednisone and hydrocortisone). If you are on these types of medication please inform the skin testing bookings secretary before you attend your skin testing appointment.

If it is possible you may need to stop some medications before the skin tests but this needs to be discussed with the doctor.

Notes to talk to my doctor about:

1. ما هو اختبار تحمل الدواء (اختبار الجلد – الحقن داخل الأدمة)؟

يتم حقن الدواء المخفف داخل الجلد (داخل الأدمة) في الظهر أو في الساعد. تتم ملاحظة وتسجيل استجابة الجلد للحقنة. يتم تسجيل النتائج بعد 20 دقيقة من إعطاء الحقنة. تكون النتيجة إيجابية عند ظهور انتفاخ (تورم) و توهج (احمرار لون الجلد)، وغالباً ما تسبب الحكة، وقد تظل لـ 24 ساعة. من النادر أن تتجاوز فترة بقاءها 24 ساعة.

اختبار الجلد لا يعطي نتائج محددة تماماً، وقد تكون هناك نتائج سلبية خاطئة، ونتائج إيجابية خاطئة. قد ينصح المريض بالخضوع للمزيد من الاختبارات لتأكيد سبب رد فعل الجلد. سيناقش معي الطبيب هذه الاختبارات إذا كان هناك ما يستدعي خضوعي لها.

2. ما هي المخاطر المحددة لهذا الإجراء؟

هناك مخاطر و مضاعفات مرتبطة بهذا الاختبار و هي تشمل، ولكنها غير محصورة في ما يلي:

مخاطر محددة:

- هذا الاختبار له مخاطر قليلة جداً لأن الأدوية التي تحقن يتم تخفيفها لمستويات موثوق من درجة أمانها، إلا أنه يظل دائماً وجود احتمال ضئيل جداً بأن يسبب الدواء رد فعل.
- عند حدوث رد فعل لأي دواء، فمن النادر أن يسبب ذلك الوفاة، وعند استخدام الأدوية المخففة فإن احتمال حدوث الوفاة يقل أكثر.
- منطقة الجلد المحيطة بموضع دخول الإبرة قد تظل حمراء ومصابة للحكة إلى اليوم التالي للاختبار، وقد تتطلب وضع كريم ملطف عليها.
- من النادر حدوث نتائج سلبية خاطئة، ونتائج إيجابية خاطئة.
- الوفاة محتملة بسبب هذا الإجراء.

3. كيف ينبغي لي التحضير لهذا الاختبار؟

من المهم معرفة المرضى بأن خضوعهم لهذا الإجراء لا يتطلب عدم تناولهم الطعام لفترة معينة قبل الخضوع له، بل بالعكس فإنه من الأفضل عدم قيامهم بترك أيًا من الوجبات التي يتناولونها قبل الاختبار كوجبة الإفطار أو الغداء.

4. هل بإمكانني الاستمرار في تناول أدويتي؟

قد تتداخل بعض الأدوية مع نتائج اختبار الجلد. من ضمن هذه الأدوية: مضادات الهيستامين والأدوية الستيرويدية (مثل البرينيديسولون والهيدروكورتيزون). إذا كنت تتناول مثل هذه الأدوية، نرجو إبلاغك الموظفة المسؤولة عن إعطاء مواعيد اختبار الجلد قبل حضورك لموعد إجراء الاختبار. إذا كان ذلك ممكناً، فقد تضطر للتوقف عن تناول بعض الأدوية قبل إجراء الاختبار، إلا أن ذلك ينبغي مناقشته مع الطبيب.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي:
