

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient Copy Haemorrhoid – Stapled

معلومات الإقرار – نسخة المريض تدبيس البواسير

1. What is haemorrhoid stapling?

Haemorrhoids are distended blood vessels that form either externally (around the anus) or internally (in the lower rectum). They look like a cluster of veins.

Stapling is used to return the haemorrhoids to a normal position inside the bowel. The staples are left permanently in the body.

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic.

See **Anaesthetic: Nerve Block information sheet OR Epidural and Spinal Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung

1. ما هو تدبيس البواسير ؟

البواسير هي أوعية دموية منتفخة تتكون إما خارجياً (حول فتحة الشرج) أو داخلياً (في الجزء السفلي من المستقيم). تظهر البواسير كعقود من الأوردة. يستخدم التدبيس لإعادة البواسير إلى موقعها الطبيعي داخل الأمعاء. ويتم ترك الدبابيس إلى الأبد داخل الجسم.

2. التخدير الذي أتلقاه

يتطلب الإجراء الخضوع للتخدير .
اقرأ تعليمات التخدير الخاصة بك
أو معلومات التخدير لعصب معين
أو معلومات التخدير النصفي: التخدير النخاعي (الشوكي) &
تخدير فوق الجافية ، لتحصل على المزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.
إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى
- حدوث نزيف مما قد يتطلب إعادتك مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً إذا كنت ممن يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفير) أو عقار دايابير دامول (بيرسانتن أو اساسانتن)
- قد يحدث انهيار (انطباق) لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر ، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى



Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

complications, and thrombosis.

- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible

Specific risks:

- There may be difficulty passing your urine and a catheter may have to be inserted into the bladder.
- The tissues about the anus may swell up considerably.
- Infection in the stapled area 1 in 8 cases. This may be treated with antibiotics.
- Heavy bleeding from the haemorrhoid wound can occur one to two weeks after the surgery needing further surgery.
- The anus may scar up in the years to come and cause a stricture, i.e. narrowing of the back passage.
- More haemorrhoids can occur in the future.
- Increased risk in smokers of wound and chest infections, heart and lung complications and thrombosis.

Notes to talk to my doctor about:

والتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ،
وجلطات الأوعية الدموية

- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم
يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل
جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر خاصة بهذا الإجراء:

- قد تكون هناك صعوبة في إدرار البول مما قد يتطلب وضع
أنبوب (قسطرة بولية) في المثانة.
- قد يحدث تورم كبير في الأنسجة القريبة من الشرج.
- في 1 من كل 8 مرضى ، قد تحدث عدوى في الدبابيس .يمكن
علاجها بالمضادات الحيوية.
- قد يحدث نزيف حاد من جرح البواسير بعد أسبوع أو
أسبوعين من العملية مما يتطلب جراحة أخرى.
- قد تحدث ندوب في الشرج خلال الأعوام اللاحقة مسببة ضيقاً
في الدبر.
- قد تظهر المزيد من البواسير في المستقبل.
- عند المدخنين تزداد عدوى الجرح والصدر ومضاعفات القلب
والرئة والتخثرات الدموية.

أمر أقوم بمناقشتها مع طبيبي المعالج
