

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient's Copy Passage of Sounds

معلومات الإقرار - نسخة المريض إدخال معدات التوسيع

1. What do I need to know about this procedure?

A passage of sounds procedure involves dilatation (widening) of the passage (urethra) that brings the urine from the bladder to the outside, to prevent a blockage of the flow of urine.

2. My anesthetic

This procedure will require an anesthetic.

See **About Your Anesthetic information sheet** for information about the anesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.

1. ما الذي ينبغي عليّ معرفته عن هذا الإجراء؟

إجراء إدخال معدات التوسيع تتم فيه عملية توسيع الإحليل (القناة التي تنقل البول من المثانة البولية إلى خارج الجسم) ، وذلك لمنع حدوث انسداد لتدفق البول.

2. التخدير الذي أتلقيه

سوف يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير .
اقرأ ورقة معلومات التخدير المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة عليه. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.
إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد ؟

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دابيبيردامول (بيرسانتن أو اساسانتن).
- قد يحدث انهيار (انطباق) لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بعدوى في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- The narrowing may not be able to be dilated (widened) and further treatment may be necessary.
- Rarely, damage to the urethra (the passage which brings urine out of the bladder). This may cause a stricture or narrowing of the urethra. A false passage may be produced causing leakage of urine.
- Damage to the bladder such as perforation of the bladder. This may require further surgery.
- Swelling at the exit of the bladder which may result in urine retention.
- Bacteria may get into the blood stream with the development of septicaemia. This may need treatment with antibiotics.
- Bleeding, which may stain the urine color and sometimes cause blockage of urine flow.
- Burning and scalding of urine for a few days after the procedure.

Notes to talk to my doctor about:

- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- قد لا يمكن توسعة الضيق مما يتطلب معالجة أخرى.
- نادراً ما يحدث ضرر للإحليل (القناة التي تنقل البول من المثانة البولية إلى خارج الجسم). قد يسبب ذلك تضيق في الإحليل ، وقد ينتج عن ذلك ممر غير حقيقي يؤدي إلى تسرب البول.
- حدوث ضرر للمثانة البولية كحدوث ثقب فيها على سبيل المثال ، مما قد يتطلب جراحة أخرى.
- تورم في مخرج المثانة البولية مما قد يسبب حصر البول.
- قد تدخل البكتيريا إلى مجرى الدم وتسبب تجرثم (تسمم) الدم. قد يتطلب ذلك العلاج بالمضادات الحيوية.
- حدوث نزيف قد يؤدي إلى تلون البول (باللون الأحمر) وقد يسبب أحياناً انسداد لتدفق البول.
- الشعور بحرقان وحرارة عند التبول لعدة أيام بعد الإجراء.

أمور أتأقش حولها مع طبيبي:
