

Consent Information – Patient Copy Drug Challenge Testing (Subcutaneous)

معلومات الإقرار – نسخة المريض اختبار تحمل الدواء (حقنة تحت الجلد)

1. What is a drug challenge test (subcutaneous)?

Recordings of routine baseline observations (blood pressure - BP, pulse - P and pulse oximetry - SpO2 etc) will be made. A cannula will then be inserted into a vein (intravenous cannula). Diluted samples of the test drug will be prepared. The most dilute specimen will be injected subcutaneously.

Providing no adverse reaction occurs to the test drug, samples of increasing concentration will be tested. Routine monitoring of observations (BP, P, SpO2 etc) will be observed and recorded.

Should there be no adverse response after a predetermined time (minimum of 30 minutes) then a less diluted sample of the drug will be injected subcutaneously.

The development of any signs of 'anaphylaxis' will be regarded as a POSITIVE result. For example low BP (hypotension), wheezy chest (bronchospasm), swelling of the face and /or throat (oedema), a skin reaction (rash).

If signs develop, treatment with adrenaline and intravenous fluids will be given as required.

No further challenge will be performed if a reaction occurs.

There are real risks involved with Direct Challenge Testing, and it is only undertaken when there is no other test available, that can unequivocally determine whether the drug is safe to use.

2. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this investigation. They include but are not limited to the following.

Specific risks:

- As with any drug reaction, the most severe risk is Death.

Other severe risks:

- Low Blood pressure (Hypotension)
- Wheeze (Bronchospasm)
- Swelling of the face and throat (Oedema)
- Cardiac Arrest

- If a serious complication arises during testing this may require admission to hospital as part of the treatment.

3. What do I need to know about medication?

Some medications can interfere with testing.

It is very important that you discuss any medications you are taking with the doctor beforehand. If it is possible you may need to stop some medications before the tests but this needs to be discussed with the doctor.

Notes to talk to my doctor about:

1. ما هو اختبار تحمل الدواء (حقنة تحت الجلد)؟

يتم تسجيل الملاحظات الاعتيادية المبدئية (ضغط الدم ، النبض و نسبة تشبع الدم بالأوكسجين ، الخ) . يتم بعد ذلك إدخال إبرة الخط الوريدي في الوريد.

يتم تحضير عينات مخففة من دواء الاختبار. يتم حقن أكثر عينة تم تخفيفها (العينة الأقل تركيزاً للدواء) تحت الجلد.

شريطة عدم ظهور تفاعلات عكسية لدواء الاختبار ، يتم اختبار عينات ذات تركيز متزايد .

يتم مراقبة و تسجيل الملاحظات الاعتيادية المبدئية (ضغط الدم ، النبض و نسبة تشبع الدم بالأوكسجين ، الخ).

إذا لم تحدث أي استجابة عكسية بعد مرور فترة زمنية محددة مسبقاً (30 دقيقة على الأقل) ، يتم حقن عينة أقل تخفيفاً تحت الجلد.

يعتبر ظهور أي علامة للحساسية المفرطة نتيجة إيجابية ، مثل انخفاض الضغط ، صفير في الصدر (تشنج مجاري التنفس) ، تورم (استسقاء) الوجه وأو الحنجرة ، ردود فعل على الجلد (الطفح الجلدي).

عند ظهور الأعراض ، يتم إعطاء العلاج بالـ (أدرينالين) والمحاليل الوريدية حسب الحاجة.

لن يتم إجراء اختبار تحمل آخر للدواء عند ظهور التفاعلات.

هناك مخاطر حقيقية مرتبطة بالاختبارات المباشرة لتحمل الدواء ، ولا يتم

إخضاع المريض لهذه الاختبارات إلا في حالة عدم توفر اختبار آخر يمكن معه

وبشكل لا لبس فيه تحديد ما إذا كان الدواء يمكن استخدامه بأمان.

2. ما هي المخاطر المحددة لهذا الإجراء؟

هناك مخاطر و مضاعفات مرتبطة بهذا الاختبار و هي تشمل ، ولكنها غير محصورة في ما يلي:

مخاطر محددة:

- كما هو الحال مع أي تفاعل لأي دواء ، فإن الخطر الأكبر هو الوفاة.

مخاطر أخرى شديدة:

- انخفاض ضغط الدم
- صفير في الصدر (تشنج مجاري التنفس)
- تورم الوجه و الحنجرة (استسقاء)
- السكتة القلبية

- عند حدوث مضاعفات خطيرة لاختبار الدواء قد يتطلب ذلك تنويم المريض في المستشفى كجزء من العلاج.

3. ما الذي ينبغي علي معرفته عن الدواء؟

قد تتداخل بعض الأدوية مع الاختبار.

من الضروري أن تتناقش مع الطبيب حول أي أدوية تتناولها قبل خضوعك للاختبار. إذا كان ذلك ممكناً ، فقد تضطر للتوقف عن تناول بعض الأدوية قبل

إجراء الاختبار ، إلا أن ذلك ينبغي مناقشته مع الطبيب.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي:
