

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient Copy Facelift (Melopecty or Rhytidectomy)

معلومات الإقرار - نسخة المريض عملية تجميل الوجه (رأب الخد أو قطع تجاعيد الجلد)

1. What do I need to know about this procedure?

A facelift is surgery to remove facial wrinkles, sagging skin, fat deposits, or other visible signs of aging for cosmetic purposes.

Cuts are carefully placed to hide them in the facial creases around the ear, in the hair and above and behind the ear. The skin from the cheek and the upper neck are then lifted.

Tension on the face and neck is taken in the hairline. Sometimes other modifications are also made such that the muscles and other layers just under the skin are pulled back to help tighten the skin and sometimes re-shaping of the neck is performed.

The operation usually takes between 2-4 hours or longer.

Important Information

Before the operation, you must tell the surgeon performing the operation and the anaesthetist of:

- any medical problems
- any eye and vision problems
- any allergies
- prescribed drugs (particularly blood thinning drugs such as Aspirin or Warfarin)
- your use of recreational drugs
- your alcohol consumption
- your use of herbal remedies

Any drugs containing Aspirin or similar compounds should be stopped prior to surgery as these increase the risk of bleeding and, therefore, haematoma formation.

Varying forms of anaesthesia can be used and a few days in hospital after the operation are usual. The first night is usually spent with the face

1. ما الذي ينبغي علي معرفته عن هذا الإجراء؟

عملية تجميل الوجه هي جراحة لإزالة تجاعيد الوجه ، الجلد المترهل ، تجمعات الدهون ، أو أي من العلامات الظاهرة لتقدم السن بغرض التجميل.

يتم بحذر عمل شقوق جراحية لإخفائها في طيات الوجه حول الأذن ، في الشعر وفوق وخلف الأذن. يتم بعد ذلك رفع الجلد من الخد وأعلى الرقبة .

الشد في الوجه والعنق يوضع على خط الشعر. يتم أحياناً القيام ببعض التعديلات كأن يتم سحب العضلات وبعض الطبقات الموجودة مباشرة تحت الجلد إلى الخلف للمساعدة في شد الجلد ، وأحياناً يجرى إعادة تشكيل للعنق. عادةً ما تستغرق العملية ما بين 2-4 ساعات أو أكثر.

معلومات هامة:

قبل العملية يجب إبلاغ الجراح وطبيب التخدير المسؤولين عن حالتك بالتالي:

- أي مشاكل صحية يعاني منها المريض
 - أي مشاكل في العين و النظر
 - أي نوع من أنواع الحساسية
 - الأدوية الموصوفة التي يتناولها المريض (بالأخص الأدوية المسببة لزيادة سيولة الدم كالأسبرين والوارفرين)
 - استخدام المريض لأي نوع من أنواع المخدرات أو العقاقير الترفيهية
 - احتساء المريض للكحوليات
 - استخدام المريض للعلاجات العشبية.
- يجب قبل الخضوع للجراحة التوقف عن تناول أي دواء يحتوي الأسبرين أو أي مركبات مشابهة لأنها تزيد من خطر النزيف مما قد يسبب حدوث التورم الدموي.
- يمكن استخدام طرق متعددة للتخدير ، كما أنه من المعتاد بقاء المريض في المستشفى لبعض الأيام بعد الجراحة.
- يتم قضاء الليلة الأولى بوجود الضماد على الوجه ، إلا أن الضماد

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

bandaged but a day or so later the bandages are removed and the operation inspected and redressed.

The hair is commonly washed before the patient goes home. Dark glasses may be worn if the eyelids are bruised. The hair hides most of the operation sutures, but a scarf can be helpful. Usually a fine strip of hair is trimmed immediately before the operation and it is this skin, clipped of hair, which is removed during the operation so that afterwards there is little evidence of shaving or baldness along the operation line.

The cut will obviously result in scar formation. The scars are usually pink to start with, generally fade and become white, soft and supple over the next weeks or months. The scar in the hairline may become visible with parting of the hair. The scar behind the ear may be the most noticeable and it is helpful to have a hairstyle, which can cover this area. Small hairless areas can sometimes be found adjacent to the scar but these can usually be hidden with the hair. Hair growth will recommence after three months.

The wrinkles on the lips and those ingrained in the corners of the mouth and eyes are not helped by this operation. The forehead is not included in the same procedure.

In the neck region, improvement will be a reduction in the amount of loose skin but it will not remove the creases in the neck, which are normal and present from childhood.

Occasionally an extra scar is placed immediately below the chin in order to remove excess fat in this area.

Immediately after the operation, the patient should avoid over-activity and bending over for up to three weeks. Dark glasses are also helpful in the immediate post-operative period.

Post-operatively there is normally discomfort because of the tightening rather than pain. There may be tender areas, more commonly below the

يزال بعد يوم تقريباً ، وتتم معاينة العملية وإعادة غيارات الجروح.

يتم عادةً غسل الشعر قبل مغادرة المريض إلى المنزل. يلبس المريض نظارة داكنة (شمسية) إذا كانت هناك كدمات في جفون العين. يخفي الشعر معظم الغرز الجراحية للعملية ، ولكن تغطية الرأس بوشاح أو طرحة قد يكون مناسباً. من المعتاد أن يتم تقليم أجزاء دقيقة من الشعر قبل العملية مباشرة حيث أن هذا هو جزء الجلد والشعر المقصود الذي تتم إزالته أثناء العملية بحيث لا يظهر بعد العملية إلا أثراً بسيطاً للحلق أو الصلع على طول الشق الجراحي للعملية.

من الطبيعي أن ينتج عن الشق الجراحي تكوّن ندب . في بداية الأمر يكون لون الندوب وردياً ، ثم يبدأ هذا اللون في التلاشي عموماً ويتحول لونها إلى الأبيض وتصبح رطبة ولينة خلال الأسابيع أو الأشهر اللاحقة. قد يظهر ندب خط الشعر عند تفريق الشعر.

قد تكون الندوب الموجودة خلف الأذن هي الأكثر ظهوراً و ملاحظة وقد يساعد في ذلك أن يختار المريض تسريحة شعر تغطي هذه المنطقة. قد توجد مناطق صغيرة ليس فيها شعر بجوار الجرح ، إلا أنه يمكن عادةً إخفاءها بالشعر. يعود الشعر للنمو بعد مرور ثلاثة أشهر.

لا تفيد هذه الجراحة تجاعيد الشفة والتجاعيد العميقة في زوايا الفم والعينين .

الجبهة لا تدخل ضمن نطاق هذه الجراحة. في منطقة العنق ، يكون التحسين بتقليل كمية الجلد المترهل إلا أن الجراحة لن تزيل طيات العنق والتي تكون طبيعية و موجودة منذ الولادة.

أحياناً يوضع ندب زائد مباشرة أسفل الذقن لإزالة الدهون الفائضة من هذه المنطقة.

مباشرة بعد العملية ، على المريض تجنب النشاط المفرط والانحناء لمدة تصل إلى الثلاثة أسابيع ، كما أن استخدام النظارات الشمسية مفيد في الفترة التي تعقب الجراحة مباشرة.

بعد العملية يكون هناك شعور بعدم الارتياح ويكون سبب ذلك الشعور بالشد أكثر من كونه بسبب الألم . قد تكون هناك مناطق تسبب الألم عند لمسها وغالباً ما تكون أسفل الأذن وفي جانب العنق.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

ears and on the side of the neck.

If any post-operative pain develops and/ or persists, the surgeon must be told, as this may a sign of complications.

Improvement is the aim of cosmetic surgery and not perfection. Further operations may be required to improve the overall result.

As with all cosmetic surgery the problems have to be weighed against the benefits, which can be most significant.

2. My Anaesthetic.

This procedure will require a general anaesthetic. See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor. If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.

إذا ظهر أي ألم بعد العملية أو كان مستمراً ، فيجب إبلاغ الجراح . قد يكون ذلك علامة بوجود مضاعفات.

إن هدف الجراحة التجميلية هو تحسين المظهر وليس الوصول إلى الكمال. قد تكون هناك حاجة لعمليات لاحقة لتحسين المظهر النهائي بشكل شامل.

كما هو الحال مع سائر الجراحات التجميلية ، فإن مضار الإجراء يجب أن توزن وتوازن بفوائده والتي قد تكون أكثر أهمية.

2. التخدير الذي أتلقاه

سوف يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير الكلي .
اقرأ ورقة تعليمات التخدير المقرر لك للمزيد من المعلومات عن
نوع التخدير والمخاطر المترتبة عليه . إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات ، قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.
إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد ؟

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات ، وهي تشمل ، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتن أو اساسانتين).
- قد يحدث انغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- عند عند المرضى ذو الوزن الزائد أو السمنة المفرطة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- The scar in the hairline may become visible with parting of the hair. The scar behind the ear may be the most noticeable. The scars may become thickened, red and itchy. Small hairless areas can sometimes be found adjacent to the scar but these can usually be hidden with the hair.
- Numbness around the cheeks and sometimes the ears which is usually temporary, six to twelve months.
- Damage to the facial nerve. This results in weakness of the facial muscles. This is usually temporary, about six months.
- Bleeding, this can cause a collection of blood under the skin. This may be severe and may cause loss of some of the skin on the face. Further surgery may be needed to drain this and remove the clot as it forms.
- Bruising and swelling, this may cause a blood clot which may need to be surgically removed.

Notes to talk to my doctor about:

- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر محددة:

- قد يصبح ندب خط الشعر ظاهراً عند قيام المريض بتفريق الشعر. قد يكون الندب خلف الأذن الأكثر ظهوراً وملاحظة. قد تصبح الندوب سمكية ، حمراء اللون وتسبب الحكة. قد توجد مناطق صغيرة ليس فيها شعر بجوار الندب، إلا أنه يمكن عادة إخفائها بالشعر.
- خدر حول الخدين وأحياناً الأذنين . عادةً ما يكون ذلك مؤقت (6-12 شهر).
- ضرر لعصب الوجه مما يسبب ضعف في عضلات الوجه . عادةً ما يكون ذلك مؤقت (6 أشهر تقريباً).
- النزيف ، قد يسبب ذلك تجمع الدم تحت الجلد. قد يكون ذلك شديداً وقد يسبب فقدان لبعض جلد الوجه. قد تكون هناك حاجة لجراحة أخرى لسحب الدم وإزالة التجلطات عند تكونها.
- كدمة وتورم . قد يسبب ذلك تجلط دموي يحتاج لإزالته جراحياً.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي:
