

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient Copy Ingrown Toenail(s) & Removal of Nail Bed

معلومات الإقرار- نسخة المريض نمو ظفر (أظافر) القدم للداخل & إزالة الجلد تحت الظفر

1. What do I need to know about this procedure?

This procedure is the removal of part or all of the nail and nail bed.

2. My Anaesthetic.

This procedure will require an anaesthetic.

See **About Your Anaesthetic OR Anaesthetic:**

Nerve Blocks for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.

Specific risks:

- The toe may swell up considerably and this may cause the bandage to be tight and cause gangrene to the toe.
- Part of the nail may grow again and this may need further surgery.
- In some people healing of the wound may be

1. ما الذي ينبغي عليّ معرفته عن هذا الإجراء؟
يتم في هذا الإجراء إزالة جزء من أو كامل الظفر والجلد الموجود أسفل الظفر.

2. التخدير الذي أتلقاه
يتطلب الإجراء الخضوع للتخدير .
اقرأ تعليمات التخدير أو التخدير لعصب معين المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.
إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها .

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر عامة:

- قد يحدث التهاب ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى .
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايبايردامول (بيرسانتن أو اساسانتين)
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.

مخاطر خاصة بهذا الإجراء:

- قد يتورم اصبع القدم بشكل كبير مما قد يجعل الضمادة مشدودة عليه ، وقد تسبب غرغرينا (موت الخلايا) لأصبع القدم .
- قد ينمو جزء من الظفر مرة أخرى مما قد يتطلب جراحة أخرى.
- عند بعض المرضى ، يحدث التئام الجرح بشكل غير طبيعي.



المركز الطبي الدولي
International Medical Center

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

abnormal and the wound can be thickened and the wound may be painful.

Notes to talk to my doctor about:

قد تزداد سماكة الجرح وقد يكون مؤلماً.

أمر أقوم بمناقشتها مع طبيبي المعالج
