

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information -patient's copy Liver Biopsy


معلومات الإقرار - نسخة المريض
خزعة (عينة) الكبد

1. What is liver biopsy?

A liver biopsy is where a small piece of liver tissue is removed so that it can be checked by pathology. Looking at the liver tissue itself is the best way to see how much damage there is and what is causing it to be damaged. The doctor will give you an injection of local anaesthetic into the skin over the liver. You will be asked to take a few deep breaths and then hold your breath. While you are holding your breath, the biopsy needle is put into the liver and a small piece of tissue is taken. The procedure may be repeated a multiple times to obtain the necessary samples. It usually only takes about 5 minutes to complete the entire procedure. This procedure may or may not require a sedation anaesthetic.

2. Will there be any discomfort? Is any anaesthetic needed?

The procedure can be uncomfortable and to make the procedure more comfortable a sedative injection or a light anaesthetic may be given. Before procedures begin, the doctor will insert a drip into a vein in your hand or forearm. This is where the sedation or anaesthetic is injected.



Medical Illustration Copyright © 2008 Nucleus Medical Art. All Rights Reserved. www.nucleusinc.com

3. What is sedation?

Sedation is the use of drugs that give you a 'sleepy-like' feeling. It makes you feel very relaxed during a procedure that may be otherwise unpleasant or painful.

This procedure only has a light sedation. You need to be able to fully co-operate at times by holding your breath when instructed by the doctor.

Anaesthesia is generally very safe but even light sedation has a risk of side effects and complications. Whilst these as a rule are temporary, some of them may cause long-term problems.

1. ما هي عينة الكبد؟

عند أخذ عينة الكبد ، تؤخذ قطعة صغيرة من نسيج الكبد ليتمكن مختبر علم الأمراض من فحصها. النظر المباشر لنسيج الكبد هو أفضل الطرق للتعرف على حجم الضرر الحادث ومعرفة سبب هذا الضرر. يقوم الطبيب بحقنك بمخدر موضعي في الجلد فوق الكبد .


سيطلب منك أن تأخذ نفس عميق لعدة مرات ثم حبس (كتم) النفس . وبينما أنت حابساً للنفس ، يتم إدخال الإبرة المخصصة لأخذ العينة داخل الكبد ويتم من خلالها أخذ قطع صغيرة من الكبد.

قد تتم إعادة ذلك عدة مرات لضمان الحصول على القدر المناسب من العينة. عادةً ما يستغرق هذا الإجراء حوالي خمس دقائق للقيام به . هذا الإجراء قد ، وقد لا يتطلب التخدير بحقنة مسكنة.

2. هل سيكون هناك شعور بعدم الراحة ؟ هل هناك حاجة لأي دواء تخدير؟

هذا الإجراء قد لا يكون مريحاً ، ولجعله مريحاً قد يتم إعطائك حقنة مسكنة (مخدر خفيف).

قبل الإجراء ، يقوم الطبيب بتركيب خط وريدي لك في اليد أو الساعد و يوصله بمحقنة. يتم حقن المسكن أو الدواء المخدر عن طريق هذه الإبرة الوريدية.



Medical Illustration Copyright © 2008 Nucleus Medical Art. All Rights Reserved. www.nucleusinc.com

3. ماذا يعني التسكين (إعطاء دواء مسكن)؟

هو إعطاء دواء يعطيك شعور بالنوم ويجعلك مسترخ جداً خلال الإجراء ، حيث أن القيام بهذا الإجراء دون إعطاء مسكن قد يكون مزعج ومؤلم.

في هذا الإجراء تعطى مسكن خفيف . من المهم أن تكون قادراً على التجاوب التام مع الطبيب عندما يطلب منك حبس النفس.

التخدير بشكل عام آمن ، إلا أنه حتى الدواء المسكن قد تكون له مخاطره وآثاره الجانبية و مضاعفاته ، وعلى الرغم أن غالبيتها تكون مؤقتة ، إلا أن البعض منها قد تكون له مشاكل طويلة الأمد.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

The risk to you will depend on:

- Personal factors, such as whether you smoke or are overweight.
- Whether you have any other illness such as asthma, diabetes, heart disease, kidney disease,
- High blood pressure or other serious medical conditions.

4. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

Common risks and complications include:

- Pain at either the biopsy site or in the right shoulder which may last for a couple of days after the procedure. This may require pain relief medication.
- Nausea and vomiting.
- Faintness or dizziness, especially when you start to move around.
- Headache.
- Pain, redness or bruising at the sedation injection site (usually in the hand or arm).
- Muscle aches and pains.
- Allergy to medications given at time of the procedure.
- Failure of local anaesthetic. This may require a further injection of anaesthetic.

Uncommon risks and complications include:

- Internal bleeding. This may settle without treatment but could require a blood transfusion and/or surgery.
- 1 person in every 500 will have severe bleeding requiring a hospital admission.
- About 1 person in every 200 will have an injury or an organ punctured that is near your liver such as the right lung, gallbladder or bowel. This may need further treatment or surgery.
- Heart problems. You will need to stop any blood thinning medication (Aspirin, Clopidogrel (Plavix and Isocover) or Dipyridamole (Persantin and Asasantin) you may usually take. This results in a risk of clots, heart attack or stroke in the time you are off these medications.
- An existing medical condition that you may have getting worse.
- Clots in the leg (deep vein thrombosis or DVT) with pain and swelling. Rarely part of this clot may break off and go into the lungs.
- The biopsy may not get enough tissue to be useful.

Rare risks and complications include:

- Infection. This will need antibiotics.
- "Dead arm" type feeling in any nerve, due to

المخاطر بالنسبة لك تتوقف على:

- عوامل شخصية مثل التدخين أو زيادة الوزن.
- إذا كنت مصاب بأمراض أخرى كالربو الشعبي ، السكري ، مرض في القلب ، مرض في الكلى ،
- ارتفاع في ضغط الدم أو أي مشكلة طبية أخرى خطيرة.

4. ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد؟

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر ومضاعفات شائعة وتشمل :

- ألم إما في منطقة العينة أو في الكتف الأيمن والذي قد يستمر ليومين بعد الإجراء. قد يتطلب ذلك تناول أدوية للألم.
- غثيان واستفراغ.
- إغماء أو دوخة خاصة بعد البدء في ممارسة الحركة.
- صداع.
- ألم ، احمرار أو كدمة في موضع حقن المخدر (في اليد أو الذراع).
- أوجاع وألم في العضلات.
- تفاعل تحسسي للأدوية التي أعطيت أثناء القيام بالإجراء.
- فشل في عمل المخدر الموضعي مما قد يتطلب تكرار الجرعة.

مخاطر ومضاعفات غير شائعة وتشمل :

- نزيف داخلي . قد يتوقف دون معالجة ، ولكنه قد يتطلب نقل دم وأو جراحة.
- مريض واحد من بين كل 500 مريض قد يعاني من نزيف شديد يتطلب تنويمه في المستشفى.
- مريض واحد من بين كل 200 مريض قد يعاني من ضرر أو انثقاب لعضو آخر قريب من الكبد كالرئة اليمنى ، الحويصلة المرارية أو الأمعاء. قد يتطلب ذلك معالجة أخرى أو جراحة.
- مشاكل في القلب . لا بد من توقفك عن تناول أيًا من الأدوية المسيلة للدم كالأسبرين ، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) ، داي بايردامول (بيرسانتين ، اساسانتين) أو أي عقار آخر لنفس الغرض تقوم بتناوله عادة لأنها تسبب خطر تخثر الدم ، الأزمة القلبية أو السكتة الدماغية في أوقات توقفك عن استخدامها.
- تفاقم أي مشكلة صحية أخرى يعاني منها المريض.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- قد لا يكون حجم العينة الذي تم الحصول عليه كافياً وذو فائدة.

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث وتشمل:

- عدوى تتطلب المعالجة بمضادات حيوية.
- "الذراع الميت" شعور يحدث لأي عصب نتيجة تضرره بوضعية المريض

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

positioning with the procedure – usually temporary.

Notes to talk to my doctor about:

أثناء الإجراء. عادةً يكون مؤقتاً.

أمور أتناقش حولها مع طبيبي:
