

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information – Patient's Copy Lumbar Puncture (X-ray Guidance)

معلومات الإقرار – نسخة المريض
البزل القطني (موجه بالأشعة السينية)


1. What is a Lumbar Puncture?

A guided Lumbar Puncture is a procedure to collect a sample of cerebrospinal fluid (CSF). The sample is sent to pathology for testing.

X-ray images are used to guide the insertion of the needle.

2. Will there be any discomfort, is any anaesthetic needed?

This procedure will require an injection of local anaesthetic. It is used to prevent or relieve pain, but will not put you to sleep.



Medical Illustration Copyright © Nucleus Medical Art.
All Rights Reserved. www.nucleusinc.com

3. Preparation of the procedure.

The medical imaging department will give you instructions on how to prepare for your procedure.

Please tell the staff if you are or suspect you might be pregnant or are breastfeeding.

If you take Aspirin, Warfarin, Clopidogrel (Plavix and Iscover) or Dipyridamole (Persantin and Asasantin) or any other drug that is used to thin your blood ask your doctor/health practitioner if you should stop taking it before the procedure as it may affect your blood clotting.

List or bring all your prescribed drugs, those drugs you buy over the counter, herbal remedies and supplements

Do not drink any alcohol and stop recreational drugs 24 hours before the procedure as these may alter the affects of the sedation anaesthetic. If you have a drug habit please tell your doctor. (These activities are forbidden by Shariah Law)


4. During the procedure

A local anaesthetic is injected into the soft tissues of your

1. ما هو البزل القطني؟

البزل القطني الموجه بالأشعة السينية هو إجراء يهدف لأخذ عينة من السائل النخاعي (سائل المخ والعمود الفقري). ترسل العينة لمختبر علم الأمراض لفحصها. تستخدم صور الأشعة السينية لتوجيه وإرشاد الإبرة أثناء إدخالها في جسم المريض.

2. هل سيكون هناك شعور بعدم الراحة ؟ هل هناك حاجة لأي دواء تخدير؟ يتطلب الإجراء حقنة مخدر موضعي . غرض الحقنة هو منع الشعور بالألم أو علاجه ، ولكنها لن تتسبب في نومك.



Medical Illustration Copyright © Nucleus Medical Art.
All Rights Reserved. www.nucleusinc.com

3. التحضير للإجراء

يقوم قسم التصوير الطبي بإعطائك التعليمات المتعلقة بكيفية التحضير لهذا الإجراء.

نرجو إبلاغ الموظفين إن كنت حاملاً أو تشكين في كونك حاملاً ، أو إن كنت تمارسين الرضاعة الطبيعية.

إن كنت تتناول أيًا من الأدوية التي تزيد من سيولة الدم كالأسبرين ، وارفارين ، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو دايابير دامول (بيرسانتين أو اساسانتين) أو أي عقار آخر لنفس الغرض ، فاسأل طبيبك إن كان عليك التوقف عن تناولها قبل الإجراء لأنها قد تؤثر على تخثر دمك.

احضر معك كل الأدوية الموصوفة لك ، والأدوية التي تبتاعها دون وصفة ، والعلاجات العشبية والعلاجات التكميلية أو احضر قائمة بها.

لا تحتسي الكحوليات وأوقف تعاطي كل الأدوية والعقاقير المخدرة (المخالفة للشريعة الإسلامية) التي تتناولها ، وذلك قبل 24 ساعة من الإجراء ، لأنها قد تتداخل مع عمل الدواء المسكن. إذا كنت معتاداً على عقار معين ، نرجو إبلاغ الطبيب.

4. أثناء الإجراء

يتم حقن المخدر الموضعي في الأنسجة الرخوة في أسفل ظهرك. باستخدام الأشعة السينية ، يتم وضع إبرة العمود الفقري أسفل ظهرك . حاول أن

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

lower back.

Using x-ray, a spinal needle is put into your lower back. While the needle is being inserted try not to move or suddenly cough. Cerebrospinal fluid (CSF) is collected. The needle is removed from your back and a dressing is applied.

5. After the procedure

You may need to lie flat for a period of time to reduce the risk of a headache. This is at the discretion of the doctor. Take care when you first stand, as temporary leg weakness can occur.

6. What are the risks of this specific procedure?

The risks and complications with this procedure can include but are not limited to the following.

Common risks and complications include:

- Headache may require medication and bed rest.
- Minor pain, bruising and/or infection at the injection site. This may require treatment with antibiotics.
- Low blood pressure causing dizziness. Bed rest can help relieve this.
- Bleeding or bruising could occur. This is more common if you take Aspirin, Warfarin, Clopidogrel (Plavix and Iscover) or Dipyridamole (Persantin and Asasantin).
- Failure of local anaesthetic which may require a further injection of anaesthetic or a different method of anaesthesia may be used.
- Nerve damage, is usually temporary, and should get better over a period of time.

Less common risks and complications include:

- A severe headache, may need to have bed rest for several days. Sometimes other procedures are required to be done to relieve this headache.
- Vomiting may occur and require treatment with medication.
- Infection, requiring antibiotics and further treatment.
- Damage to surrounding structures such as blood vessels, organs and muscles, requiring further treatment.
- An allergy to injected drugs, requiring further treatment.
- The procedure may not be possible due to medical and/or technical reasons.

Rare risks and complications include:

- Injury to the spinal cord. This may require surgery.
- Permanent nerve damage with possible paralysis.
- An increased lifetime cancer risk due to the exposure to x-rays.
- Seizures and/or cardiac arrest due to local anaesthetic toxicity.
- Meningitis requiring antibiotics and other treatment.
- Death as a result of this procedure is very rare.

لا تتحرك أو تسعل فجأة عند إدخال الإبرة في ظهرك. يتم من خلال الإبرة جمع السائل النخاعي.
تتم إزالة الإبرة من أسفل الظهر ويوضع الضماد.

5. بعد الانتهاء من الإجراء

قد يكون من الضروري أن تظل مستلقياً بشكل مسطح لبعض الوقت للتقليل من مخاطر الصداع. يكون ذلك حسب ما يراه الطبيب.
كن حذراً عندما تبدأ بالوقوف لأنه قد يكون هناك ضعف مؤقت في الساقين.

6. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟

مخاطر ومضاعفات هذا الإجراء تشمل ، ولكنها غير مقصورة على :

مخاطر ومضاعفات شائعة وتشمل :

- صداع قد يتطلب أدوية وراحة تتطلب البقاء في الفراش.
- ألم بسيط، كدمة و/أو عدوى عند منطقة دخول الإبرة الوريدية . قد يتطلب المعالجة بمضادات حيوية.
- انخفاض في ضغط الدم بسبب دوخة . الراحة ولزوم الفراش قد يخفف من ذلك.
- حدوث نزيف أو كدمة . وهو أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دابايير دامول (بيرسانتين أو اساسانتين).
- فشل في عمل المخدر الموضعي مما قد يتطلب إعطاء حقنة أخرى أو استخدام طريقة تخدير أخرى.
- ضرر لعصب . غالباً ما يكون مؤقتاً و من المفترض تحسنه مع الوقت. من النادر حدوث ضرر دائم للعصب.

مخاطر ومضاعفات غير شائعة وتشمل :

- صداع شديد قد يتطلب لزوم الفراش للراحة لعدة أيام . أحياناً يتطلب الأمر القيام ببعض الإجراءات لعلاج هذا الصداع.
- قد يحدث قيء يتطلب العلاج بأدوية.
- عدوى يتطلب علاجها المضادات الحيوية وعلاجات أخرى.
- ضرر الأنسجة المجاورة كالأوعية الدموية ، الأعضاء الأخرى والعضلات. يتطلب معالجات أخرى.
- تفاعل تحسسي للأدوية التي أعطيت أثناء القيام بالإجراء تتطلب علاجات أخرى.
- قد لا يمكن القيام بالإجراء لأسباب طبية وأو فنية (تقنية).

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث وتشمل:

- ضرر للحبل الشوكي . قد يتطلب ذلك جراحة.
- ضرر دائم لعصب واحتمال شلل.
- زيادة معدل خطر الإصابة بالسرطان خلال الحياة بسبب التعرض للأشعة السينية.
- تشنجات و \ أو سكتة قلبية بسبب سمية المخدر الموضعي.
- التهاب السحايا مما يتطلب مضادات حيوية وعلاجات أخرى.
- الوفاة بسبب هذا الإجراء نادرة جداً .

[illegible]