

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient Copy Pilonidal Sinus

معلومات الإقرار – نسخة المريض الناصور الشعري (العصصي)

1. What do I need to know about this procedure?

An excision of a Pilonidal Sinus is the removal of a sinus (track) between the buttocks. The wound is left open and may take 2-3 weeks or longer to heal.

2. My Anaesthetic.

This procedure will require an anaesthetic. See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.

Specific risks:

- The wound may need to be left open and packed regularly until it heals and this could be several weeks.
- The wound, if sutured, may break open and

1. ما الذي ينبغي عليّ معرفته عن هذا الإجراء؟

الإزالة الجراحية للناصور الشعري هي إزالة لمسار (ممر) بين الردفين. يترك الجرح مفتوحاً وقد يستغرق التئامه من 2-3 أسابيع أو أكثر.

2. التخدير الذي أتلقيه

سوف يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير. اقرأ تعليمات التخدير المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج. إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات، وهي تشمل، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد يحدث التهاب، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى.
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول (بيرسانتن أو اساسانتين).
- عند المرضى ذو الوزن الزائد أو السمنة المرضية، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر، مضاعفات في القلب والرئة، وجلطات الأوعية الدموية.

مخاطر خاصة بهذا الإجراء:

- قد يكون من الضروري إبقاء الجرح مفتوحاً مع تعبئته بالضماد بانتظام حتى يلتئم وقد يستغرق ذلك عدة أسابيع.
- إذا كان الجرح قد تمت خياطته، فقد ينفث ويفرز دم أو مواد ملوثة. قد يتطلب ذلك عملية أخرى.



المركز الطبي الدولي
International Medical Center

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

discharge blood or infected material. This may need further surgery.

- The wound may heal with a thick scar, which may be discoloured and painful. This may be permanent.
- The sinus problem may recur. This may need further surgery.

Notes to talk to my doctor about:

- قد يلتئم الجرح مخلفاً ندباً وقد يتغير لونه و يكون مؤلماً. هذا الأمر يكون دائماً.
- قد يتكرر ظهور الناسور، وقد يتطلب ذلك جراحة أخرى.

أمر أقوم بمناقشتها مع طبيبي المعالج
