

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information – Parent/Patient Copy
Pyloromyotomy (Ramstedt's Operation
Child/Young Person

معلومات الإقرار- نسخة والد المريض\المريض
الشق الجراحي لعضلات الفتحة بين المعدة والأمعاء (عملية رامستد)
الطفل \ صغير السن

1. What do I need to know about this procedure?
A Pyloromyotomy or Ramstedt's procedure is where the muscle of the pylorus (at the end of the stomach) is divided to allow normal stomach emptying.

2. My Anaesthetic.

This procedure will require an anaesthetic.
See About Your Child's Anaesthetic for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?
There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur which may require treatment including antibiotics.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin or Aspirin.
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Impaired circulation may occur to a limb or to an organ which may require further treatment.
- Death or brain damage as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Rarely when the muscle is divided, the stomach lining may be holed. This could result in leakage of stomach fluid into the abdomen. This

1. ما الذي ينبغي عليّ معرفته عن هذا الإجراء؟
في الشق الجراحي لعضلات الفتحة بين المعدة والأمعاء (عملية رامستد) يتم قطع وفصل العضلة الموجودة في أسفل المعدة للسماح بالإفراغ الطبيعي لمحتويات المعدة.

2. التخدير الذي أتلقيه
سوف يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير .
اقرأ تعليمات التخدير المتعلقة بالإجراء الطبي المقرر لطفلك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة.
إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج.
إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات ، نرجو عدم التردد في طلبها .

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟
لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقصورة على :

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى.
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين أو الأسبرين.
- قد يحدث إغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.
- انخفاض تدفق الدم لأحد أعضاء أو أطراف الجسم والذي قد يتطلب معالجات أخرى.
- الوفاة أو تضرر المخ محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر خاصة بهذا الإجراء:

- نادراً ما يحدث ثقب في بطانة المعدة عند قطع وفصل العضلة . قد يتسبب ذلك في تسرب سوائل المعدة إلى البطن ، وقد

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

may need further surgery.

- Damage to the bowel, which may cause leakage of bowel fluid. This may need further surgery.
- Deep bleeding in the abdomen. This may need fluid replacement or further surgery.
- The bowel movement may be paralysed or blocked after surgery. This may cause a build up of fluid in the bowel with bloating of the tummy and vomiting. Further treatment may be necessary.
- A weakness in the wound with complete or incomplete, bursting of the wound in the short term, or a hernia in the long term. This may need further surgery.
- The baby may continue to vomit for some days after the operation.
- Rarely further surgery may be necessary to divide more muscle.
- In some babies, healing of the wound may be abnormal and the wound can be thickened and red and may be painful.
- Adhesions (bands of scar tissue) may form and cause bowel blockage. This can be a short term or a long-term complication and may need further surgery.

Notes to talk to my doctor about:

يحتاج ذلك لعملية أخرى.

- قد يحدث ضرر للأمعاء مما قد يسبب تسرب سوائل الأمعاء. قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.
- نزيف عميق في التجويف البطني قد يستدعي إعطاء سائل لتعويض الدم المفقود أو جراحة أخرى.
- بعد الجراحة ، قد يحدث كسل لحركة الأمعاء أو قد تنسد الأمعاء مما يؤدي إلى تراكم السوائل في الأمعاء مع انتفاخ البطن والاستقرار. يتطلب هذا الأمر معالجات أخرى.
- ضعف قد يعترى الشق الجراحي ويؤدي على المدى القريب إلى تباعده بشكل جزئي أو كامل ، وعلى المدى البعيد قد يتسبب ذلك في نشوء فتق. قد يتطلب ذلك جراحة أخرى.
- قد يعاني الطفل من التقيؤ لعدة أيام بعد الجراحة.
- نادراً ما تكون هناك حاجة لعملية أخرى لقطع وفصل المزيد من العضلات.
- عند بعض الأطفال ، يحدث التئام الجرح بشكل غير طبيعي. قد تزداد سماكة الندب الجراحي ويصبح لونه أحمر وقد يكون مؤلماً.
- قد تحدث التصاقات وتسبب انسداداً للأمعاء. قد يحدث ذلك على المدى القريب أو البعيد وقد يحتاج حلاً جراحياً.

أمر أقوم بمناقشتها مع طبيبي المعالج
