

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent for Angiogram and Angioplasty/Stenting

الخلل/تركيب دعامة إقرار الموافقة على التصوير الوعائي ورأب

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No

If Yes, is an interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The following will be performed. (Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

An angiogram is a procedure where x-rays and Iodinated 'Contrast' are used to examine blood vessels, usually arteries. Angioplasty and stenting are often used instead of surgery to deal with narrowed or blocked arteries. An angioplasty and/or stenting are performed as an extra step to the angiogram procedure.

An **Angioplasty** involves the insertion of a balloon into the narrow part of the artery. The balloon is inflated stretching out and opening up the artery.

A **Stent** is a metal mesh tube that is inserted when an angioplasty does not maintain the improved blood flow through the artery. The stent keeps the artery open after the balloon has been removed. The stent stays in for life. This procedure will require an injection of local anesthetic. A sedative injection is *rarely* given.

C. Risks of this procedure

In recommending the Angiogram & Angioplasty/Stenting, the doctor believes the benefits to you from having this procedure exceed the risks involved.

The risks and complications with this procedure can include but are not limited to the following.

Common risks and complications include:

- Minor pain, bruising and/or infection from the IV cannula. This may require treatment with antibiotics.
- Pain or discomfort at the puncture site. This may require medication.
- Bleeding or bruising could occur. This is usually stopped by applying pressure and/or ice to the puncture site. This is more common if you take Aspirin, Warfarin, Clopidogrel (Plavix and Iscover) or Dipyridamole (Persantin and Asasantin).
- The artery can become narrowed or blocked again. This may require further treatment.
- Failure of local anesthetic which may require a further injection of anesthetic or a different method of anesthesia may be used.
- Nerve damage, is usually temporary, and should get better over a period of time. Permanent nerve damage is rare.

Less common risks and complications include:

- Infection, requiring antibiotics and further treatment.
- Failure to access the narrowing in the artery. This may require a second arterial puncture at a different location.

أ. المترجم / الاحتياج الثقافي

الحاجة لخدمات الترجمة
إذا كانت الإجابة بنعم ، فهل يتوفر مترجم مؤهل ؟
☐ نعم ☐ لا ☐ نعم ☐ لا

ب . الحالة المرضية والعلاج

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي:
(يقوم الطبيب بالتوثيق - يشمل ذلك موضع و/ أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

التصوير الوعائي هو إجراء تستخدم فيه الأشعة السينية ومادة وسط متباين معالجة باليود للكشف على الأوعية الدموية ، وعادة ما تكون الشرايين. يستخدم رأب الشرايين وتركيب الدعامة كبديل للجراحة لحل مشاكل الضيق أو الانسداد في الشرايين. يتم القيام برأب الشريان وأو تركيب الدعامة كإجراء إضافي لتصوير الشريان.

رأب خلل الشريان ويتم خلاله إدخال بالون إلى المنطقة الضيقة في الشريان . يتم نفخ البالون مما يؤدي إلى تمدد وفتح الشريان.
تركيب دعامة وهي عبارة عن شبكة معدنية على شكل أنبوب يتم إدخالها عند فشل رأب الشريان في الحفاظ على تدفق الدم المتحسن داخل الشريان. تبقى الدعامة الشريان مفتوحاً بعد إزالة البالون. تظل الدعامة مدى الحياة. سيتطلب القيام بهذا الإجراء إعطائك حقنة مخدر موضعي .
نادرًا ما يتم إعطاء دواء مسكن.

ج . مخاطر الإجراء

لقد أوصى طبيبك بالتصوير الوعائي ورأب الخلل وتركيب دعامة ويرى أن فوائد هذا الإجراء بالنسبة لك تتفوق على مخاطره . هناك مخاطر ومضاعفات مرتبطة بهذا الإجراء ، وهي تشمل ، ولكنها غير محصورة في :

مخاطر ومضاعفات شائعة ، وتشمل:

- ألم بسيط ، كدمة و/أو عدوى عند منطقة دخول الإبرة الوريدية . قد يتطلب المعالجة بمضادات حيوية.
- ألم أو الشعور بعدم الراحة في منطقة دخول القسطرة . قد يتطلب ذلك المعالجة بالأدوية.
- حدوث نزيف أو كدمة . يتوقف ذلك عادة بوضع ضغط و/أو ثلج في موضع دخول القسطرة . يحدث ذلك بشكل أكثر شيوعاً عند من يتناولون أدوية الوارفارين ، الأسبرين ، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار داياباير دامول (بيرسانتين أو اساسانتين) .
- قد يضيق الشريان أو ينسد مرة أخرى ، وقد يتطلب ذلك المزيد من العلاج.
- إذا فشل عمل المخدر الموضعي قد يتطلب إعطاء حقنة أخرى منه ، أو استخدام أسلوب تخدير آخر.
- ضرر العصب . عادة ما يكون ذلك مؤقتاً ، ومن المفترض تحسنه مع الوقت . من النادر حدوث ضرر دائم للعصب.

مخاطر ومضاعفات أقل شيوعاً ، وتشمل:

- عدوى تتطلب مضادات حيوية وعلاجات أخرى.
- فشل الوصول إلى الشريان المتضيق ، وقد يتطلب ذلك الدخول عبر شريان آخر في منطقة أخرى.
- ضرر الأنسجة المحيطة بالأوعية الدموية ، الأعضاء الأخرى والعضلات

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Damage to surrounding structures such as blood vessels, organs and muscles, requiring further treatment.
- A blood clot or excessive bleeding from the puncture site. This may require other treatment and/or corrective surgery.
- An allergy to injected drugs, requiring further treatment.
- The procedure may not be possible due to medical and/or technical reasons.

Rare risks and complications include:

- Stroke or stroke like complications may occur due to the catheter causing damage to the artery blocking the blood flow. This can cause weakness in the face, arms and legs; it could be temporary or permanent.
- Rupture of a blood vessel requiring other treatment and/or corrective surgery.
- The stent may suddenly close. This may require further treatment.
- An increased lifetime cancer risk due to the exposure to x-rays.
- Skin burns or damage from exposure to x-rays.
- Seizures and/or cardiac arrest due to local anesthetic toxicity.
- Death as a result of this procedure is very rare.

If sedation is given extra risks include:

- Faintness or dizziness, especially when you start to move around
- Fall in blood pressure
- Nausea and vomiting
- Weakness
- An existing medical condition getting worse.
- Heart and lung problems such as heart attack or vomit in the lungs causing pneumonia. This may require emergency treatment
- Stroke resulting in brain damage.

D. Risks of Iodinated Contrast for patients with renal impairment

Specific Risks of Iodinated Contrast to patient's identified as having *Renal Impairment*.

Giving the Contrast to people with weakened kidneys (renal impairment) can cause further kidney damage, which may in turn cause the kidneys to stop working properly (acute renal failure).

E. Patient Consent

I acknowledge that the doctor/doctor delegate has explained the proposed procedure.

I understand:

- The risks and complications, including the risks that are specific to me.
- The anesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.

وتتطلب معالجات أخرى.
• تخثر دموي أو نزيف مفرط من منطقة دخول القسطرة . قد يتطلب ذلك معالجات أخرى و/أو جراحة تصحيحية.

• رد فعل تحسسي لأي من الأدوية المعطاة . يتطلب ذلك علاجات أخرى.
• قد لا يكون القيام بالإجراء ممكناً لأسباب طبية و / أو فنية (تقنية).

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث ، وتشمل:

- سكتة دماغية أو مضاعفات مشابهة للسكتة الدماغية بسبب أضرار قد تحدثها القسطرة في الشريان مسببة انسداداً لتدفق الدم. قد يسبب ذلك ضعفاً في الوجه ، الذراعين والساقين. قد يكون ذلك بشكل مؤقت أو دائم.
- تمزق الوعاء الدموي مما قد يتطلب علاج آخر وأو جراحة تصحيحية.
- قد يحدث انغلاق مفاجئ في الدعامة مما قد يتطلب معالجة أخرى.
- زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان خلال حياة المريض بسبب التعرض للأشعة السينية.
- حروق أو ضرر يصيب الجلد بسبب التعرض للأشعة السينية.
- تشنجات و/أو سكتة قلبية بسبب سمية المادة المستخدمة في التخدير الموضعي.
- الوفاة نادرة جداً كسبب لهذا الإجراء.
- **مخاطر إضافية في حالة استخدام دواء التخدير المسكن ، وتشمل:**
- إغماء أو دوخة ، خاصة عند البدء في الحركة بعد نهاية الإجراء.
- انخفاض في ضغط الدم .
- غثيان ، وتقيؤ .
- شعور بالضعف.
- تفاقم أي مرض آخر يعاني منه المريض.
- مشاكل في القلب والرئة كالآزمة القلبية أو دخول المادة المتبقية إلى الرئة مسببة التهاباً رئوياً. قد يتطلب ذلك تدخل علاجي طارئ.
- سكتة دماغية تسبب ضرراً للمخ.

د . مخاطر مادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين

باعتلال عمل الكلى.
المخاطر المحددة لمادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين
باعتلال عمل الكلى.
إعطاء مادة الوسط المتباين لمرضى يعانون من ضعف عمل الكلى قد يسبب أضراراً إضافية للكلى ، مما قد يسبب توقف الكلى عند العمل بشكل صحيح (فشل كلوي حاد).

هـ . إقرار المريض

أقر بأن الطبيب/ من ينوب عن الطبيب قد شرح لي الإجراء المقترح :
إنني على علم بما يلي :

- المخاطر والمضاعفات بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- التخدير \ الدواء المسكن المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسين حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor/doctor delegate or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor/doctor delegate undergoing further training may conduct this procedure.

I have been given the following Patient Information Sheet:

☐ **Angiogram & Angioplasty/Stenting**

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.
- I understand that International Medical Center may release my relevant de-identified information obtained from this and related procedures for education and training of health professionals.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date: Time:

F. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under:

- ☐ the Patient Consent section (E)
- ☐ Iodinated Contrast – Patients with Renal Impairment Section (D) (for renal impaired patients only) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date: Time:

Witnesses for the above signatures:

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

إذا حدث (لا سمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .

قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.

لقد تم إعطائي مستندات وأوراق التعليمات التالية:

☐ التصوير الوعائي & الرأب/تركيب دعامة

منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتني والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره , والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.

أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعي لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.

أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص الفحص وذلك كجزء من الإجراء وأن ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.

أن المركز الطبي الدولي قد يستخدم المعلومات الطبية المتحصلة من حالتي المرضية وفحوصاتي الطبية لأغراض التعليم والتدريب الطبي للممارسين الصحيين ، وذلك دون الكشف عن هويتي.

وبناء على ما تقدم، فإنني أوافق على الخضوع للإجراء الطبي

اسم المريض:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

و . بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً ضمن:

☐ قسم إقرار المريض (هـ)

☐ مادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل الكلى (القسم "د") فقط للمرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.

وأنتني أرى أن المريض \ من ينوب عن المريض في اتخاذ القرار قد فهموا جميع المعلومات المتعلقة.

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:

طبيعة الإنابة:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

توقيع الشهود :

(1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____

(2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____